



Title	ニューモシスチス・カリニ肺炎のHRCT所見
Author(s)	塚田, 博; 吉村, 宣彦; 山本, 貴子 他
Citation	日本医学放射線学会雑誌. 1995, 55(6), p. 369-374
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/15914
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

ニューモシスチス・カリニ肺炎の HRCT 所見

塚田 博 吉村 宣彦 山本 貴子 古泉 直也
秋田 眞一 小田 純一 酒井 邦夫

新潟大学医学部放射線医学教室

High-resolution CT findings of *Pneumocystis carinii* Pneumonia

Hiroshi Tsukada, Norihiko Yoshimura, Takako Yamamoto,
Naoya Koizumi, Shinichi Akita,
Jyunichi Oda and Kunio Sakai

High resolution CT (HRCT) was performed on 7 patients with pneumocystis carinii pneumonia (PCP). Six cases were proven bacteriologically by bronchoalveolar lavage; one case was proven by autopsy. Three patients were re-scanned after specific treatment and symptomatic relief.

All the CT scans were abnormal, usually showing bilateral diffuse ground-glass opacity, through which the pulmonary vessels remained visible. Chest X-ray, on the other hand, showed a normal pattern in one patient. Other changes such as air space consolidation (in 4 cases) and thickening of peripheral pulmonary vessels (in 2 cases) were also seen. Air space consolidation was found in three cases with mixed infection (cytomegalovirus pneumonia in 2 cases, aspergillosis in one case). No patient showed significant mediastinal or hilar lymph node enlargement, pleural effusion or cystic pulmonary change.

HRCT findings such as ground-glass opacity and air space consolidation were shown to disappear in some cases of PCP after specific treatment.

HRCT is useful to evaluate the sequential pulmonary changes after the specific therapy.

Research Code No.: 206. 1

Key words: *Pneumocystis carinii* pneumonia, HRCT,
Ground-glass opacity

Received Dec. 20, 1993; revision accepted Jun. 1, 1994

Department of Radiology, Niigata University, School of Medicine

はじめに

現在ニューモシスチス・カリニ肺炎（以下 PCP）は、AIDS 患者の合併症および主要死因として代名詞と言われる程に広く知られている。また白血病、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍や膠原病、臓器移植といった基礎疾患のある患者に、大量の免疫抑制剤、抗腫瘍剤、抗生物質や副腎皮質ホルモンあるいは放射線療法が行われることで二次的免疫不全状態に陥り PCP を併発することでも知られている。PCP の胸部単純写真に関して今までに多くの報告がなされてきたが^{1),2)}、PCP 初期には正常所見を示し早期に診断できないことも指摘されている³⁾。CT 特に High-resolution CT（以下 HRCT）は胸部単純写真に比し、肺野の変化を早期に指摘でき⁴⁾、陰影の性状および分布を正確に把握できるなどの評価を得ており^{5),6)}、PCP においてもその有用性が期待される。しかし PCP の HRCT を検討した報告はいまだ少なく、その特徴的所見および治療後の変化を調べることは臨床的に重要と思われる。今回我々は本症 7 例の HRCT 所見と胸部単純写真を比較し、さらに CT 所見の治療後の経時的変化を検討したので報告する。

対象と方法

対象は、当院にて経験した 7 例（Table 1）で、男性 3 例、女性 4 例。年齢は 38 歳から 69 歳までの平均 58 歳。基礎疾患はネフローゼ症候群 2 例、ネフローゼ症候群および SLE (systemic lupus erythematosus) 1 例、SLE 1 例、悪性リンパ腫 1 例、悪性リンパ腫および骨髄線維症 1 例、間質性肺炎および類天疱瘡 1 例。

PCP 発症前治療として、全例にプレドニゾロン (PSL) によるステロイド療法がなされており、1 例には放射線療法（縦隔肺門照射 36Gy）が、1 例にはパルス療法が、また 1 例では PCP の予防投与として 2 週に一度の Pentamidine 吸入がなされていた。

PCP の診断は、6 例が気管支肺泡洗浄 (BAL) にて、1 例は病理解剖にて確診された。BAL にて確診された 6 例中 2 例にサイトメガロウイルスを、1 例にアスペルギル

Table 1 List of patients with PCP

Case	Age	Sex	Underlying disease	Treatment before PCP	Method of diagnosis	Specific treatment	Days	PO2 (Torr)	LDH (IU)	Course
1	55	♀	SEL Nephrotic syndrome	PSL	BAL (with CMV)	ST	2	68.6 (02:5 1/min)	2263	cure
2	65	♂	Nephrotic syndrome	PSL	BAL	ST	8	46.9 (02:4 1/min)	2103	cure
3	69	♀	Nephrotic syndrome	PSL	BAL	ST	1	87.4 (02:6 1/min)	1241	death
4	66	♂	Malignant lymphoma Myelofibrosis	Pulse Tx PSL	autopsy	ST	2	35.8 (RA)	973	death
5	51	♀	SLE	PSL	BAL (with CMV)	ST Semi-pulse Tx	9	52.9 (RA)	7689	death
6	38	♀	Malignant lymphoma	PSL Radiation (36Gy)	BAL	ST Pulse Tx	10	71.4 (RA)	755	cure
7	64	♂	IP Pemphigoid	PSL Pentamidine	BAL (with Aspergillus)	ST Diflucan	0	55.7 (RA)	1856	death

SLE; systemic lupus erythematosus, PSL; prednisolone, ST; sulfamethoxazole+trimethoprim, BAL; bronchoalveolar lavage
Days; period from appearance of PCP symptoms to CT examination, RA; room air, CMV; cytomegalovirus

スが証明された。

呼吸器症状の出現または血液ガス上 PO2 の低下を認めた日を発症日とした場合、7 例の発症から CT 施行までの期間は 0 日から 10 日にわたり、平均 4.6 日であった。また CT 施行時 ST 合剤投与がすでになされていた症例は 1 例で、6 例は CT 施行後に投与された。また PCP の治癒した 3 例では、CT での経過観察が可能であった。

X 線 CT は日立 W1000 を使用し、全例肺尖から横隔膜までを撮影した。7 例の HRCT はスライス厚 2.5mm・スライス間隔 1cm、CT 画像は window level=-700, window width=1200 で表示した。胸部単純写真は CT 施行前後 24 時間以内に撮影されたものと比較した。比較において、肺血管陰影が同定できない程度の陰影濃度の上昇を示す air space consolidation, 肺血管陰影が同定できるほどの陰影濃度の上昇を示す ground-glass opacity および肺血管壁の不整・肥厚を示す線状陰影、さらに陰影の分布やリンパ節腫大、胸水や嚢胞性陰影の有無を検討した。

結 果

PCP 7 例の胸部単純写真と CT 所見の対比を Table 2 に示した。胸部単純写真では、線状陰影および ground-glass opacity が肺門より両側中下肺野へ広がって見られたのに対し、CT では ground-glass opacity は全例両側全肺野にびまん性に広がって見られ (Fig. 1), 線状陰影としては胸膜に達する肺静脈 (2 次小葉間隔壁) の肥厚様所見として 2 例に見られるのみであった (Fig. 4)。

一方、胸部単純写真では、2 例にしか見られなかった

air space consolidation が、CT では 4 例に見られた (Fig. 2)。また CT では全例に異常陰影が認められたのに対して、胸部単純写真ではほぼ正常所見と思われる 1 例があった (Fig. 3)。さらに胸部単純写真では片側にしか陰影を指摘できなかったのに対し、CT では両側に陰影を指摘できた 1 例も見られた。また CT では胸膜近傍に層状の非浸潤領域を認める PCZ (peripheral clear zone) 所見が 6 例に見られた (Fig. 4)。

Table 2 Chest X-ray (CXP) and CT (HRCT) findings in the first examination of 7 patients with PCP

Findings	CXR	CT
Normal	1	0
Air space consolidation	2	4
Ground-glass opacity	6	7
Linear shadow	5	2
Distribution		
unilateral	1	0
bilateral	5	7
upper zone	2	7
middle zone	6	7
lower zone	5	7
LN swelling	0	0
Effusion	0	0
Cystic air space	0	0



Fig. 1 Characteristic CT findings of PCP-CT scan demonstrates bilateral diffuse ground-glass opacity, through which the pulmonary vessels remained visible.

治療後の経過を観察できた3例では、ground-glass opacity および air space consolidation の改善または消失が見られ、経過中2例に胸膜下において胸膜と平行に走行する線状陰影；SCLS(subpleural curvilinear shadow)の出現が見られた (Fig. 4)。

その他リンパ節腫大、胸水および囊胞性陰影は初回検査時ならびに経過観察時において、いずれも認められなかった。

ST 合剤がCT 施行後投与された6例においては、PCP 発症からCT 施行までの期間は0～9日までの平均3.7日であったが、CT 施行までの期間と陰影濃度や陰影の広がりといった浸潤程度との間には、明らかな相関は認められなかった。

病理解剖を行えた1例もCT 上 ground-glass opacity を呈したが、病理所見 (Fig. 5) では、a) 肺胞内の泡沫状




Fig. 2 HRCT scan through the carina shows air space consolidation(↑) in the right lung in which the pulmonary vessels can not be seen.

の滲出物、b) リンパ球や形質細胞を主とした細胞浸潤による肺胞間質の肥厚といった、PCP に典型的な病理像⁷⁾が認められた。

考 察

PCP の確定診断は、気管支鏡を用いた BAL や TBLB (transbronchial lung biopsy) などで行なわれるが、PCP 患者の呼吸状態は極めて悪いことが多く、気管支鏡検査を行うことはかなり侵襲的である。またたとえ検査が行えたとしても、診断率はおよそ60%前後といわれ⁸⁾、診断が得られない場合もあり、このような場合はST 合剤が臨床的判断のもとに投与されることが多い。よってPCP の診断



(A)



(B)

Fig. 3 (A) Chest radiograph shows a normal or near normal finding. (B) CT shows ground-glass opacity in bilateral lung fields, especially marked in the right lung. Both images are from the same patient on the same day.




Fig. 4 Improved case with PCP-(A) Five days after onset of PCP symptoms. HRCT scan shows diffuse ground-glass opacity with peripheral clear zone (PCZ, ↑ ↑). Thickening of peripheral pulmonary vessel (↑) is suggested. (B) One month later from (A) Ground-glass opacity almost disappeared. Subpleural curvilinear shadow (SCLS, ↑) appeared in anterior and posterior subpleural region. (C) One month later from (B). SCLS changed to ground-glass opacity (↑).

率を高めるためには、非侵襲的な検査により早期に病変が指摘される必要がある。先に述べたごとく、胸部単純写真では PCP 早期には異常所見を示さないこともあり、また Ga シンチでは PCP 病変の描出において感度は高いが、特異性に欠ける⁹⁾。これらのことより、びまん性肺疾患に優れた評価を得ている HRCT が、PCP の早期診断においても期待される非侵襲的検査と思われたので、今回本症における HRCT 所見の分析を試みた。

1. 胸部単純写真との比較

PCP の胸部単純像は両側肺門より末梢へ広がる陰影を呈すると言われているが²⁾、自験例 7 例では ground-glass

opacity や線状陰影を主体に、両側中下肺野を中心に分布する典型像を呈していた。しかし CT 所見と比較した場合、陰影所見に若干の差異が見られたり、分布の上で胸部単純写真では上肺野の陰影を指摘しにくい場合のあることが判明した。また胸部単純写真ではほぼ正常と思われた 1 例において CT 上明らかな陰影が指摘されたり、胸部単純写真では片肺にしか陰影を指摘できなかった 1 例においても CT では両側に陰影が指摘可能であった。このことから、CT は胸部単純写真よりも陰影の分布を正確に把握できると同時に、胸部単純写真では指摘困難な陰影を描出できるなどの利点のあることが確認された。




Fig. 5 (A) Microscopic findings of the specimen from lung showing intra-alveolar foamy exudate and interstitial pneumonia. (B) Grocott stain of pneumocystis carinii pneumonia showing small round organisms within alveolar lumen.

2. 初回検査時の HRCT 所見

PCP の HRCT 所見として、全例に両側性びまん性に広がる ground-glass opacity が認められた。自験例 1 例の病理解剖では PCP に典型的な所見が認められたが、同じく PCP の HRCT 所見を報告した Bergin ら¹⁰⁾も、14 例全例に ground-glass opacity を認めており、このうち 11 例の TBLB に共通する病理学的所見として、a) 肺胞腔内にみられるフィブリンや細胞成分よりなる泡沫状滲出物、b) 浮腫や細胞浸潤による肺胞壁の肥厚、の 2 つの特徴を挙げている。また PCP 11 例の HRCT 所見を報告した Moskovic ら¹¹⁾も、PCP の特徴的陰影として両側性びまん性の、特に病初期における軽度の肺野濃度の上昇所見を“fine alveolar consolidation”と表現して 8 例 (73%) に見られたと報告しており、この陰影は我々の用いた ground-glass opacity と CT 上同一の陰影と思われ、両側性びまん性の ground-glass opacity は PCP の特徴的陰影のひとつと考えられた。

しかし Moskovic ら¹¹⁾はこの ground-glass opacity に伴って気管支壁の肥厚が 9 例 (82%) に認められたと報告しているが、自験例においては気管支壁の肥厚は認められず、ground-glass opacity を走行して胸膜に達する肺静脈 (2 次小葉間隔壁) の肥厚様所見を 2 例 (29%) に認めるのみであった。

さらに自験例 4 例 (57%) に、air space consolidation がみられた。Bergin ら¹⁰⁾も 3 例 (21%) に同様所見があったと報告し、病理学的には周囲の ground-glass opacity に比し、局所的により強い浸潤が肺胞腔内ならびに肺胞壁におきている、すなわち浸潤の程度が陰影濃度の違いとして現れているのではないかと推測している。

PCP においては混合感染特にサイトメガロウイルスとの感染が問題にされるが、air space consolidation のみられた自験例 4 例中 2 例にサイトメガロウイルスが、1 例にはアスペルギルスの混合感染が認められた。Aafedt ら¹²⁾が報告した 8 例のサイトメガロウイルス肺炎の CT 所見でも、また Kuhlman ら¹³⁾が報告した 9 例のアスペルギルス肺炎の CT 所見でも、自験例で見られたような air space consolidation が特徴のひとつとして挙げられている。したがって CT 上の air space consolidation から、Bergin¹⁰⁾らが推測した PCP の浸潤程度の違いを反映したものか、ウイルスとの混合感染によるものかの鑑別は困難であると思われた。

PCZ は自験例では 6 例 (86%) に見られ、ground-glass opacity に次いで高率に認められたが、Moskovic ら¹¹⁾は 1 例 (9%) にしか見られなかったと報告している。しかし他に PCP における PCZ に関しての報告がないので、自験例のように高頻度の所見か否かについては今後の検討が望まれる。

リンパ節腫大や胸水は、自験例では 1 例も認められず、PCP では稀な所見と思われた^{10),11)}。また嚢胞性陰影に関しては、Moskovic ら¹¹⁾は 1 例 (9%) で見られたと報

告。さらに Kuhlman ら¹⁴⁾は、PCP における嚢胞性陰影の出現は他の免疫不全患者に比し AIDS 患者で有意に多く認められたと報告しているが、自験例では 1 例も認められなかった。

3. 治療後の HRCT 所見

病態の改善により、ground-glass opacity ならびに air space consolidation の改善または消失が認められたが、病理学的には PCP や混合感染による肺胞腔内の泡沫状滲出物や肺胞壁の浮腫や細胞浸潤の改善を反映しているものと推測される。自験例 3 例中 2 例において ground-glass opacity の改善に伴い、SCLS が出現または消失する経過が認められたが、多発性筋炎および皮膚筋炎に合併した間質性肺炎の経過においても同様の所見を我々は認めており¹⁵⁾、SCLS 自体は可逆性所見であり、本疾患に特有な所見ではないと思われた。

4. 発症から検査施行までの期間と CT 所見

ST 合剤投与前に HRCT を施行された 6 例では、発症当日に HRCT を施行した症例においても 9 日目に施行した症例においても、両側性びまん性に ground-glass opacity が認められ、発症から HRCT 施行までの期間と陰影の広がりや浸潤程度との間には明らかな相関は認められなかった。このことは、HRCT に現れた PCP の画像所見が、個々の症例の免疫不全状態や PCP の暴露の程度といった因子によって左右されることを示唆しているものと思われた。

以上自験 7 例の PCP に共通する HRCT 所見として、PCZ を伴う両側性びまん性の ground-glass opacity が挙げられるが、この所見は PCP だけに見られる特異的な所見ではなく、過敏性肺臓炎、肺水腫、肺出血、薬剤性肺炎、肺胞蛋白症等においても認められる。過敏性肺臓炎では小葉中心性に粒状陰影が見られる点が¹⁶⁾CT 画像上の鑑別点となるが、その他の疾患との画像所見のみでの鑑別は困難と思われる。しかし、臨床上 PCP が疑われるような状況下にある場合、すなわち免疫不全状態にある患者に呼吸症状の悪化が見られた場合、非侵襲的な検査である HRCT を早期に行うことは、陰影の有無や性状を早期かつ正確に把握することができるため、画像所見上の特異性はやや欠けるが、臨床情報との組合せにより PCP の診断率をより高め、同時に治療も早期に開始できると思われる。よって PCP 診断においても HRCT は重要な検査であると考えられた。

ま と め

PCP 7 例の初回検査時および治療後の HRCT 所見を検討した。

1. PCP の初回検査時の HRCT 所見では、PCZ を伴う両側性びまん性の ground-glass opacity が特徴的と考えられた。

2. air space consolidation は PCP の浸潤程度の違い

を反映するものか、混合感染によるものかの鑑別は困難と思われた。

3. HRCT は胸部単純写真に比し、異常影の早期発見や進展度の把握に有用であり、また治療効果を評価するのに役立つことが分かった。

4. PCP の発症から HRCT 施行までの期間と浸潤程度との間には明らかな相関は見られず、画像所見は個々の症例の免疫状態や PCP の暴露の程度に左右されるものと思われた。

文 献

- 1) Forrest JV: Radiographic findings in pneumocystis carinii pneumonia. *Radiology* 103: 539-544, 1972
- 2) DeLorenzo LJ, Huang CT, Maguire GP and Stone DJ: Roentgenographic patterns of pneumocystis carinii pneumonia in 104 patients with AIDS. *Chest* 91: 323-327, 1987
- 3) Gedroyc WMW, Reidy JF: The early chest radiographic changes of pneumocystis pneumonia. *Clinical Radiology* 36: 331-334, 1985
- 4) Hartelius H, Gaub J, Jensen LI, et al: Computed tomography of the lungs in acquired immunodeficiency syndrome. *Acta Radiologica* 29: 641-644, 1988
- 5) Gamsu G, Klein JS: High resolution computed tomography of diffuse lung disease. *clinical Radiology* 40: 554-556, 1989
- 6) Webb WR, Muller NL, Naidich DP: High-resolution CT of the lung. Raven Press 1992
- 7) Katzenstein ALA, Askin FB: Surgical pathology of non-neoplastic lung disease. WB Saunders Company

- 1990
- 8) Walzer PD, Perl DP, Krogstad DJ, et al: Pneumocystis carinii pneumonia in the United States. *Annals of Internal Medicine* 80: 83-93, 1974
- 9) Woolfenden JM, Carresquillo JA, Larson SM, et al: Acquired immunodeficiency syndrome: Ga-67 citrate imaging. *Radiology* 162: 383-387, 1987
- 10) Bergin CJ, Wirth RL, Berry GJ, et al: Pneumocystis carinii pneumonia: CT and HRCT observations. *JCAT* 14: 756-759, 1990
- 11) Moskovic E, Miller R, Person M: High resolution computed tomography of pneumocystis carinii pneumonia in AIDS. *Clinical Radiology* 42: 239-243, 1990
- 12) Aafedt BC, Halvorsen RA, Tylen U, et al: Cytomegalovirus pneumonia: computed tomography findings. *J Canad Assoc Radiol* 41: 276-280, 1990
- 13) Kuhlman JE, Fishman EK, Siegelman SS: Invasive pulmonary aspergillosis in acute leukemia: characteristic findings on CT, the CT halo sign, and the role of CT in early diagnosis. *Radiology* 157: 611-614, 1985
- 14) Kuhlman JE, Knowles MC, Fishman EK, Siegelman SS: Premature bullous pulmonary damage in AIDS: CT diagnosis. *Radiology* 173: 23-26, 1989
- 15) 塚田 博, 古泉直也, 秋田眞一, 他: 多発性筋炎および皮膚筋炎に合併した間質性肺炎における HRCT 所見の経時的変化. *臨床放射線* 39: 145-150, 1994
- 16) Masanori A, Kita N, Higashihara T, et al: Summer-type hypersensitivity pneumonitis: comparison of high-resolution CT and plain radiographic findings. *AJR* 158: 1223-1228, 1991