



Title	3, 5-ジニトロ-1-置換-2 (4) -ピリドン類の環変換反応について
Author(s)	有賀, 正裕
Citation	大阪大学, 1979, 博士論文
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/24568
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

3,5-ジニトロ-1-置換-2(4)-

ピリドン類の環変換反応について

有賀正裕

目 次

第1章	緒言及び研究概要	
1-1	緒言	1
1-2	研究概要	5
第2章	3,5-ジニトロ-1置換-2-ピリドン類の環変換反応	
2-1	はじめに	11
2-2	3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone(1a)の 環変換反応	12
2-3	3,5-ジニトロ-1置換-2-ピリドン類の環変換反応	15
2-4	3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone(1a)と DAD C. EAAによる二環構造中間体	21
2-5	3,5-ジニトロ-1置換-2-ピリドン類と活性メチル 化合物のモノナトリウム塩の反応機構について の考察	25
2-6	3,5-ジニトロ-1-チル-4(or 6)-置換-2-ピリドン 類の環変換反応	34
2-7	実験の部	41
第3章	3,5-ジニトロ-1置換-4-ピリドン類の環変換反応	
3-1	はじめに	61
3-2	3,5-ジニトロ-1置換-4-ピリドン類と Na·DAD C との反応	61
3-3	実験の部	67
第4章	1,3-Dinitro-4-quinolizoneの環変換反応	
4-1	はじめに	73
4-2	1,3-Dinitro-4-quinolizone (1p) と Na·DAD C, Na·EAAとの反応	74

4-3	実験の部	79
第5章	3,5-ジニトロ-1-置換-2(or4)-ピリドン類の Meisenheimer complex の安定性について	
5-1	はじめに	81
5-2	3,5-ジニトロ-1-置換-2(or4)-ピリドン類と sodium methoxideによる Meisenheimer complex について	82
5-3	実験の部	89
参考文献		91
謝 辞		96

第1章 緒言及び研究概要

1-1 緒言

ピリジン環系化合物の求核試薬との反応については、古くから研究がなされており、数多くの報告があり、成書も多数出版されている。¹⁾ 例えば、ナトリウムアミドによるピリジン環の α 位のアミノ化は、Tschichibabin 反応²⁾として古くから、ピリジン化学の原料合成の有効な手段として、広く利用されてきた。また、Zincke 等によるピリジン環の C-N 結合の開裂反応³⁾も、水酸イオンによるピリジン環の α 位への求核攻撃に起因するものと考えられる。これら窒素あるいは酸素アニオン以外に、炭素アニオンの導入も、Grignard 試薬、あるいは活性 X タレン化合物による、ピリジン環の 2,4 位のハロケンの置換反応⁴⁾等が知られている。

これらの求核反応は、ニトロ化等の親電子反応が非常に困難であるのに対し、強い求核試薬とピリジン環の窒素原子の強い電気陰性度による電子吸引性により、あるいは、ピリジニウム塩として、環の窒素上の正電荷による電子吸引性の増大により、容易に達成されたものであるが、その反応位置は、Fig. 1-1 に示す




Fig. 1-1

共鳴式から推定されるようく、ピリジン環の4位、あるいは1位に限られている。

ピリジン環のN-オキシド化法の開発と進歩^{6,7)}により、ピリジン環の親電子置換反応が容易になり、この環の化学の道路が打開された。ピリジンN-オキシドの4位のニトロ化は、その代表例としてあげられる。^{6,7)}

一方、ピリジン系N-オキシド類の求核反応については、例えば、五塩化リン⁸⁾、オキシ塩化リン⁹⁾、または塩化スルフリルによる塩素化反応では、脱N-オキシド化して、ピリジンの塩素誘導体を与える。トルエンスルホニルクロリド¹¹⁾、無水酢酸¹²⁾等との反応では、アシロキシ基として、N-オキシド酸素のアニオン転位がおこり、ピリジン誘導体が得られるという結果が文献に報告されてきた。^{6,7)}最近では、さらには炭素イニオンのピリジン環の4位への導入が済石等によって報告されている。¹³⁾

筆者の研究室において、松村等により、2-chloromethyl pyridine及びその同族体とピリジンから得られるN-(2'-pyridyl)methyl pyridinium chloride同族体と硫酸ジメチルとの四級塩を。




Fig. 1-2

アルカリ処理することにより、*N*-methyl-2-pyridone の同族体の合成法が見い出された。¹⁴⁾ (Fig. 1-2) この反応は、従来法¹⁵⁾と異なり、酸化によらず環の α 位の炭素鎖を水酸基で求核置換することにより、ピリジン環の他の位置のアルキル基の酸化を防止した点に合成的特長が見らる。

筆者は、ピリジン環の α 位への求核反応の一端として、4-nitropyridine *N*-oxide と硫酸ジメチルから得られるピリジニウム塩、1-methoxy-4-nitropyridinium methylsulfate, 及びその同族体の Reissert-Henze 型の反応を試み、環の α 位にシアノ基を導入し、さらには定量的に加水分解するることにより、容易に、4-nitro-2-pyridinecarboxylic acid 及びその同族体を合成し得ること、またその際、ピリジン環の 2,6 位の双方がメチル基により置換されている場合には、8 位に於ける水酸アニオンによる求核反応が優先して、2,6-dimethyl-*N*-methoxy-4-pyridone が生成することを報告した。^{16), 17)}





Fig. 1-3

強力な電子吸引性のメゾメリーエフ果を示すニトロ基の導入は、ピリジン環の電子密度を下げ、求核反応を容易にすることが立証されたので、次いでピリジン環の β 位への炭素アニオンの導入を試みた。 β 位ハロゲンのオルト位にニトロ基をもつ化合物としての 3-bromo-4-nitropyridine N-oxide 類と数種の活性メチレン化合物のナトリウム塩との反応では、Fig. 1-4 に示すように、従来、非常に困難であったピリジン環の β 位への炭素アニオンの導入が容易に成し得ることが見出された。^{18,19)}




Fig. 1-4

特にアセト酢酸エチルを用いた場合、 β 位に導入されたアセト酢酸エチル基の今一つの活性水素(メチレン水素)は、酸性が増大し、脱離しやすく、過剰の塩基により引き抜かれ、アセチル基のカルボニル酸素がアニオンとして、ニトロ基のついた4位を、分子内求核攻撃し、その結果、フロ[3,2-C]ピリジン誘導体が生成されることが判明した。

以上のような研究結果をふまえて、さらにピリジン環への炭素アニオンの求核反応へ、研究が展開されてきた。すなわち、本研究は、求核攻撃を容易にするという配慮から、ニトロ基(-M 基)をピリドン環の3,5位に導入した種々の1-置換-2-ピリドン、

及び 4-ピリドン類を合成し、求核攻撃に対する反応性についての検討を目的とした。

ピリジンは、その環窒素の電子陰性度のため、それ自身でニロベンゼンと同じような電子分布を有しているが、3位及び5位にニトロ基が導入された 3,5-ジニトロ-2-ピリドン類のカルボニル基が、環状アミドのカルボニル基と考えられるため、電子吸引基としての効果 (-M 効果) が通常のカルボニル基ほど期待できはしないにも、これら 3,5-ジニトロピリドン類は、1,3,5-trinitrobenzene と同等、あるいはそれ以上の、強い親電子性を示すものと考えられる。

芳香系のポリニトロ化合物についての求核反応の例としては、1,3,5-trinitrobenzene が種々のケトンと、塩基の存在下、Meisenheimer complex を形成することが知られており、²⁰⁾ ケトン類の定性的な検出法としても用いられていた。²¹⁾ またアセトン・エナミンとでは、環の変換反応により、アニリンの誘導体が生成される²²⁾ 等の一連の報告がある。

従来、ピリドン類については、ニトロ化²³⁾ Friedel-Crafts 反応、²⁴⁾ 等の親電子反応、あるいは、Diels-Alder 反応、²⁵⁾ 光化学転位反応²⁶⁾ 等については検討はされているが、求核反応については、見るべきものがない。本研究は、このようなピリドン類の化学に於ける未開拓分野について、新知見を得ることを目的として行なった。

1-2 研究概要

種々の 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類(1)は、Diethyl acetonedicarboxylate (DADC)、あるいは、ethyl acetoacetate (EAA) のモノナトリウム塩 (Na·DADC, Na·EAA) によると

二度にわたる求核攻撃で容易に環の変換反応をおこし、2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol (**2a**)、あるいは、2-ethoxycarbonyl-4-nitrophenol (**4a**)、及びこれらの中の試薬の如何にかかわらず、基質、3,5-ジニトロ-1置換-2-ピリドン (**1**) の1置換基に対応した、N-置換ニトロイセトイミド類 (**3**) が得られた。





Fig. 1-5

特に、1置換基が2'ピリジル及びその同族体である場合は、最初に生じた *N*-(2-pyridyl)nitroacetamide 類 (**3**) の分子内脱水環化により、2-Oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-Oxide (**7f**)、及びその同族体に誘導されることが明らかになった。(2章2節、3節)

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (**1a**) と Na-DADC, Na-EAA との室温での反応で、*N*-methyl nitroacetamide (**3a**) 及び 2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol (**2a**)、

あるいは、2-ethoxycarbonyl-4-nitrophenol (**4a**) 以外と、それで水、対応する結晶 **8a**, **9a** が得られる。これらの中の生成物は、塩基と加熱すれば、**2a** あるいは **4a** と **3a** へ誘導された。



これらの中の実験事実と、 100MHz NMRスペクトル等の機器データから、これらの生成物、 $8a$, $9a$ は、 $1a$ とDADCあるいはEAAからなる二環構造の付加中間体、ビシクロ[3.3.1]オナ-3,7-ジエン誘導体であることを確認した。このような二環構造中間体は、ポリニトロベンゼン系での同様な反応で、塩構造として確認されていながら、ピリドン環ではこれまで未知で、しかもフリーな状態で単離されたのは初めての例と考える。(2章4節)

一方、3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone ($1a$)と種々のケトンとアミンからなる一種の Meisenheimer complex を合成して、それらの可視吸収スペクトルの吸収極大位置のちがいにより、求核試剤の攻撃位置のちがいを論じ、Hard, Soft の概念と結びつけることにより、3,5-ジニトロ-1置換-2-ピリドン (1)への Na-DADC, Na-EAA のようなケトエステル類のモノナトリウム塩の初期攻撃の位置が、環の4位、6位に置換基を持たない場合には、4位であると結論した。次いで生成した Meisenheimer complex の中の平衡、分子内電荷移動(プロトンの移動)による二つのメタ架橋した二環構造付加中間塩の形成、さらには1-2位間、4-5位間(母ピリドン環の1-6位間、3-4位間に相当)の異極分裂による環の変換により、フェノール誘導体 ($2a$, $4a$), N-置換ニトロアセトアミド (3)が生成される機構について言及した。(2章5節)。

3,5-Dinitro-1-methyl-4(or 6)-R-2-pyridone 類と Na-DADC, Na-EAA との反応についても検討を加えた。特に、Na-EAAとの反応で、1,4-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone ($1m$) と 1,6-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone ($1n$) から、同じ生成物 2-ethoxycarbonyl-3-methyl-4-nitrophenol ($4m$) が生成した。また、3,5-dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone ($1o$) と Na-EAA

との反応では、2-ethoxycarbonyl-5-methoxy-4-nitrophenol (**4o**) が得られた。二水の結果から、Na·EAAによる初期攻撃が、4,6位に置換基がない場合は4位であったのに対して、置換基が4位あるいは6位にある場合、置換基の電子的性質により、攻撃位置が変わり、置換基として、メチル基が4位についている場合は6位に、6位についている場合は4位K、またメトキシ基が4位についている場合は4位K、それを初期攻撃がおこり、すなわち、電子密度の比較的小い位置に初期攻撃がおこっていることが明らかになった。二水 **1m**, **1n**, **1o** と DADC からなる二環構造の附加中間体 (**8m**, **8n**, **8o**) も単離された。(2章6節)

3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン (**I**) とビニロガスな関係にある 3,5-ジニトロ-1-置換-4-ピリドン (**I**) と Na·DADCとの反応では、攻撃が4ピリドン環の2位及び6位Kおこり、母ピリドン環の2-3位間及び5-6位間の結合の開裂により環の変換及えをおこし、3,5-ビス(エトキシカルボニル)-1-置換-4-ピリドン (**III**) と 1,3-dinitropropan-2-one (ω, ω' -dinitroacetone) を生成するこを見出した。この 1,3-dinitropropan-2-one (**III**) は単離が




Fig. 1-7

できなかったので、benzenediazonium chloride を作用させ、1,3-dinitro-1-phenylhydrazonepropan-2-one (IV)、あるいは、1,3-bis(phenylhydrazone)-1,3-dinitropropan-2-one (V)に誘導して確認した。また V からは容易に脱亜硝酸を伴なった分子内環化反応をおこし、4-hydroxy-3-nitro-1-phenyl-5-phenylazopyrazole (VI) が得られた。この反応の過程については、2-ピリドンの場合と同様に考えれば、合理的に説明がつくものと考える。(3章)

次に、2-ピリドン環の1,6位をスタジエンユニットで閉環したとみなされる 1,3-dinitro-4-quinolizone (1p) では、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と異なった反応結果が得られた。すなわち、1,3-dinitro-4-quinolizone (1p) と Na·DADC, Na·EAA との反応により、diethyl 2,4-dihydroxy-5-nitroisophthalate (2p), ethyl 2,6-dihydroxy-4-nitrobenzoate (4p) が、それぞれ得られた。このことは、Na·DADC, Na·EAA が 1p の 2 位、さらに関いて 4 位 (カルボニル炭素) を攻撃した結果、生成したものと考えられ、先の 2-ピリドン系、4-ピリドン系では反応点とならなかったカルボニル炭素が親電子中心として、反応に関与していることが明らかになった。(4章)




Fig 1-8

最後に、数種の代表的な 3,5-ジニトロ-1-置換-2(or4)-ピリドンと sodium methoxide から形成される Meisenheimer complex の安定性をその可視部の吸収強度から、平衡定数を求めて、二点の値から、対応するベンゼン系、ピリジン系の Meisenheimer complex より安定であること、云いかえれば、原系の 2(or4)-ピリドン類の親電子性が大きいことを立証した。(5章)

第二章 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類 の環変換反応

2-1 はじめに

1,3,5-Trinitrobenzene の acetone-enamine の作用による N,N -dimethyl-4-nitroaniline の生成²²⁾ また sym-triazine と dimethyl sodioacetonedicarboxylate による dimethyl 4-hydroxy-3,5-pyridinedicarboxylate の生成²³⁾ 等にみられるように、電子欠乏性の芳香環と 2ヶの求核中心を持つ試薬との間で、求核的環変換反応が起こることが知られている。また 1,3,5-trinitrobenzene と、二求核中心性試薬、例えば、ethyl acetoacetate, acetylacetone 等との塩基存在下での反応で、二環構造の付加体が形成される事例についても報告されている^{24,25)}。

3位および 5位に 強力な電子吸引基 (-M 基) であるニトロ基を有する、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類は、1,3,5-trinitrobenzene 及び sym-triazine と同様、環の電子密度は小さくなっている、特に 2位、4位、及び 6位は強力な親電子中心となり得て、求核試薬との反応性が高いものと考えられる。




Fig.2-1

このように、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類は、sym-triazine 及び 1,3,5-trinitrobenzene の双方と類似の構造、性質をもつものとみなされ、これら 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と数種の二求核中心性試薬のモノナトリウム塩、例えば、diethyl sodioacetonedicarboxylate, ethyl sodioacetopyruvate, との反応について検討を加えた。次節以下にその結果について詳説する。

2-2 3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) の 環変換反応

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) は、 1-methyl-2-pyridone を発煙硝酸を用いてニトロ化することにより、 容易に得ることができる。 この 3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a)-を、 ピリジン中、 1.5 倍当量の diethyl sodioacetonedicarboxylate (Na-DADC) と 50 °C で加熱反応させ、 反応混合物より、 溶媒留去の後、 微酸性に pH を調節しクロロホルム抽出し、 シリカゲルカラムクロマトグラフィーを用いて分離精製した。 ベンゼン層から、 融点が 58.0~59.0 °C の無色板状晶 (2a) が、 またエーテル層から、 融点が 75.0~76.0 °C の無色針状晶 (3a) がそれぞれ得られた。 この生成物、 2a, は元素分析の結果から、 $C_9H_6N_2O_5$ の実験式をもち、 NMR スペクトルから、 2 ヶのエトキシカルボニル基、 また電子吸引基の影響により強く低磁場側へシフトした芳香環プロトンとみなされる等価性 2 ヶのプロトン、 さらには 12.4 ppm には重水交換により消失する水酸基によるみられる 1 ヶのプロトンのシグナルが確認された。 IR スペクトルからは、 ニトロ基 ($1540, 1340 \text{ cm}^{-1}$)、 エステルカルボニル基 (1720 cm^{-1}) 及び水酸基 (3100 cm^{-1}) の存在に基づくと考えられる各吸収がみられた。 塩化第二鉄反応によると深赤色を呈し、 フェノール性水酸基の存在が示唆された。 以上のデータから、 この生成物、 2a、 は 2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol (2a) と考え、 文献既知の方法により合成した 2-hydroxy-5-nitroisophthalic acid³⁰⁾ を、 エチルアルコール、 硫酸を用いて常法によりエチルエステル化した標品と、 機器データの比較及び混融試験により同定した。

生成物、 3a、 については、 元素分析の結果から、 $C_3H_6N_2O_3$

なる実験式をもつこと、NMRスペクトルから、 2.78 ppm ハダブレットの3プロトン、 5.16 ppm ハシングレットの2プロトン、また 7.00 ppm ハ重水交換により消失する N-H ハヨリと2.3水素1プロトンのシグナルがみられた。IRスペクトルは、ニトロ基($1570, 1340\text{ cm}^{-1}$)、アミドカルボニル基(1670 cm^{-1})、sec-アミノ基(3300 cm^{-1})の特徴的な吸収を示した。これらのデータ、及び Ratz の方法²⁹⁾より合成した *N*-methyl nitroacetamide (*3a*) と同定した。*2a*、*3a* の收率は、それぞれ、90.4%、28.3% であった。




Fig. 2-2

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (*1a*) と ethyl sodioacetate (Na·EAA) との同様な反応では、2-ethoxycarbonyl-4-nitrophenol (*4a*) と、Na·DADC を試薬用いた場合

と同じ生成物である *N*-methyl nitroacetamide (**3a**) が Table 2-1 に示す收率で得られた。

Table 2-1

Substrates	Reagents	Reaction Conditions				Products (Yields %)	
		Solvents	Mol. ratio	Temp. °C	Time h		
1a	Na·DADC	Pyridine	1.5	50	5	2a (90.4)	3a (28.3)
"	Na·EAA	"	3.0	70	5	4a (61.0)	"(16.9)
"	Na·AA	DMF	3.0	70	5	5 (53.0)	"(11.5)
"	Na·EAP	Pyridine	3.0	110	5	6 (42.0)	"(8.3)

β -ジケトンである acetylacetone (AA), ethyl acetopyruvate (EAP) のモノナトリウム塩 (Na·EAA, Na·EAP) と 3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (**1a**) との反応についても検討を加えた。 Acetylacetone のモノナトリウム塩がピリジンには難溶であったので、反応溶媒として DMF を用いたが、**1a** との反応で、生成物として、2-acetyl-4-nitrophenol (**5**)³²⁾ と、前二者の反応の生成物と同じ生成物である *N*-methyl nitroacetamide (**3a**) が得られた。 3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (**1a**) と ethyl sodioacetopyruvate (Na·EAP) との反応では、Na·EAP が他の試薬より反応性が低く、反応に高温を要したが、生成物として、2-ethoxallyl-4-nitrophenol (**6**) と今までの同型の反応の共通生成物である *N*-methyl nitroacetamide (**3a**) が、それそれ、Table 2-1 に示す收率で得られた。**6** の構造については元素分析、NMR、及び IR スペクトルデータによって決定した。

以上の実験結果から、生成されたフェノール誘導体（2a, 4a, 5, 6）の炭素骨格は、試薬として用いた、活性X-4レン化合物のカルボニル基、及びそのα, α'位炭素部分, $R-\overset{\text{CH}_2-CO-CH_2}{\text{---}}-\text{COR}'$ と、基質である2-pyridoneの4, 5, 6位に由来するものと考えられる。またもう一方の共通生成物, N-methyl nitroacetamide (3a)は、2-pyridone母核の1, 2, 3位に由来すること、すなわち、DADC, EAA等の二求核中心性の活性X-4レン化合物が、段階的に、2-pyridone環の4位、及び6位に求核的に攻撃付加し、環の開裂の結果、環の変換がおこったものと推測される。N-methyl nitroacetamide (3a)の収率が化学量論的に満足しうるものでないのは、この化合物が高度な酸性をもち、反応性に富んでいることによ起因していると思われる。

次に、この反応がβ-ケトエステルのような活性X-4レン化合物と、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類との一般的な反応であろうことを立証するために、種々の3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類を合成し、diethyl sodioacetonatedicarboxylate (Na-DADC), ethyl sodioacetoacetate (Na-EAA)との反応について検討を加えた。

2-3 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類の 環変換反応

3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類の1-置換基として、 π -nitrobenzyl (1b), 2'-pyridylmethyl (1c), H (1d), 2',4'-dinitrophenyl (1e), 2'-pyridyl (1f), 2'-(4'-methyl)pyridyl (1g), 2'-(5'-methyl)pyridyl (1h), 2'-(6'-methyl)pyridyl (1i), hydroxy (1j), methoxy (1k), 及び π -nitrobenzyl oxy (1l)を含めし、diethyl sodioacetonatedicarboxylate (Na-DADC),

ethyl sodioacetoacetate (Na-EAA) との反応を行なった。

Na-DADCとの反応では、**1a**とNa-DADCとの反応の生成物と同じ、2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol (**2a**)と、それを **1b~1l** のN-置換基に対応したN-置換アセトアミド類(**3**)が得られた。また、Na-EAAとの反応では、2-ethoxycarbonyl-4-nitrophenol (**4a**)と、この場合も基質のN-置換基に対するN-置換ニトロアセトアミド類(**3**)が得られた。結果をTable 2-2に示した。




Fig. 2-3

N-置換ニトロアセトアミド類(**3**)の構造については、NMR、IR、元素分析の各データ、及びN-methyl nitroacetamide (**3a**)との類比によって決定した。得られたN-置換ニトロアセトアミド類(**3**)の特徴的なNMR、IRデータをTable 2-3に示した。

Table 2-2










Substrates	Reactions with Na-DADC at 50°C			Reactions with Na-EAA at 70°C		
	Products (Yields %)			Products (Yields %)		
1b R = -CH ₂ - 	2a (95.5)	3b (77.9)		4b (60.8)	3b (53.4)	
1c R = -CH ₂ - 	✓ (95.0)	3c (42.0)		✓ (51.2)	3c (23.2)	
1d R = -H	✓ (42.5)			✓ (21.9)		
1e R = 	✓ (57.0)	3e (43.0)		✓ (50.6)	3e (38.7)	
1f R = 	✓ (92.8)	3f (84.2)	7f (3.8)	✓ (63.5)	3f (52.0)	7f (3.5)
1g R = 	✓ (77.2)		7g (63.2)	✓ (52.0)		7g (43.2)
1h R = 	✓ (78.5)	3h (59.7)	7h (29.2)	✓ (13.4)	3h (18.8)	7h (1.4)
1i R = 	✓ (82.4)	3i (39.5)	7i (38.6)	✓ (63.4)	3i (17.8)	7i (41.5)
1j R = -OH	✓ (96.6)			✓ (83.4)		
1k R = -OCH ₃	✓ (98.1)	3k (11.1)		✓ (86.5)	3k (10.5)	
1l R = -OCH ₂ - 	✓ (98.0)	3l (38.5)		✓ (88.1)	3l (35.2)	

Table 2-3

Nitroacetamides O_2NCH_2CONHR	I: R			N M R		
	ν_{NH}	$\nu_{C=O}$	ν_{NO_2}	$\delta \oplus$	$\delta \ominus$	Solvents
3a R = -CH ₃	3300	1670 cm ⁻¹	1570, 1340 cm ⁻¹	5.16 ppm	7.00 ppm	Acetone d-6
3b R = -CH ₂ - 	3300	1660	1525, 1355	5.38	9.10	"
3c R = -CH ₂ - 	3170	1690	1565, 1340	5.40	8.20	"
3e R = - 	3300	1690	1540 1340	5.62	11.10	DMSO d-6
3f R = - 	3300	1690	1540 1340	5.62	9.85	Acetone d-6
3h R = - 	3290	1680	1545 1340	5.52	10.98	"
3i R = - 	3300	1690	1530 1350	5.62	9.95	"
3k R = -OCCH ₃	3225	1690	1550 1330	5.15	11.70	"
3l R = -OCH ₂ - 	3125	1675	1575 1345	5.18	11.80.	"

基質の 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類(1)の1-置換基が 2'-pyridyl(1f) 及びその同族体(1g, 1h, 1i)の場合には、N-(2-pyridyl)nitroacetamide(3f) 及びその同族体(3g, 3h, 3i)以外に、高い分解率をもつ黄色結晶(7f, 7g, 7h, 7i)が得られた。これらのうち、特に 7f について詳説すると、元素分析の結果から、 $C_7H_5N_3O_2$ なる実験式をもち、N-(2-pyridyl)nitroacetamide(3f)の分子式 $C_7H_7N_3O_3$ から H_2O を差し引いた分子式に相当することが判った。また得られた 7f の融点測定を除して、徐々に加熱すると、120°C付近で結晶の変化が見られ、さらに加熱を続けると、7f と同じ分解を伴う融点を示した。




Fig. 2-4

単離した N -(2-pyridyl)nitroacetamide(3f)を水に懸濁させ加熱することにより、容易に且つ定量的に 7f が生成された。またニトロ酢酸エチルと2-アミノピリジンを直接混合加熱しても、7f が得られることが立証された。

一方、7f をエタノール中、ラネーニッケル触媒を用いて、加圧還元すれば、ethyl 2-pyridylcarbamate³³⁾が得られることが、

7_f K $\text{C}_\text{N}-\text{CO}-$ 骨格が存在していることが示唆された。IRスペクトルからは、 $1730, 1650, 1210 \text{ cm}^{-1}$ K. それと、 $\text{C}=\text{O}, \text{C}=\text{N}, \text{N}\rightarrow\text{O}$ 結合に特徴的な吸収がみられた。 7_f のトリフルオロ酢酸-d 中のNMRスペクトルからは、ピリジン環の環プロトンK由来する 4 个のプロトンK相当するシグナルがみられ、あと 1/2 分のプロトンシグナルは観察されなかつた。

上記の実験結果、及び機器データを総合して、この生成物、 7_f は 2-OXO-2,5-dihdropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide (7_f) と考えるのが最も妥当であろう。 $\text{7}_g, \text{7}_h, \text{7}_i$ Kについても、上記と同様の挙動を示すことから、それぞれ、8-methyl-2-OXO-2,5-dihdropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide (7_g)、7-methyl-2-OXO-2,5-dihdropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide (7_h)、6-methyl-2-OXO-2,5-dihdropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide (7_i) と考えられる。

$\text{3}(\text{f}, \text{g}, \text{h}, \text{i})$ から、 $\text{7}(\text{f}, \text{g}, \text{h}, \text{i})$ の形成は、3 の N-置換基である 2-ピリジル基の環窒素の非共有電子対がニトロ基の正電荷を帯びる窒素原子へ分子内で配位し、六員環が形成され、さらK脱水Kより安定化するためと解される。

以上述べたように、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン(1)の 1-置換基を、アルキル基(a, b, c)及び水素(d), アリール基(e, f, g, h, i), 水酸基(j)及びアルコキシ基(k, l)と種々変化させた場合も、Na·DADCとの反応では、2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol (2a) と N-置換ニトロアセトアミド (3) が、また Na·EAAとの反応では、2-ethoxycarbonyl-4-nitrophenol (4a) と N-置換ニトロアセトアミド (3) が生成されることが判明した。これらのことから、第2章2節で述べたように、アノール誘導体 (2a, 4a, 5, 6) の骨格が試薬に使用した活性 X 4

レン化合物の-C-CO-C-部分と2-ピリドン母核の4,5,6位炭素へ由来していることが確認され、試薬の攻撃位置が、2-ピリドン母核の4位と6位であり、続いて、2-ピリドン母核の3-4位間及び1-6位間の結合が、それと、2-ピリドン母核の3位及び1位へ電子対を残す型のヘテロリシスにより環の変換がおこったものと考えられる。

2-4 3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) と DADC, EAA による二環構造中間体

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) をピリジン中、1.5倍量の diethyl sodioacetonedicarboxylate (Na·DADC) と、25°Cにて5時間放置後、使用したナトリウムと当量の希塩酸を加え、溶媒のピリジンを除去。以下常法により分離精製すれば、少量の 2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol (2a) と、N-methyl nitroacetamide (3a) 以外に、155.0~156.0°Cの融点を示す無色板状結晶 (8a) が得られた。この生成物 8a は、エタノール中、sodium ethoxide と加熱するか、ピリジン中、Na·DADC と加熱すれば、2a と 3a が生成された。また25°Cにて放置後、一部を上記のように処理し、他の一部をさらK 50°Cまで加熱し処理したところ、前者からは、8a が主生成物とし、その後者からは、2a と 3a が得られることが確認した。生成物 8a は、元素分析の結果から、 $C_{15}H_{19}N_3O_{10}$ の実験式をもち、試薬の diethyl acetonedicarboxylate と基質の 3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone の付加体としての分子式に一致することがわかった。IRスペクトルから、カルボニル基 (1740 cm^{-1})、ニトロ基 ($1550, 1340\text{ cm}^{-1}$) の存在が示唆された。これらの実験事実、データ及び以下詳説する NMRスペクトルデータから、低温K

Δ における反応のこの生成物 **8a** は、下図に示すような 3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (**1a**) と diethyl acetonatedicarboxylate からなる二環構造の付加中間体、6,8-bis(ethoxycarbonyl)-3,7-di-hydroxy-4,9-dinitro-2-methyl-2-azabicyclo[3.3.1]nona-3,7-diene (**8a**) であることを確認した。





Fig. 2-5

基質の 3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (**1a**) にみられた低磁場側のピリドン環の環プロトン、及び diethyl acetonatedicarboxylate の X4 レンプロトンによるシグナルは消失し、4~5.5 ppm に至るカップリングしたままいるプロトンのシグナルが観察された。橋頭位である 1 位のプロトンは、5.15 ppm とかなり低磁場側に現われ、9 位プロトン (5.42 ppm)、及び今一つの橋頭位である 5 位のプロトン (4.42 ppm) と、それそれ、4 及び 3 H₃ のカップリング定数をもつてカップリングしており、5 位のプロトンは、また 9 位のプロトン、及びエトキシカルボニル基のついた 6 位のプロトン (3.95 ppm) と、それそれ、4 及び 2 H₃ の J 値でカ

ップリシングをしている。また重水交換により消滅する7位のエーテル性水酸基プロトンが12.64 ppm Kシングレットとして観察され、18.82 ppm K現われる暗いシグナルはFig 2-5 K示すようK、ニトロ基と強く水素結合しているエーテル性の水酸基プロトンであると考えられる。

一方、3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) と ethyl sodium acetoacetate (Na·EAA) の低温での反応においても、先の 1a と Na·DADCとの反応の場合と同様K、3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone と ethyl acetoacetate からなる二環構造中間体、3,7-dihydroxy-4,9-dinitro-8-ethoxycarbonyl-2-methyl-2-azabicyclo [3.3.1] nona-3,7-diene (9a) が形成されることがわかった。(Fig. 2-6)



1位プロトン (4.71 ppm) は、5位プロトン (4.30 ppm), 及び9位プロトン (5.30 ppm)と、それと/or、2及び3H₃のJ値でカップリングし、5位プロトンは6位の2ケのプロトン、及び9

位のプロトンとも 2, 4, 及び $3H_3$ で、それぞれカップリングしている。また $8a$ と同様に、 $12.59, 18.83\text{ ppm}$ の重水交換により消滅する水酸プロトンに基づくシグナルが観察された。 $8a, 9a$ の 1 位プロトンの帰属については、2 章 6 節で述べた 1 位あるいは 5 位に置換基を持つ二環構造中間体の NMR スペクトルと参考合わせても合理的なものと考えられる (Table 2-6 参照)。また基質の $1a$ においても、6 位プロトンが 4 位プロトン ($8a, 9a$) においては、1 位、5 位に相当) より約 0.5 ppm ばかり低磁場側にシフトしていることとも一致している。

これら二環構造中間体は、小橋等²⁹⁾あるいは Strauss 等²⁸⁾によって報告されている 3,5-dinitro-1-X-benzene ($X = CN, COOEt, NO_2$) と ethyl acetoacetate, acetone、あるいは acetylacetone 等と塩基によって形成される二環構造中間体 (Fig. 2-7) と同様な結果であると考えられる。

ピリドン環系では、ポリニトロベンゼン系と同様な二環構造中間体を単離した例はまだなく、今回の単離が初めての例であり、且つポリニトロベンゼン系ではこの二環構造化合物が何らかの塩として論議されているが、こ




Fig 2-7

こでは、 $8a, 9a$ のようにフリーな形で単離されることがわかつたがこのことは新しい事実であると言える。

中間体 $8a, 9a$ が単離できることから、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類 (I) と二求核中心性活性メレン化合物のモノナトリウム塩との反応は、先ず、2-ピリドン環の 4 位あるいは 6 位への炭素アニオンの攻撃により、Meisenheimer complex

が形成され、今一つの活性位のプロトンが、過剰の塩基あるいは分子内的に引抜かれて、新しい求核中心を生じ、それが2-ピリドン環の残された6位あるいは4位を攻撃し、二環構造付加中间塩を形成し、環の開裂により、フェノール誘導体及びN置換ニトロアセトアミド類が生成されることが立証されたものと考える。しかしながら、初期攻撃が2-ピリドン環の4位に起ころのか、あるいは6位に起ころのかについては、次節の機構的考察の中で解明していく。

2-5 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と活性メチレン化合物のモノナトリウム塩の反応機構についての考察

1,3,5-Trinitrobenzene, あるいはジニトロベンゼン誘導体又 sodium methoxide, あるいは、塩基の存在下、種々のケトンと Meisenheimer complex を形成することはよく知られており、前述の Strauss の総説²⁰⁾にも詳しく論じられている。





Fig. 2-8

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a)も cyclopentanone, cyclohexanone, acetone, diethylketone, acetophenone, diethyl malonate 等の活性水素を有する化合物とジエチルアミンの存在下、1a：試薬：アミンの比が 1 : 1 : 1 の付加体である一

種の Meisenheimer complex が形成されることが判明した。これらのコンプレックスの主な分光学的データ及び NMR データを Table 2-4 に示した。

ここで Meisenheimer complex の可視部の吸収スペクトルについて注目すると、 λ_{max} が 460~480 nm にある一群のコンプレックス、Type A, と λ_{max} が 440~450 nm にある一群のコンプレックス、Type B, に分けることができる。



Type A (λ_{max} 460~480 nm) Type B (λ_{max} 440~450 nm)

Fig. 2-9

Meisenheimer complex の形成に際して、活性水素化合物から形成される炭素アニオンが攻撃し得る位置は、2-ピリドン環の 2, 4, 6 位が考えられるが、そのうち特に、4 位あるいは 6 位が 3, 5 位のニトロ基の大きな-M 効果で優先するものと考えられ、実験的にも、先の二環構造中間体から、反応実心 4 位及び 6 位であることが解明されている。そのうち、活性水素化合物が 2-ピリドン環の 6 位を攻撃して形成された Meisenheimer complex の方が、2-ピリドン環の 4 位を攻撃して形成された Meisenheimer complex よりも負電荷が非局在化しており、安定であり、従って、より長波長側に吸収を持つものと考えられる。この事は、trinitrobenzene とケトン、アミンから得られる Meisenheimer complex において、炭素アニオンが攻撃した位置のパラ位のニト

Table 2-4

Meisenheimer complexes		UV		IR		NMR		
	Components	$\lambda_{max} (\epsilon \times 10^4)$	$\nu_{C=O}$	$\nu_{C=C}$	$H_\alpha (J)$	$H_\beta (J)$	CH_3	Solvents
Type A								
A-1	$1a, O=\square, NH(Et)_2$	483 (2.77)	1740, 1630	1620	9.54 (d, $2H_b$)	5.13 (m)	2.62	DMSO d-6
A-2	$1a, O=\square, NH(Et)_2$	480 (2.66)	1690, 1630	1620	9.25 (d, $1H_b$)	5.19 (t, $1H_b$)	2.00	Pyridine d-6
A-3	$1a, (CH_3)_2CO, NH(Et)_2$	479 (2.91)			8.50 (d, $1H_b$)	5.01 (dt, $1H_b, 5H_b$)	2.81	DMSO d-6
A-4	$1a, (Et)_2CO, NH(Et)_2$	480 (1.86)	1720, 1635	1615	8.67 (d, $1H_b$)	5.23 (m)	2.63	"
A-5	$1a, R_1COCH_3, NH(Et)_2$	480 (1.08)	1680, 1620	1610	8.43 (d, $1H_b$)	5.16 (dt, $1H_b, 5H_b$)	2.80	"
A-6	$1a, R_1COCH_3, NH(Et)_2$	481 (2.08)	1640	1590	8.50 (d, $1H_b$)	5.01 (dt, $1H_b, 3H_b$)	2.80	"
A-7	$1f, CH_2=CHOEt$	465 (1.95)		1710	1630	8.61 (d, $1H_b$)	5.25 (m)	"
Type B								
B-8	$1a, CH_2(COOEt)_2, NH(Et)_2$	449 (1.08)	1740, 1640	1615	8.68 (d, $1H_b$)	5.46 (dd, $1H_b, 2H_b$)	2.88	"
B-9	$1a, MeOH, NH_2CH_2NH_2$	449 (0.53)	1665	1635	8.70 (d, $1H_b$)	5.91 (d, $2H_b$)	2.96	"
B-10	$1a, MeONa$	450 (3.15)			8.71 (d, $1H_b$)	5.94 (d, $2H_b$)	2.99	Methanol d-4

ロ基が、両オルト位のニトロ基よりも Meisenheimer complex の
安定性の寄与が大きいという既知の考え方²⁰⁾ にも合致する。




Fig 2-10

以上の考え方、及び以下に述べる事実から、Type A に属する Meisenheimer complex は、2-ピリドン環の 6 位に攻撃が起って形成されたもので、Type B に属する Meisenheimer complex は 4 位に攻撃が起って形成された Meisenheimer complex であることが云い得る。

筆者ら研究室での研究データ^{24,25)} は、3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (**1a**) と ethyl vinyl ether をピリジン中で混合すると、**1a** : ethyl vinyl ether : pyridine が 1 : 1 : 1 からなる Meisenheimer 型の付加体が形成されること、また 3,5-dinitro-1-(2'-pyridyl)-2-pyridone (**1f**) と ethyl vinyl ether では、DMF 中 **1f** と ethyl vinyl ether




Fig. 2-11

が 1:1 の付加体が形成されることを明らかにしている。(Fig 2-11)
後者は、1-位についていか 2'-ピリジル基がピリジニウム塩となり、
安定化したものと考えられ、構造的にも ethyl vinyl ether が 2-ピ
リドン環の6位を攻撃したとするのが最も妥当である。また、
これらのどちらの付加体も可視吸収スペクトルにおいて、それを
も 481, 465 nm に吸収極大を示す Type A に属する complex であ
る。一方、後述するが、種々の 3,5-ジ

ニトロ-1-置換-2-ピリドン類と sodium methoxide からは、450 nm 附近に吸収
極大を示す Type B に属する一群の Meisenheimer complex が形成されるこ
とがわかった。

今、これら Meisenheimer complex の吸収極大位置の相違
から推定される 2-ピリドン環の反応性に関する、求核試薬へ、
Hard, Soft の概念を適用して考えると、Type A に属する付加
体を形成する試薬は ethyl vinyl ether を代表として比較的 Soft
な求核試薬であり、Type B に属する Meisenheimer complex を形
成する試薬は比較的 Hard な求核試薬であり、メトキシドイオン
がその代表的なものである。本研究において試薬として用ひて
いる diethyl sodioacetonedicarboxylate, ethyl sodioacetoacetate
は、これら求核試薬の中では比較的 Hard な試薬であり、メトキ
シドイオンと、マロン酸ジエチルアニオンの中間に位置する。
したがって、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と diethyl sodio-
acetonedicarboxylate, ethyl sodioacetoacetate との反応では、ま
ず 2-ピリドン環の 4 位に求核的攻撃がおこり、Type B に属す
る Meisenheimer complex が形成されるものと考えられる。

基質の 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類の 4 位は、その両




Fig. 2-12

オルト位である 3 位及 α -5 位のニトロ基の強力な電子的効果により、強く、正の Charge 性を帶びてゐる。それに對して、2-ピリドン環の 6 位は、環窒素の非共有電子対の 5 位ニトロ基に起因する、直接的な共鳴関与により、その Charge 性が抑制されており、4 位の方




Fig. 2-13

が、より電子欠乏状態にあると考えられる。そのため、比較的 Hard な試薬が Charge 性の強い 4 位を、また比較的 Soft の試薬が Charge 性の弱い 6 位を攻撃するものと考えられる。

上述した、3,5-dinitro-1-(2'-pyridyl)-2-pyridone (1f) の 6 位と Soft 試薬の代表である ethyl vinyl ether が求核攻撃して形成された付加体 (Fig. 2-11) は、そのピリドン環の 4 位がまだ親電子性を有しているため、もう 1 分子の ethyl vinyl ether の求核攻撃を 4 位に受け、下図に示すような 2 つの 1,2-オキサジリン環を有する 3. If と ethyl vinyl ether の比べ 1 対 2 の付加体を生じること、




Fig. 2-14

さて、二で得られた 1 対 2 付加体は、2-ピリドン環を有しており、2-ピリドン環の ethyl vinyl ether (electron rich), あるいは、acrylonitrile (electron poor) の何れとも付加し、1 対 3 付加体を生じる。いわゆる cationic polar cycloaddition, および Diels-Alder 反応の両方の反応が考えられる興味ある結果も得られていい。³⁵⁾




Fig. 2-15

以上の実験結果及び考察から、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と diethyl sodioacetonedicarboxylate, ethyl sodioacetoacetate のような炭素アニオンとの反応の一例は、まず 2-ピリドン環の 4 位に、炭素アニオンが求核攻撃をし、次ページ Fig 2-16 に示す Meisenheimer complex 10 あるいは 11 が形成される。この反応は原系と可逆的であり、従って 10 と 11 も平衡関係にあるものと考えられる。もちろん、求核試薬に diethyl sodioacetone-dicarboxylate を用いた場合は、この 10 と 11 は全く同じものである。さてこの Meisenheimer complex の付加した活性水素化合物から、分子内プロトン移動により、新しいアニオン中間体が形成される。この時に、diethyl sodioacetonedicarboxylate との反応の場合は、導入された diethyl acetonedicarboxylate 部分の内の、活性 X チレンあるいは活性 X キノンの何れかから、プロトンの




Table 2-16

脱離が容易である ($11 \longrightarrow 12$ or $13'$ $R' = COOEt$) が、2-ヒドロン環の5位のニトロ基の-E効果で生じる6位の電子欠乏を中和し得るのは、構造的見地から、活性メチレンから脱アロトンにより生じた素アニオン 12 のみが可能であり、活性メチンから脱アロトンにより生じた素アニオン $13'$ は隣接カルボニル基への電子供与によるエノール型への移行平衡のみが可能と考えられる。

一方、ethyl sodioacetoacetate を求核試薬として用いた場合には、二種の Meisenheimer complex, 10 と 11 ($R' = H$) が考えられるが、 10 の活性メチン水素とメチル水素の酸性に大きな差があるため、 10 からの脱アロトンは、活性メチル素からおこり、アニオン中間体 13 が 14 へ優先して生じる。しかし、 13 が形成されたとしても、 $13'$ と同様に二環構造中間体への安定化は構造的に不可能である。それに対して、Meisenheimer complex 11 からは、活性メチレン位での脱アロトンにより生じた、アニオン中間体 12 を経由して、電荷分離の少ない二環構造中間体 15 への移行が容易である。こうして形成された二環構造中間体 15 は、加熱により、1-2位間(母ヒドロン環の1-6位間)がN-アニオンとして、さらに4-5位間(母ヒドロン環の3-4位間)が、4位(母ヒドロン環の3位)へ電子対を残し開裂し、エノール誘導体($2a, 4a$)及びニトロアセトアミド誘導体(3)のアニオンが形成されるものと考察した。一方、二環構造中間体アニオン 15 を加熱することなく、中和すれば、化合物 $8a, 9a$ が単離されるものと考えられる。

以上のように考えれば 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ヒドロン類と diethyl sodioacetonedicarboxylate, ethyl sodioacetoacetate 等の二求核中心性試薬との環置換反応について合理的に説明がつき、 $9a$ の構造等も矛盾なく説明できる。


2-6 3,5-ジニトロ-1-X 4ル-4(or 6)-置換-2-ピリドン類の 環変換反応。

前節で解説した β -ケトエステルのモノナトリウム塩との反応の初期攻撃点に置換基を持つ 3,5-ジニトロ-2-ピリドン誘導体の反応に対する挙動について検討を加えた。2-ピリドンの母核炭素に置換基をもつ化合物として、1,4-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1m**)、1,6-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1n**)、及び 3,5-dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone (**1o**) を用い、diethyl sodioacetonedicarboxylate、ethyl sodioacetoacetateとの反応を試み、反応性及び反応の方向性に対する置換基の影響について吟味した。

また、diethyl sodioacetonedicarboxylateとの反応について、4-X 4 ル体である 1,4-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1m**)、及び 6-X 4 ル体の 1,6-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1n**) の双方から、同一の生成物、2,6-bis(ethoxycarbonyl)-3-methyl-4-nitrophenol (**2m**) と N-methyl nitroacetamide (**3a**) が得られた。さるK、**1m** からは、50°C の反応においても、かなり多量の二環構造中間体である 6,8-bis(ethoxycarbonyl)-2,5-dimethyl-3,7-dihydroxy-4,9-dinitro-2-azabicyclo[3.3.1]nona-3,7-diene (**8m**) が得られた。反応温度をさるK 高温K しても、その収率に顕著な変化はみられなかった。また **1n** からは、二環構造中間体、6,8-bis(ethoxycarbonyl)-1,2-dimethyl-4,9-dinitro-7-hydroxy-3-oxo-2-azabicyclo[3.3.1]non-6-ene (**8n**) は、単離されにくく、25°Cでの反応でも、かなりの量の **2m** を伴なって低収率でしか得られなかつた。

4-X トキシ体である 3,5-dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone (**1o**) と diethyl sodioacetonedicarboxylateとの反応では、2,6-bis(ethoxycarbonyl)-3-methoxy-4-nitrophenol (**2o**) と微量の、

N-methyl nitroacetamide (**3a**) 及び α' -6,8-bis(ethoxycarbonyl)-4,9-dinitro-7-hydroxy-5-methoxy-2-methyl-3-oxo-2-azabicyclo[3.3.1]non-7-ene (**8o**) が得られた。これらの中間体、生成物等について、次ページの Table 2-5 にまとめて示す。



1m: R=Me, R'=H

2m: R=Me

3a

1n: R=H, R'=Me

2o: R=OMe

1o: R=OMe, R'=H





Fig. 2-17

得られた二環構造中間体、**8m**, **8n**, **8o** のうち、**8n**と**8o**は、**8m**あるいは、4節で述べた**8a**, **9a**と異なり、3位に水酸基を持たず、4位のニトロ基のついている炭素に水素をもち、3位(母ピリドン環の2位に相当する)は、カルボニル基として存在するところが、NMR (100 MHz) データから明らかになった。このことは、二環構造中間体が、ケト型とエノール型の互変異性関係にあり、そのうち、**8a**, **9a**, **8m**では、すべてがエノール型を

Table 2-5

Substrates	Reaction Conditions				Products (Yields %)		
	Reagents	Mol. ratio	Temp. °C	Time h			
1m	Na·DADC	1.5	50	5	2m (63.9)	3a (17.2)	8m (23.6)
1n	"	"	"	"	" (93.6)	" (25.9)	-
1o	"	"	"	"	2o (62.2)	" (8.5)	8o (24.5)
1m	"	3.0	70	"	2m (62.7)	" (16.8)	8m (23.6)
1o	"	"	"	"	2o (64.2)	" (7.1)	8o (22.1)
1m	"	1.5	25	"	2m (3.8)	-	8m (86.2)
1n	"	"	"	"	" (34.6)	" (7.8)	8n (46.7)
1m	Na·EAA	3.0	70	"	4m (48.3)	" (8.3)	-
1n	"	"	"	"	" (51.4)	" (11.3)	-
1o	"	"	"	"	4o (9.6)	-	-

とり、 $8n$ と $8o$ では、大部分がケト型をとっていることを示唆しているかのと考えられる。 $8n$, $8o$ においても、極めて弱いが、19 ppm付近K. エノール型に由来する水酸基70%トンのシグナルがみられることがある。ケトーエノール平衡の存在がわかれ。これら二環構造中間体の詳しいNMRデータを Table 2-6 に示す。

一式、ethyl sodioacetoacetateとの反応においても、4-X4'ル体である 1,4-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone ($1m$) と、6-X'ル体である 1,6-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone ($1n$) の双方から、同一の生成物、 $4m$ が得られた。その構造は、元素分析、IR, NMRスペクトルデータ等から、2-ethoxycarbonyl-3-methyl-4-nitrophenol ($4m$) であることを確認した。(Fig 2-18)

Table 2-6

	①	②	③	④	⑤	⑦	⑧	⑨
8a		H. 5.15 (dd, 4, 3H)	N-CH ₃ 3.20(s)	OH 18.82(s)	H. 4.42 (dd, 2, 3H)	H. 3.95(d, 2H) COOG ₂ H ₅ 1.42(t, 7H)	OH 12.64(s)	H. 5.42 COOG ₂ H ₅ 1.35(t, 7H) 4.29(4, 7H)
8a		H. 4.71 (dd, 3, 2H)	N-CH ₃ 3.20(s)	OH 18.83(s)	H. 4.30 (dd, 3, 4H)	H. 2.84 (d, 4H) H. 2.99 (d, 2H)	OH 12.59(s)	H. 5.30 COOG ₂ H ₅ 1.41(t, 7H) 4.37(8, 7H)
8n		H. 4.85 (d, 3H)	N-CH ₃ 3.16(s)	OH 18.01(s)	CH ₃ 1.65(s)	H. 4.24(s) COOG ₂ H ₅ 1.35(t, 7H) 4.27(8, 7H)	OH 12.41(s)	H. 5.82 COOG ₂ H ₅ 1.41(t, 7H) 4.38(8, 7H)
8o		CH ₃ . 1.53(s)	N-CH ₃ 3.05(s)	OH 18.34(s)	H. 5.77 (d, 4H)	H. 4.37 (dd, 4, 6H) 4.27(8, 7H)	COOG ₂ H ₅ 1.28(t, 7H) 4.27(8, 7H)	H. 3.72(s) COOG ₂ H ₅ 1.35(t, 7H) 4.31(8, 7H)
8o		H. 4.93 (d, 4H)	N-CH ₃ 3.16(s)	OH 18.10(s)	H. 6.17 (s)	H. 3.90(s) COOG ₂ H ₅ 1.32(t, 7H) 4.30(8, 7H)	OH 12.38(s)	H. 6.09 COOG ₂ H ₅ 1.45(t, 7H) 4.39(t, 7H)




Fig. 2-18

この**4m**が5-Xキル体でなく、3-Xキル体であることは、
4mのNMRスペクトルの芳香環プロトンが互いに、9.5H₃のJ値
 でカップリングしていることから、オルト水素の存在、すなわち
 Xキル基が3位にあると判定した。

4-Xトキシ体である 3,5-dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone
 (**10**) と ethyl sodioacetateとの反応では、微量(9.6%)では
 あるが 2-ethoxycarbonyl-5-methoxy-4-nitrophenol (**4o**)が得ら
 れることが明らかになった。




Fig. 2-19 **10** **4o**

生成物、**4o** のメトキシ基の位置については、**4o** の NMR スペクトルデータによつて。すなわち、2ケの芳香環プロトン (6.51 ppm , 8.48 ppm) がカップリングを示してゐないところ、この2ケのプロトンが互いにパラ位にあり、従つて、メトキシ基が5位にあると判断した。

これらの生成物、2-ethoxycarbonyl-3-methyl-4-nitrophenol (**4m**)、2-ethoxycarbonyl-5-methoxy-4-nitrophenol (**4o**) から母核炭素に置換基を持つ2-ピリドン、1,4-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1m**)、1,6-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1n**)、3,5-dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone (**1o**) と、ethyl sodioacetooacetate (Na-EAA)との反応について、以下のように考察した。すなわち、**1m**、**1n**との反応では、ethyl acetooacetate のX4レン炭素が、X4ル基についているピリドン炭素を、また、**1o**との反応では、メトキシ基についている6位を攻撃していること、云ふかえれば、ethyl acetooacetate のアセチル基のX4ル炭素が**1m**、**1n**のX4ル基についている炭素を、また、**1o**のメトキシ基についている炭素を攻撃しているものと推測される。3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドンと ethyl acetooacetateとの反応では、種々の平衡を考えられるが、第一段の攻撃は、ethyl acetooacetate のX4ル炭素により、第二段の攻撃がX4レン炭素によりおこり二環構造中間アニオンが形成されることが前節で述べられたが、この考え方をニニにも適用すれば、ethyl sodioacetooacetate のアセチル基のX4ル炭素による第一段の攻撃が、2-ピリドン環の4,6位のうち、電子密度の比較的小さい炭素、すなわち、メチル置換体では、X4ル基についていない炭素 (メチル基はその+I効果あるいは超共役により、そのつれてX4ル炭素の電子密度を増可) に、またメトキシ体では、メトキシ基のつ

ここでいふる収率(メトキシ基の一効果は、メトキシ基のついた二つの収率上の電子密度を下げる)に起つたことを示していふ。このように考えれば、生成物、フェノール誘導体の置換基の位置も合理的に説明でき、前節における 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と β -ケトエステルのモノナトリウム塩との反応機構に対する考え方の妥当性が示されたものと思う。

今、これら 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と diethyl sodioacetonedicarboxylate, ethyl sodioacetooacetate のような β -ケトエステルのモノナトリウムによる環変換反応における二環構造中間体アニオンの形成については、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と β -ケトエステルのモノナトリウム塩をそれぞれ、下図に示すように考えれば、allyl cation (3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン) と allyl anion (β -ケトエステル・モノナトリウム塩) との、すなわち、2電子系と4電子系との (4+2) 環状付加反応との類似性がみられ、これらの観察は、他の反応にも適用できるものと考える。




Fig. 2-20

2-7 実験の部

融点は硫酸浴を用いて測定したもので、すべて未補正である。元素分析は、柳本 CHN コーダー MT-2 型によった。IR スペクトルは、日立分光光度計 EP I-2 型を使用し、Nujol mull として測定した。可視紫外スペクトルは、日立分光光度計 EPS-3 型を使用し、メタノール中で測定した。NMR スペクトルは、日立 20-B 型、及び日本電子 FX-100 型（特に記していなければ前者）を用い、TMS を内部標準として測定した。次章以下の実験の部についても同様である。

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a)

比重 1.52 の発煙硝酸 50cc に、5.0g の 1-methyl-2-pyridone³⁶⁾ を溶かし、80°C にて 5 時間加熱、減圧下、できるだけ濃縮し、碎氷を加えて析出する沈殿を汎取、水から再結晶。4.7g (51.4%) の 3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) が得られた。mp. 178.0 ~ 179.0°C. (Lit. mp. 178°C)³⁷⁾. IR: 1700 cm⁻¹ (C=O), 1530, 1350 (NO₂). NMR (DMSO d-6): δ 3.65 (3H, s), 8.93 (1H, d), 9.52 (1H, d).

3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類 (1) と活性メチレン

化合物のモノナトリウム塩の反応の一報法

3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン (1) のピリジン溶液に、冷却下、活性メチレン化合物のモノナトリウム塩 (1.5 ~ 3.0 倍当量) のピリジン溶液を加え、5 ~ 10 時間、所定の温度に保つ。反応終了後、溶液のピリジンを減圧下留去、希塗酸で pH 3 ~ 4 に調整して、クロロホルムで抽出、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濃縮、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (Wakogel C-300) を用いて、分離精製を行なう。ベンゼン溶かしてから、エーテル誘導

体(2, 4, 5, 6)が得られ、さらにジエチルエーテル溶出層から
3. N-置換ニトロアセトアミド(3)が得られた。

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) と diethyl sodio-acetonedicarboxylate の反応。

1.0gの3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) を100ccのピリジンに溶かす。一方、0.17gの金属ナトリウムを無水エタノール50ccに溶かし、さらに1.7gのdiethyl acetonedicarboxylateを加え、エタノールを減圧下留去して得たdiethyl sodio-acetonedicarboxylateを20ccのピリジンに溶かす。これを得たNa-DADDCのピリジン溶液を、先に得た1aのピリジン溶液に冷やしながら加える。混合物を50°Cにて5時間加熱、以後上記の一般法に従って処理し、ベンゼン溶出層から、1.33g(90.4%)の2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol (2a) と、ジエチルエーテル溶出層から、0.17g(28.3%)のN-methyl nitroacetamide (3a) が得られた。

2,6-Bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol (2a); mp. 58.0~59.0°C, 無色針状晶(石油ベンジン)。IR: 3100cm⁻¹(O-H), 1720(C=O), 1540, 1340(NO₂)。NMR(CDCl₃): δ 1.42(6H,t), 4.45(4H,q), 8.81(2H,s), 12.42(1H,s)。Found: C, 50.94; H, 4.64; N, 4.81%; Calcd. for C₁₂H₁₃NO₆: C, 50.84; H, 4.63; N, 4.95%。

N-methyl nitroacetamide (3a); mp. 75.0~76.0°C, 無色針状晶(ジイソプロピルエーテル)。IR: 3300cm⁻¹(N-H), 1670(C=O), 1570, 1340(NO₂)。NMR(acetone d-6): δ 2.78(3H,d), 5.16(2H,s) 7.00(1H,br)。Found: C, 30.32; H, 5.09; N, 23.70%; Calcd. for C₃H₆N₂O₃:

C, 30.51; H, 5.08; N, 23.73%.

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) と ethyl sodioacetooacetate の反応

1.0g の 3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) と 0.34g のナトリウムと 2.1g の ethyl acetoacetate から得た ethyl sodioacetooacetate とともに K ヒドリジン中、70°C に 5 時間保つ。以後一般法により処理し、ベンゼン溶液から、0.65g (61.0%) の 2-ethoxy-carbonyl-4-nitrophenol (4a) と、ジエチルエーテル溶液から、0.10g (16.9%) の N-methyl nitroacetamide (3a) が得られた。

2-Ethoxycarbonyl-4-nitrophenol (4a); mp. 97.5-98.5°C,
無色針状晶(石油ベンジン)。IR: 3420cm⁻¹ (O-H), 1680(C=O),
1525, 1335(NO₂)。NMR (CDCl₃): δ 1.45(3H,t), 4.41
(2H,q), 7.03(1H,d), 8.03(1H,dd), 8.67(1H,d), 11.35
(1H,s)。Found: C, 51.46; H, 4.24; N, 6.45%; Calcd.
for C₉H₉NO₅: C, 51.19; H, 4.30; N, 6.63%.

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) と sodioacetylacetone の反応

1.0g の 3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) と 0.34g のナトリウムと 1.6g の acetylacetone から得た sodioacetylacetone と DMF 中、70°C に 5 時間保ち、以後常法により処理した。ベンゼン溶液から、0.46g (53.0%) の 2-acetyl-4-nitrophenol (5) が得られた。ジエチルエーテル溶液から、0.07g (11.5%) の N-methyl nitroacetamide (3a) が得られた。

2-Acetyl-4-nitrophenol (5); mp. 101.0~102.0°C (Lit. mp.
101~102°C)³²⁾, 無色針状晶(石油ベンジン)。IR: 3665cm⁻¹ (O-H),

1650 (C=O), 1520, 1350 (NO₂). NMR (CDCl₃): δ 2.71 (3H, s), 7.06 (1H, d), 8.26 (1H, dd), 8.62 (1H, d), 12.76 (1H, s). Found: C, 52.98; H, 3.77; N, 7.45%; Calcd. for C₈H₇NO₄: C, 53.05; H, 3.90; N, 7.73%.

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) と ethyl sodioacetopyruvate の反応

1.0g の 3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (1a) と 0.34g のナトリウムと 2.5g の ethyl acetopyruvate を 3 時間得た ethyl sodioacetopyruvate と、ピリジン中、110°C にて 5 時間保ち、上記と同じ一般法に従って処理し、ベンゼン溶液から 0.5g (42.0%) の 2-ethoxallyl-4-nitrophenol (6) が得られた。ジエチルエーテル溶液からは、0.05g (8.3%) の N-methyl nitroacetamide (3a) が得られた。

2-Ethoxallyl-4-nitrophenol (6): mp. 57.5-58.0°C, 金針状晶(石油ベンジン)。IR: 3360 cm⁻¹ (OH), 1730 (C=O), 1690 (C=O), 1530, 1340 (NO₂). NMR (CDCl₃): δ 1.46 (3H, t), 4.51 (2H, q), 7.11 (1H, d), 8.38 (1H, dd), 8.76 (1H, d), 11.73 (1H, s). Found: C, 50.35; H, 3.66; N, 5.57%; Calcd. for C₁₀H₉NO₆: C, 50.21; H, 3.77; N, 5.86%.

3,5-Dinitro-1-(m-nitrobenzyl)-2-pyridone (1b)

5.0g の 1-(m-nitrobenzyl)-2-pyridone³⁸⁾ と 1a の場合と同様に、発煙硝酸でニトロ化すれば 2.1g (30.0%) 3,5-dinitro-1-(m-nitrobenzyl)-2-pyridone (1b) が得られた。mp. 139.0-141.0°C, (50% 酢酸)。IR: 1690 cm⁻¹ (C=O), 1530, 1340 (NO₂). NMR (DMSO-d₆): δ 5.43 (2H, s), 7.62 (1H, dd), 7.80 (1H, dd), 8.03 (1H, dt), 8.31 (1H, t), 8.96 (1H, d), 9.84 (1H, d).

Found: C, 44.91; H, 2.46; N, 17.71%; Calcd. for $C_{12}H_8N_4O_7$: C, 45.01; H, 2.52; N, 17.50%.

3,5-Dinitro-1-(2'-pyridylmethyl)-2-pyridone (1c)

2-Chloromethylpyridine³⁹⁾と当量の 2-aminopyridine の混合物を加熱して得た 1-(2'-pyridylmethyl)-2-aminopyridinium chloride (mp. 223°C) を上記と同じに処理すれば 32.0% の収率で 3,5-dinitro-1-(2'-pyridylmethyl)-2-pyridone (1c) が得られた。mp. 155°C (decomp.) (K). IR: 1700 cm⁻¹ (C=O), 1580, 1340 (NO₂). NMR (DMSO-d₆): δ 5.52 (2H, s), 7.1~7.9 (3H, m), 8.43 (1H, dd), 8.97 (1H, d), 9.49 (1H, d). Found. C, 47.66; H, 2.61; N, 20.16%; Calcd. for $C_{11}H_8N_4O_5$: C, 47.83; H, 2.92; N, 20.28%.

3,5-Dinitro-1-H-2-pyridone (1d).

高橋、米田⁴⁰⁾の方法に従って、2-hydroxypyridine を発煙硫酸 (50% SO₃) 中、硫酸・浓硝酸 ($d=1.52$) を作用させ、63% の収率で、mp. 173.0~174.0°C の 3,5-dinitro-1-H-2-pyridone (1d) を得た。

3,5-Dinitro-1-(2',4'-dinitrophenyl)-2-pyridone (1e)

2-Hydroxypyridine のナトリウム塩と、1/1 倍当量の 2,4-dinitro-chlorobenzene を DMSO 中、140°C に 5 時間加熱し、溶媒を留去の後、クロロホルムで抽出すれば、48% の収率で 1-(2',4'-dinitro-Phenyl)-2-pyridone (mp. 163.8~164.2°C) が得られた。この 1-(2',4'-dinitrophenyl)-2-pyridone, 5.0g を 50CC の発煙硝酸 (30% SO₃) に溶かし、9.7g (5 当量) の硝酸カリウムを少量ずつ加え、

徐々に加熱し、 130°C にて 5 時間保つ。冷却後、反応混合物を
氷水中に注加、析出した沈殿を 50% 酢酸から再結晶すれば、3.3g
(49.0%) の 3,5-dinitro-1-(2,4'-dinitrophenyl)-2-pyridone (1e) が
得られた。mp. $265.3 \sim 265.5^{\circ}\text{C}$ 。IR: 1720 cm^{-1} (C=O),
 $1530, 1350$ (NO_2)。NMR (DMSO- d_6): δ 7.92 (1H, d),
 8.07 (1H, d), 8.11 (1H, d), 9.18 (1H, d), 9.68 (1H, d)。Found:
C, 37.84; H, 1.36; N, 20.04%; Calcd. for $\text{C}_{11}\text{H}_5\text{N}_5\text{O}_9$:
C, 37.60; H, 1.44; N, 19.95%.

3,5-Dinitro-1-(2'-Pyridyl)-2-pyridone (1f)

3.0g の 1-(2'-pyridyl)-2-pyridone⁴⁾ を、前述と同様に処理す
れば、3.05g (66.7%) の 3,5-dinitro-1-(2'-pyridyl)-2-pyridone (1f)
が得られた。mp. $179.5 \sim 180.5^{\circ}\text{C}$ (50% 酢酸)。IR: 1710 cm^{-1}
(C=O), $1540, 1350$ (NO_2)。NMR (DMSO- d_6): δ $7.4 \sim$
 8.1 (3H, m), 8.60 (1H, dd), 9.02 (1H, d), 9.42 (1H, d)。
Found: C, 45.81; H, 2.31; N, 21.37%; Calcd. for C_{10}H_6
 N_4O_5 : C, 45.76; H, 2.16; N, 21.67%.

3,5-Dinitro-1-[2'-(4'-methylpyridyl)]-2-pyridone (1g)

1-[2'-(4'-methylpyridyl)]-2-pyridone⁴⁾ を同様に処理すれば、
63.8% の収率で 3,5-dinitro-1-[2'-(4'-methylpyridyl)]-2-pyridone
(1g) が得られた。mp. $164.0 \sim 165.0^{\circ}\text{C}$ (50% 酢酸)。IR:
 1720 cm^{-1} (C=O), $1530, 1355$ (NO_2)。NMR (DMSO- d_6):
 δ 2.43 (3H, s), 7.41 (1H, dd), 7.50 (1H, d), 8.44 (1H, dd),
 9.03 (1H, d), 9.39 (1H, d)。Found: C, 48.03; H, 2.73;
N, 20.29%; Calcd. for $\text{C}_{11}\text{H}_8\text{N}_4\text{O}_5$: C, 47.83; H, 2.92;
N, 20.29%.

3,5-Dinitro-1-[2'-(5'-methylpyridyl)]-2-pyridone (1h)

同様K. 1-[2'-(5'-methylpyridyl)]-2-pyridone⁴¹⁾ か3. 53.5% の収率で、3,5-dinitro-1-[2'-(5'-methylpyridyl)]-2-pyridone (1h) が得られた。 mp. 174.0~175.0°C (50% 酢酸). IR: 1700 cm⁻¹ (C=O), 1535, 1330 (NO₂). NMR (DMSO d-6): δ 2.40 (3H, s), 7.8 (2H, m), 8.5 (1H, m), 9.05 (1H, d), 9.40 (1H, d). Found: C, 47.64; H, 2.69; N, 20.01%; Calcd. for C₁₁H₈N₄O₅: C, 47.83; H, 2.92; N, 20.29%.

3,5-Dinitro-1-[2'-(6'-methylpyridyl)]-2-pyridone (1i)

同様K. 1-[2'-(6'-methylpyridyl)]-2-pyridone⁴¹⁾ か3. 53.8% の収率で 3,5-Dinitro-1-[2'-(6'-methylpyridyl)]-2-pyridone (1i) が得られた。 mp. 175.5~176.5°C (50% 酢酸). IR: 1710 cm⁻¹ (C=O), 1530, 1340 (NO₂). NMR (DMSO d-6): δ 2.67 (3H, s), 7.4 (1H, m), 7.7 (1H, m), 8.3 (1H, m), 9.02 (1H, d) 9.48 (1H, d). Found: C, 47.96; H, 2.80; N, 20.38%; Calcd. for C₁₁H₈N₄O₅: C, 47.83; H, 2.92; N, 20.29%.

3,5-Dinitro-1-hydroxy-2-pyridone (1j)

Hertog 等⁴²⁾の方法K. 従つて、2-hydroxypyridine N-oxide を酢酸中、発煙硝酸と 40°C K 加熱し 80% の収率で融点 190.0~192.0°C の 3,5-dinitro-1-hydroxy-2-pyridone (1j)を得た。

3,5-Dinitro-1-methoxy-2-pyridone (1k)

氷冷下、70cc の発煙硝酸 ($d = 1.52$) K 7.0g の 1-methoxy-2-pyridone⁴³⁾ を徐々に加え、80~90°C K 10時間保つ、放冷後、碎氷中 K 注加、析出する黄色固体を汎取、汎液を減圧下、濃縮し、

水で希釈する、析出する固体を前に得た固体と合せて、水から再結晶すれば、 6.5 g (54.0%) の 3,5-dinitro-1-methoxy-2-pyridone (**1k**) が得られた。mp. $158.0 \sim 159.0^\circ\text{C}$. IR: 1740 cm^{-1} (C=O), $1560, 1330(\text{NO}_2)$. NMR (DMSO d-6): δ $3.25(3\text{H}, s)$, $8.95(1\text{H}, d)$, $9.82(1\text{H}, d)$, Found: C, 33.57; H, 2.50; N, 19.50%; Calcd. for $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$: C, 33.50; H, 2.34; N, 19.54%.

3,5-Dinitro-1-(*p*-nitrobenzyloxy)-2-pyridone (**1l**)

*1-(*p*-nitrobenzyloxy)-2-pyridone⁴³⁾ を上記と同様に処理すれば、70% の収率で、3,5-dinitro-1-(*p*-nitrobenzyloxy)-2-pyridone (**1l**) が得られた。mp. $192.0 \sim 192.0^\circ\text{C}$ (水). IR: 1730 cm^{-1} (C=O), $1535, 1350(\text{NO}_2)$. NMR (DMSO d-6): δ $5.45(2\text{H}, s)$, $7.85(2\text{H}, d)$, $8.25(2\text{H}, d)$, $9.02(1\text{H}, d)$, $10.00(1\text{H}, d)$. Found: C, 42.82; H, 2.28; N, 16.38%; Calcd. for $\text{C}_{12}\text{H}_{8}\text{N}_4\text{O}_8$: C, 42.86; H, 2.40; N, 16.67%.*

3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類 (**1**) と Na·DADC, Na·EAA との反応。

1b ~ **1l** と diethyl sodioacetonedicarboxylate (Na·DADC), ethyl sodioacetoacetate (Na·EAA) との反応は、前述した一般方法に準拠しておこなった。Na·DADC との反応では、生成物として、2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol (**2a**) と、原料 **1** の 1-置換基に対応する *N*-置換ニトロアセトイミド (**3**) が得られた。Na·EAA との反応では、2-ethoxycarbonyl-4-nitrophenol (**4a**) と *N*-置換ニトロアセトイミド (**3**) が得られた。生成物の収率等は、本文中の Table 2-2 に示した。*N*-置換ニトロ

アセトアミド(3)についての主なIR、NMRデータは、本文中のTable 2-3に示したので、ここでは、融点、及び元素分析の結果をTable 2-7に示す。

Table 2-7

N-置換 ニトロ酢 アミド	融 点 (角結晶溶媒)	元 素 分 析		
			C.	H N %
3b	152.0 ~ 153.0 (ベンゼン)	F.	45.02	3.53 17.33
		C. for $C_9H_9N_3O_5$	45.19	3.79 17.57
3c	83.0 ~ 84.0 (ジメチロビュタノール)	F.	49.55	4.29 21.62
		C. for $C_8H_9N_3O_3$	49.23	4.65 21.53
3e	120.4 ~ 121.1 (ベンゼン)	F.	35.53	2.08 20.54
		C. for $C_8H_6N_4O_7$	35.56	2.24 20.74
3f	120 (decomp)	F.	46.63	3.69 23.26
		C. for $C_7H_7N_3O_3$	46.41	3.87 23.20
3h	120 (decomp)	F.	49.38	4.71 21.50
		C. for $C_8H_9N_3O_3$	49.23	4.65 21.53
3i	120 (decomp)	F.	49.11	4.55 21.73
		C. for $C_8H_9N_3O_3$	49.23	4.65 21.53
3k	86.0 ~ 86.5 (1,1,2,2-トルム)	F.	26.78	4.37 20.81
		C. $C_3H_6N_2O_4$	26.88	4.51 20.89
3l	115.0 ~ 116.0 (1,1,2,2-トルム)	F.	42.45	3.29 16.80
		C. $C_9H_9N_3O_6$	42.36	3.56 16.47

3,5-Dinitro-1-[2'-(5'-methylpyridyl)]-2-pyridone(1g)の反応については、例外として、以下のように処理した。反応終了後、減圧下ピリジンを留去し、希塩酸でpH 3-4に調整して、クロロ

ホルムを加えて振とうすれば、黄色の沈殿、8-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide (**7g**) が析出する。この**7g**を汎取、クロロホルム抽出層は、一般法に従って、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにより分離精製する。ベンゼン抽出層から**2a**が得られた。ジエチルエーテル溶液の後、アセトン及びエタノール抽出層から、少量の**7g**が得られ、先に得た結晶と合せて水から再結晶する。**1f, 1h, 1i**の場合も、ジエチルエーテル抽出層から、それぞれ、**3f, 3h, 3i**を得た後、アセトン又エタノール抽出層から、それぞれ、少量の**7f, 7h, 7i**が得られた。

2-Oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-Triazine 4-oxide
(**7f**)

黄色針状晶(水), decomp. 230°C. IR: 1730cm⁻¹(C=O), 1650(C=N), 1210(N→O). NMR(CF₃COOD): δ 7.5~7.9(2H, m), 8.52(1H, dt), 9.65(1H, dd). Found: C, 51.35; H, 2.97; N, 25.89%; Calcd. for C₇H₅N₃O₂: C, 51.54; H, 3.09; N, 25.76%.

8-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine
4-oxide (**7g**)

黄色針状晶(水), decomp 210°C. IR: 1730cm⁻¹(C=O), 1635(C=N), 1210(N→O). NMR(CF₃COOD): δ 3.58(3H, s), 7.70(1H, d), 8.35(1H, dd), 9.38(1H, d). Found: C, 54.10; H, 3.73; N, 23.60%; Calcd. for C₈H₇N₃O₂: C, 54.23; H, 3.98; N, 23.72%.

7-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine
4-oxide (7h)

黄色針状晶(水), decomp. 248°C. IR: 1735cm⁻¹ (C=O), 1645 (C=N), 1210 (N→O). NMR (CF₃COOD): δ 2.50 (3H, s), 7.70 (1H, d), 8.37 (1H, dd), 9.37 (1H, d). Found: C, 54.36; H, 3.82; N, 23.68%; Calcd. for C₈H₇N₃O₂: C, 54.24; H, 3.98; N, 23.72%.

6-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine
4-oxide (7i)

黄色針状晶(水) decomp. 182°C. IR: 1730cm⁻¹ (C=O), 1640 (C=N), 1210 (N→O). NMR (CF₃COOD): δ 2.54 (3H, s), 6.5~6.9 (2H, m), 7.5~7.8 (1H, m). Found: C, 54.48; H, 3.81; N, 23.61%; Calcd. for C₈H₇N₃O₂: C, 54.23; H, 3.98; N, 23.72%.

3f および 7f

0.5g の N-(2-pyridyl) nitroacetamide (3f) を 100c の水に懸濁させ、30 分間煮沸する、混合液はただちに黄色に変化する。冷却後、析出した黄色結晶を汎取、0.44g の 2-oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide (7f) が得られた。同様に、3h, 3i も定量的に 7h, 7i が得られた。

2-Oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide
(7f) の別途合成

2.0g の ethyl nitroacetate⁴⁴ と 2.0g の 2-aminopyridine の混合物を、徐々に加熱、90~100°C に 1 時間保つ、冷却後、少量の

エタノールを加え、黄色結晶を沈取、 2.1g (85.5%)の2-Oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide ($7f$)が得られた。

2-Oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide ($7f$)の接触還元

0.5gの2-Oxo-2,5-dihydropyrido[1,2-b]-1,2,4-triazine 4-oxide ($7f$)と0.1gのチオニッケルを50ccのエタノールに懸濁させ、100ccのオートクレーブ中、水素圧100kg/cm²で100°Cにて5時間振とうする。反応混合物を浄過、エタノールを留去し、ベンゼン溶液でシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付す。ベンゼン溶出層から、0.3gのethyl 2-pyridylcarbamate³³⁾が得られた。さらに対エーテル溶出層から、0.05gの2-aminopyridineが得られた。

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone ($1a$)とdiethyl sodio-acetonedicarboxylate (Na-DADC)の低温での反応

1.0gの3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone ($1a$)をピリジン中、1.5倍当量のdiethyl sodioacetonedicarboxylateと25°Cにて、5時間保ち、1-N塩酸4.5ccを加えて、減圧下、できるだけ低温でピリジンを留去；さらに少量の水を加え、pHを3~4に調整、クロロホルムで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、クロロホルムを留去、ジエチルエーテルを加え、析出する結晶、6,8-bis(ethoxycarbonyl)-3,7-dihydroxy-4,9-dinitro-2-methyl-2-azabicyclo-[3.3.1]nona-3,7-diene ($8a$)を沈取、溶液は、ジエチルエーテルを留去、ベンゼン溶液でシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付す。ベンゼン溶出層から、0.13g(9.2%)の2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol ($2a$)が得られた。クロロホルム溶液

層から、少量の **8a** が得られた。先に得られた結晶と合せて、1.60g (79.8%)

6,8-Bis(ethoxycarbonyl)-3,7-dihydroxy-4,9-dinitro-2-methyl-2-azabicyclo[3.3.1]nona-3,7-diene (**8a**)；無色板状晶 (エタノール), mp. 155.0–156.0°C. IR: 1740 cm⁻¹ (C=O), 1730 (C=O), 1560, 1345 (NO₂). Found: C, 45.31; H, 4.71; N, 10.35%; Calcd. for C₁₅H₁₉N₃O₁₀: C, 45.26; H, 4.77; N, 10.47%.

さらに統合して、ジエチルエーテル溶液層から、0.04g (6.7%) の *N*-methyl nitroacetamide (**3a**) が得られた。

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (**1a**) と ethyl sodioacetooacetate (Na·EAA) の低温での反応

上記と同じく、3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (**1a**) 1.0g を 3 倍当量の ethyl sodioacetooacetate と処理すると、0.10g (9.4%) の 2-ethoxycarbonyl-4-nitrophenol (**4a**), 0.03g (5.1%) の *N*-methyl nitroacetamide (**3a**), 及び 0.95g (57.5%) の 3,7-dihydroxy-4,9-dinitro-8-ethoxycarbonyl-2-methyl-2-azabicyclo[3.3.1]nona-3,7-diene (**9a**) が得られた。無色針状晶 (エタノール), mp. 190.0–191.0°C. IR: 1730 cm⁻¹ (C=O), 1550, 1340 (NO₂). Found: C, 43.48; H, 4.31; N, 12.89%; Calcd. for C₁₂H₁₅N₃O₈: C, 43.79; H, 4.56; N, 12.76%.

8a の sodium ethoxide による処理

0.5g の **8a** と 0.4g の sodium ethoxide のエタノール溶液 (5.0cc) を 2 時間還流、エタノールを留去、希塩酸で pH 3.5 に調節、1 ロットホルムで抽出し乾燥後、ベンゼン溶液でシリカゲルカラム (

ロベトグラフーK付す。ベンゼン溶出層から0.18g(50.9%)の2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol(2a)が、ジエチルエーテル溶出層から0.06g(40.6%)のN-methyl-nitroacetamide(3a)が得られた。

8a の diethyl sodioacetonedicarboxylate K より処理。

0.5gの8aを0.03gのナトリウムと0.3gのdiethyl acetone-dicarboxylateから得たdiethyl sodioacetonedicarboxylateとピリジン(30cc)中で70°C K 2時間加熱、ピリジンを留去、以後、一般法にて処理し、0.20g(56.6%)の2,6-bis(ethoxycarbonyl)-4-nitrophenol(2a)と0.06g(40.6%)のN-methyl nitroacetamide(3a)が得られた。

9a の sodium ethoxide による処理。

同様に9a(0.5g)から0.11g(34.3%)の2-ethoxycarbonyl-4-nitrophenol(4a)と0.05g(27.8%)のN-methyl nitroacetamide(3a)が得られた。

3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone(1a)とケトン類+アミンの反応

2~5mMol.の3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone(1a)を、溶媒、DMFあるいはピリジン、10cc K溶かし、さらに入れるケトン及びアミンを3~10倍当量加えて、それをTable 2-8に示した温度、時間で処理し、析出する結晶を沈取し、それを、1a:ケトン:アミンの比が1:1:1の化合物が得られた。紫外可視吸収スペクトルはメタノール溶媒で測定した。B-10Kについては、1aと等モルのsodium methoxideをメタノール中混合し、メタノ-

Table 2-8

Meisenheimer Complex	Reaction Conditions			Yield, %	Elemental Analysis		
	Solvents	Temp, °C	Time, h		M.P. °C	C %	H %
A-1	Pridine	80	5	151.0 - 151.5	56.0	F. C. $C_{15}H_{24}N_4O_6$	51.07 50.55
A-2	"	70	3	160.5 - 161.0	80.0	F. C. $C_{16}H_{26}N_4O_6$	51.91 51.61
A-3	Methanol	25	1	171 (decomp)		F. C. $C_{10}H_{16}N_6O_6$	37.52 37.97
A-4	Pridine	80	3	134.5 - 135.0	19.0	F. C. $C_{15}H_{26}N_4O_6$	50.10 50.27
A-5	DMF	70	6	136.5 - 137.0	69.0		7.28 7.31
A-6	Pridine	80	6	130 (decomp.)		F. C. $C_{15}H_{18}N_4O_6$	51.60 51.42
A-7	DMF	20	20	177 (decomp.)	50.0	F. C. $C_{14}H_{14}N_4O_6$	50.18 50.30
B-8	"	80	6	116.0 - 116.5	32.0	F. C. $C_{17}H_{28}N_4O_9$	46.87 47.21
B-9	Pridine	25	0.5	139.0 - 140.0		F. C. $C_{14}H_{14}N_6O_6$	32.82 33.11
B-10	Methanol	10					

ルを絞去し、重メタノールを濾過しNMRスペクトルの測定を行なった。UV, IR, NMRの各スペクトルは、本文中のTable 2-4に示したので、融点、元素分析の結果、及び反応条件についてTable 2-8で示した。

1,4-Dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (1m)

5.0gの1,4-dimethyl-2-pyridone⁴⁵⁾と200ccの無水酢酸に溶かし、氷冷下、13.0gの発煙硝酸($d=1.52$)を少量ずつ加える。混合物を2日間室温で放置、碎氷500g上に注加し、一層になるまで攪拌する。減圧下濾過を絞去、残渣を少量の水及びメタノールで洗浄し、水から再結晶すれば、6.8g(78.5%)の1,4-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (1m)が得られた。mp. 135.5-136.8°C. IR: 1695 cm⁻¹ (C=O), 1570, 1340 (NO₂). NMR(acetone d-6): δ 2.75 (3H, s), 3.59 (3H, s), 8.90 (1H, s). Found: C, 39.16; H, 3.09; N, 19.82%; Calcd. for C₇H₇N₃O₅: C, 39.44; H, 3.29; N, 19.72%.

1,6-Dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (1n)

5.0gの1,6-dimethyl-2-pyridone⁴⁵⁾を上述と同様に処理し、6.6g(76.2%)の1,6-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (1n)が得られた。mp. 155.0-156.0°C (水). IR: 1695 cm⁻¹ (C=O), 1570, 1340 (NO₂). NMR(acetone d-6): δ 2.54 (3H, s), 3.58 (3H, s), 8.20 (1H, s). Found: C, 39.25; H, 3.18; N, 19.63%; Calcd. for C₇H₇N₃O₅: C, 39.44; H, 3.29; N, 19.72%.

3,5-Dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone (1o)

10.0gの4-methoxy-2-hydroxy pyridine⁴⁶⁾と7.0gの水酸化カリウムを全量メタノール(200cc)に溶解し、17.0gのヨウ化メチルを加え2時間還流する。メタノールを留去し残渣をクロロホルムで抽出、クロロホルム留去の後、ジエチルエーテルで洗浄、10.5g(94.4%)の4-methoxy-1-methyl-2-pyridoneが得られた。この4-methoxy-1-methyl-2-pyridoneと前記と同様、無水硫酸中、発煙硝酸で二回酸化すれば、68.5%の収率で3,5-dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone(1o)が得られた。mp. 114.5-115.5°C (イタ) - IV). IR: 1690 cm⁻¹ (C=O) 1570, 1350 (NO₂). NMR (acetone d₆): δ 3.72 (3H, s), 4.02 (3H, s), 9.12 (1H, s). Found: C, 36.60; H, 3.23; N, 18.56%; Calcd. for C₇H₇N₃O₆: C, 36.69; H, 3.08; N, 18.34%.

1,4-Dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (1m) と diethyl sodio-acetonedicarboxylate の反応

一般法に準拠して、1,4-Dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone(1m)を1.5倍量のdiethyl sodioacetonedicarboxylateとヒリシンにて反応させれば、2,6-bis(ethoxycarbonyl)-3-methyl-4-nitrophenol(2m), 6,8-bis(ethoxycarbonyl)-3,7-dihydroxy-2,5-dimethyl-4,9-dinitro-2-azabicyclo[3.3.1]nona-3,7-diene(8m), 13-C¹⁸-N-methyl nitroacetamide(3a)がTable 2-5に示す収率で得られる。

2,6-Bis(ethoxycarbonyl)-3-methyl-4-nitrophenol (2m):
無色アリスム晶(石油ベンジン)。mp. 69.0~70.0°C.
IR: 3100 cm⁻¹ (OH), 1745 (C=O), 1530, 1350 (NO₂). NMR (CDCl₃): δ 1.30 (3H, t), 1.44 (3H, t), 2.54 (3H, s), 4.44 (2H, q), 4.50 (2H, q), 8.49 (1H, s), 11.55 (1H, s). Found:

C, 52.47; H, 4.95; N, 4.49%; Calcd. for $C_{13}H_{15}NO_7$:
C, 52.52; H, 5.09; N, 4.71%.

6,8-Bis(ethoxycarbonyl)-3,7-dihydroxy-2,5-dimethyl-4,9-dinitro-2-azabicyclo[3.3.1]nona-3,7-diene (**8m**); 無色
アリドム晶(エタール), mp. 151.0~152.0°C. IR: 1750 cm^{-1} (C=O), 1670 (C=O), 1570, 1360 (NO₂). Found: C, 45.98;
H, 4.93; N, 9.99%; Calcd. for $C_{16}H_{21}N_3O_{10}$: C, 46.26;
H, 5.10; N, 10.12%.

1,6-Dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1n**) と diethyl sodioacetonedicarboxylate との反応

1,6-Dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1n**) と 1.5 倍当量
の diethyl sodioacetonedicarboxylate のエーテル中での反応
が**3**, 2,6-bis(ethoxycarbonyl)-3-methyl-4-nitrophenol (**2m**),
6,8-bis(ethoxycarbonyl)-1,2-dimethyl-4,9-dinitro-7-hydroxy-
3-oxo-2-azabicyclo[3.3.1]non-6-ene (**8n**), 及び
N-methyl nitroacetamide (**3a**) が Table 2-5 に示す收率で得ら
れた。

6,8-Bis(ethoxycarbonyl)-1,2-dimethyl-4,9-dinitro-7-
hydroxy-3-oxo-2-azabicyclo[3.3.1]non-6-ene (**8n**); 無色
アリドム晶(エタール), mp 170.0~171.0°C. IR: 1735 cm^{-1}
(C=O), 1695 (C=O), 1550, 1320 (NO₂). Found: C, 46.05;
H, 4.81; N, 10.11%; Calcd. for $C_{16}H_{21}N_3O_{10}$: C, 46.26;
H, 5.10; N, 10.12%.

3,5-Dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone (**1o**) と diethyl sodioacetonedicarboxylate の反応

上記と同様に、3,5-dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone (**1o**) と diethyl sodioacetonedicarboxylate の反応の結果は、2,6-bis(ethoxycarbonyl)-3-methoxy-4-nitrophenol (**2o**)、6,8-bis(ethoxycarbonyl)-4,9-dinitro-7-hydroxy-5-methoxy-2-methyl-2-azabicyclo[3.3.1]non-7-ene (**8o**)、及び N-methyl nitroacetamide (**3a**) が Table 2-5 の收率で得られた。

2,6-Bis(ethoxycarbonyl)-3-methoxy-4-nitrophenol (**2o**)：無色針状晶（石油ベンジン），mp. 100.0~100.5°C. IR: 3200 cm⁻¹ (O-H), 1740 (C=O), 1540, 1340 (NO₂). NMR (CDCl₃): δ 1.36 (3H, t), 1.39 (3H, t), 3.95 (3H, s), 4.39 (2H, q), 4.40 (2H, q), 8.57 (1H, s), 11.74 (1H, s). Found: C, 49.65; H, 4.61; N, 4.71%; Calcd. for C₁₃H₁₅NO₈: C, 49.84; H, 4.83; N, 4.47%.

6,8-Bis(ethoxycarbonyl)-4,9-dinitro-7-hydroxy-5-methoxy-2-methyl-2-azabicyclo[3.3.1]non-7-ene (**8o**)：無色アリズム晶（エタノール），mp. 198.0~199.0°C. IR: 1750 cm⁻¹ (C=O), 1690 (C=O), 1565, 1330 (NO₂). Found: C, 44.56; H, 5.41; N, 9.61%; Calcd. for C₁₆H₂₃N₃O₁₁: C, 44.34; H, 5.35; N, 9.70%.

1,4-Dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1m**) と ethyl sodioacetateとの反応

1.0g の 1,4-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1m**) を ピリジン 中、3倍当量の ethyl sodioacetate と 70°C で 5 時間保ち、一般法にて処理し、0.51g (48.3%) の 2-ethoxycarbonyl-3-methyl-4-nitrophenol (**4m**) と 0.05g (8.3%) の N-methyl nitroacetamide (**3a**) が得られた。

2-Ethoxycarbonyl-3-methyl-4-nitrophenol (**4m**)；無色針状晶(石油ベンジン), mp. 58.0~58.5°C. IR: 3200 cm⁻¹(O-H), 1670 (C=O), 1530, 1360 (NO₂). NMR (CDCl₃): δ 1.43 (3H, t), 2.60 (3H, s), 4.47 (2H, q), 6.85 (1H, d, J=9.5 Hz), 7.78 (1H, d, J=9.5 Hz), 11.33 (1H, s). Found: C, 53.45; H, 4.77; N, 6.19%; Calcd. for C₁₀H₁₁NO₅: C, 53.33; H, 4.92; N, 6.22%.

1,6-Dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone (**1n**) と ethyl sodio-acetoacetate との反応。

上記の場と全く同様に処理すれば、2-ethoxycarbonyl-3-methyl-4-nitrophenol (**4m**) が 57.3% N-methyl nitroacetamide (**3a**) が 11.3% の收率で得られた。

3,5-Dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone (**1o**) と ethyl sodioacetoacetate との反応。

1.0g の 3,5-dinitro-4-methoxy-1-methyl-2-pyridone (**1o**) を上記と同様に ethyl sodioacetoacetate と処理し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーでベニゼン層から 0.11g (9.6%) の 2-ethoxycarbonyl-5-methoxy-4-nitrophenol (**4o**) が得られた。無色針状晶(石油ベンジン), mp. 137.5~138.5°C. IR: 3200 cm⁻¹ (O-H), 1670 (C=O), 1540, 1340 (NO₂). NMR (CDCl₃): δ 1.41 (3H, t), 3.95 (3H, s), 4.31 (2H, q), 6.51 (1H, s), 8.48 (1H, s), 11.49 (1H, s). Found: C, 49.70; H, 4.68; N, 5.51%; Calcd. for C₁₀H₁₁NO₆: C, 49.80; H, 4.59; N, 5.80%.

第3章 3,5-ジニトロ-1-置換-4-ピリドン類の 環変換反応

3-1 はじめに

前章で種々の 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類(1)と、
diethyl sodioacetonedicarboxylate あるいは ethyl sodio-
acetoacetateとの反応において、中間く [3.3.1] 系の二環構
造中間体を経由して、環の変換を行ない 2,6-bis(ethoxycarbonyl)-
4-nitrophenol (2a), 2-ethoxycarbonyl-4-nitrophenol (4a)
と、原料の 2-ピリドンの 1-置換基に対応する置換基を有する N-
置換ニトロアセトアミド (3) が生成されることを見い出した。

これら 2-ピリドンとビニロガスの関係にある 3,5-ジニトロ-1-
置換-4-ピリドン類も、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と同
様な強い親電子性を示すものと考えられるが、2-ピリドン類と同
じようす反応性を示すかどうかが興味のもたらされたところである。
そこで、二重核中心性試薬として diethyl sodioacetonedicarboxylate
(Na-DADC) との反応について吟味した。

2-ピリドン類では、4位、6位が反応位置であったが、4-ピ
リドン系においては、2位および6位が、ニトロ基の-M効果で、
反応における活性位になることが予想される。

3-2 3,5-ジニトロ-1-置換-4-ピリドン類と Na-DADCとの反応

基質として、3,5-dinitro-1-methyl-4-pyridone (Ia)、3,5-
dinitro-1-(2'-pyridyl)-4-pyridone (Ib)、3,5-dinitro-1-(2'-
(6-methylpyridyl))-4-pyridone (Ic)、及ぶ 3,5-dinitro-1-(4'-
pyridyl)-4-pyridone (Id) を用いた。

3,5-dinitro-1-methyl-4-pyridone (**Ia**) を、ピリジン中、
1.5倍量の diethyl sodioacetonedicarboxylate と 50°C にて処理して、138.0～139.0°C の融点を示す無色の板状結晶 (**IIa**)
が得られた。IRスペクトルから、エステルカルボニル基 (1750 cm⁻¹)、ピリドンカルボニル基 (1675 cm⁻¹) の存在が示唆され、原料の **Ia** に見られたニトロ基の吸収は消失していた。また **IIa** のNMRスペクトルは、2ヶのエチルエステル基に由来する
と考えられるシグナル以外は、原料のそれと同じパターンを示し、環のプロトンによる等価な 2ヶのプロトン分のシングレットが、
原料より約 1 ppm 高磁場側にシフトしたのみであった。元素分析から、C₁₂H₁₅N₃O₅ なる実験式をもつことがわかった。これら
のデータから、生成物 **IIa** は、3,5-bis(ethoxycarbonyl)-
1-methyl-4-pyridone (**IIa**) であると考えられ、Schaefer²⁷⁾
の方法により、*syn*-triazine と diethyl sodioacetonedicarboxylate
から得られた diethyl 4-hydroxy-3,5-pyridinedicarboxylate をヨウ化メチルで N-メチル化して得た標品との同定により確認した。

同様に、**Ib**、**Ic**、**Id** も diethyl sodioacetonedicarboxylate
の作用によって環の変換反応を行ない、それぞれ、対応する 3,5-
ビス(エトキシカルボニル)-1-置換-2-ピリドン、3,5-bis(ethoxycarbonyl)-
1-(2'-pyridyl)-4-pyridone (**IIb**)、3,5-bis(ethoxycarbonyl)-1-[2'-(
6-methylpyridyl)]-4-pyridone (**IIc**)、及ぶ 3,5-bis(ethoxycarbonyl)-
1-(4'-pyridyl)-4-pyridone (**IID**) を生成することが明らかになっ
た。

これらの結果から、生成した 3,5-ビス(エトキシカルボニル)-
1-置換-4-ピリドン類 (**II**) は、基底の 3,5-ジニトロ-1-置換-4-ピ
リドン類 (**I**) の C₂-N-C₆ 部分と試薬の diethyl acetonedicarboxylate
によることが推測され、予想されたように、4-ピリドン環の

2位及び6位が反応に関与していることが明らかになった。




Fig. 3-1

この反応に於いて副生すると考えられる ω,ω' -dinitroacetone (III) の単離精製ができなかつたため、誘導体として精製確認することを試み、液状の活性メチレン化合物の同定によく利用される、ジアゾニウム塩により活性メチレン位をヒドラゾンに誘導する方法⁴⁷⁾を準拠して、フェニルヒドラゾン誘導体として確認した。すなわち、反応終了後、IIa をエーテルで抽出し、さらに過剰の $\text{Na}\cdot\text{DADC}$ をエタノールで抽出除去し、不溶の残渣を水性硫酸中、硫酸ナトリウムを加え緩衝液として、benzenediazonium chloride の水溶液で処理した。当モルのジアゾニウム塩を作用させた場合は、167.0~168.0°C の融点を示す黄色結晶 (IV) が得られた。IV の元素分析値は、1,3-dinitro-1-phenylhydrazonopropan-2-one (IV) としての計算値 $\text{C}_9\text{H}_8\text{N}_4\text{O}_5$ によく一致し、IRスペクトルから N-H結合 (3200 cm^{-1})、カルボニル基 (1700 cm^{-1})、及びニトロ基 ($1530,$

1330 cm^{-1}) の存在が示唆され、NMRスペクトルから、 6.10 ppm に等価な 2 つのプロトンによるシングレット、 $7.25\sim7.80\text{ ppm}$ にフェニルプロトンによるマルチプレット、また 12.4 ppm には、重水交換により消失するブロードなシングレットピークが見られ、 $\text{N}-\text{H}$ プロトンによるものと解された。




Fig. 3-2

過剰の benzenediazonium chloride を作用させると、分解点が 138°C の黄色結晶 (V) が得られた。このものの IR スペクトルでは、 N-H 、 C=O 、 C=N 結合、及びニトロ基によると考えられる吸収がみられ、NMRスペクトルからは、 $7.1\sim7.9\text{ ppm}$ にフェニルプロトンによるマルチプレットシグナルと、 12.5 ppm に重水交換により消失するブロードなシングレットピークが 5 対 1 の比で観察された。また元素分析の結果から、 $\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{N}_6\text{O}_5$ なる実験式をもち、1,3-bis(phenylhydrazone)-1,3-dinitro-propan-2-one の計算値とよく一致した。更に、このジフェニルヒドラソン、 V 、をメタノールあるいはアセトンのような溶媒中

で、加熱を続けると、高融点（218.0～219.0°C）の赤色針状結晶（IV）へ容易に変化した。この変化は、IVのNMR測定に際して、DMSO-d₆に溶かして放置しておいた場合も確認された。この生成物IVは、元素分析の結果から、C₁₅H₁₁N₅O₃なる実験式をもち、1,3-bis(Phenylhydrazone)-1,3-dinitropropan-2-one (IV) の分子式、C₁₅H₁₂N₆O₅からHNO₂を差し引いた分子式に相当することがわかった。またIRスペクトルからは、O-H、C≡N結合、及びニトロ基による吸収がみられ、ビスフェニルヒドラン、IVから脱亜硝酸を伴なって環化し、さらには変異化したと考えられる4-hydroxy-3-nitro-1-phenyl-5-phenylazopyrazole (VI) と推定される。

このように、benzenediazonium chlorideの作用によって、1,3-dinitro-1-phenylhydrazonepropan-2-one (IV) あるいは、1,3-bis(phenylhydrazone)-1,3-dinitropropan-2-one (V) が形成されることがから、IとNa-DADCとの反応で得られる3,5-ビス(エトキシカルボニル)-1-置換-4-ピリドン類 (II) 以外の今一つの生成物は、1,3-dinitropropan-2-one (ω,ω' -dinitroacetone) (III) のナトリウム塩であることが解明された。

以上のように、3,5-ジニトロ-1-置換-4-ピリドン類 (I) は、3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類と同様に強い親電子性を示し、diethyl sodioacetonedicarboxylateの二段階求核攻撃を、環の2位及び6位に受け、さらに、4-ピリドン母核の開裂に伴なって、新しい4ピリドン誘導体、3,5-ビス(エトキシカルボニル)-1-置換-4-ピリドン (II) と 1,3-dinitropropan-2-one (III) を生成することが確認された。反応経路については、2-ピリドン類とNa-DADCとの反応の場合と同様に考えれば、合理的な説明がつくものと思われる。すなわち、次頁のFig.3-3を示すように




Fig. 3-3

まず、diethyl sodio acetonatedicarboxylate からなる炭素マニオンが 3,5-ジニトロ-1-置換-4-ピリドン環の 2 位を求核的に攻撃し、Meisenheimer complex (VII) を形成し、導入された diethyl acetonatedicarboxylate のもう一方の活性メチレンのプロトンが分子内的に引き抜かれて、新しいアニオン中間体 (VIII) が生じ、さらには 2-ピリドン類の場合と同様に、[3.3.1] 系の二環構造中間体アニオン (IX) が形成される。このビシクロ体、IX からのアロトンの脱離（例えば Fig 3-3 に示すような IX の 2 位のアロトンの脱離）により 1-8 位間及び 5-6 位間（基質の 4-ピリドン (I) 母核の 2-3 位間及び 5-6 位間に相当）の結合が、それされ、1 位及び 6 位に電子対を残してヘテロリンスを起こし、新しい 4-ピリドン誘導体 (II) と 1,3-dinitropropan-2-one のアニオンが形成されるものと考えるのが妥当であろう。

3-3 実験の部

3,5-Dinitro-1-methyl-4-pyridone (Ia)

5.0g の 1-methyl-4-pyridone⁴⁸⁾ と 50cc の発煙硫酸 (30% SO₃) K 液を加え、25g の硝酸カリウムを少量ずつ加え、110°C で 5 時間保つ、放冷後、碎氷中に注加する、析出する結晶を沈取、水から再結晶すれば、4.8g (52.1%) の 3,5-dinitro-1-methyl-4-pyridone (Ia) が得られた。mp. 214.0-215.0°C. IR: 1680 cm⁻¹ (C=O), 1550, 1365 (NO₂). NMR (DMSO d-6): δ 3.90 (3H, s), 8.95 (2H, s). Found: C, 36.11; H, 2.63; N, 20.89%; Calcd. for C₆H₅N₃O₅: C, 36.19; H, 2.61; N, 20.89%.

3,5-Dinitro-1-(2'-pyridyl)-4-pyridone (Ib)

当モルの 2-bromopyridine⁴⁹⁾と 4-hydroxypyridine のナトリウム塩を DMSO 中で 150°C にて 8 時間加熱し、DMSO を留去の後、水を加え、クロロホルムで抽出、クロロホルム抽出液から、1-(2'-pyridyl)-4-pyridone が 76.9% の收率で得られた。この 1-(2'-pyridyl)-4-pyridone を上記と同様に、発煙硫酸中、10 倍当量の硝酸カリウムと 130°C にて 5 時間加熱し、31.4% の收率で、3,5-dinitro-1-(2'-pyridyl)-4-pyridone (Ib) が得られた。mp. 219.5–220.0°C (水). IR: 1675cm⁻¹(C=O), 1520, 1360 (NO₂). NMR (DMSO d-6): δ 7.60 (1H, m), 8.16 (2H, m), 8.62 (1H, dd), 9.59 (2H, s). Found: C, 45.65; H, 2.20; N, 21.47%; Calcd. for C₁₀H₆N₄O₅: C, 45.81; H, 2.31; N, 21.37%.

3,5-Dinitro-1-[2'-(6-methylpyridyl)]-4-pyridone (Ic).

2-Bromo-6-methylpyridine⁵⁰⁾と 4-hydroxypyridine のナトリウム塩から、77.0% の收率で得られた 1-[2'-(6-methylpyridyl)]-4-pyridone を上記と同様に、発煙硫酸と硝酸カリウムによりニトロ化すれば、24.0% の收率で 3,5-dinitro-1-[2'-(6-methylpyridyl)]-4-pyridone (Ic) が得られた。mp. 245.0–246.5°C (水). IR: 1675cm⁻¹ (C=O), 1520, 1360 (NO₂). NMR (DMSO d-6): δ 3.31 (3H, s), 7.4 (1H, m), 7.8 (2H, m), 9.61 (2H, s). Found: C, 47.99; H, 2.88; N, 19.90%; Calcd. for C₁₁H₈N₄O₅: C, 47.83; H, 2.92; N, 20.28%.

3,5-Dinitro-1-(4'-pyridyl)-4-pyridone (Id)

$1-(4'-\text{Pyridyl})-4-\text{pyridone}^5)$ を前述と同様な条件でニトロ化を行ない、36.2%の收率で、3,5-dinitro-1-(4'-pyridyl)-4-pyridone (**I_d**)が得られた。mp. 242.0-243.0°C (水)。IR: 1680 cm⁻¹ (C=O), 1520, 1350 (NO₂)。NMR (DMSO d-6): δ 7.81 (2H, dd), 8.82 (2H, dd), 9.31 (2H, s)。Found: C, 45.49; H, 2.23; N, 21.37%; Calcd. for C₁₀H₆N₄O₅: C, 45.81; H, 2.31; N, 21.37%。

3,5-Dinitro-1-methyl-4-pyridone (**I_a**)とDiethyl Sodium-acetonedicarboxylate (Na·DADC) の反応

1.0g の 3,5-dinitro-1-methyl-4-pyridone (**I_a**) を 100 cc のピリジンに溶解し、冷却下、1.7g の diethyl acetonedicarboxylate と 0.17g の金属ナトリウムから得た Na·DADC のピリジン溶液 (20 cc) を加え、50°C にて 5 時間加熱、約 2 時間で、黄色透明液が淡黄色の懸濁液となる。反応終了後、ピリジンを減圧下留去、残渣をクロロホルムで抽出、クロロホルムを留去し、残った結晶をエーテルで洗浄後、ベンゼンから再結すれば、1.08g (84.9%) の 3,5-bis(ethoxycarbonyl)-1-methyl-4-pyridone (**II_a**) が得られた。無色板状結晶、mp. 138.0-139.0°C. IR: 1735 cm⁻¹ (C=O), 1655 (C=O)。NMR (CDCl₃): δ 1.31 (6H, t), 3.73 (3H, s), 4.28 (4H, s), 7.92 (2H, s)。Found: C, 56.70; H, 5.95; N, 5.26%; Calcd. for C₁₂H₁₅N₀₅: C, 56.92; H, 5.93; N, 5.53%.

クロロホルム抽出残渣を 3K エタノールで抽出し、過剰の Na·DADC を充分取り除く、その残渣を 50cc の冷水を加え溶かす。この水溶液を 10g の酢酸ナトリウムと 10cc の酢酸を加えて

よく冷しておく。一元、0.5gのanilineと0.4gの亜硝酸ナトリウムから得たbenzenediazonium chlorideの希塩酸溶液を、よく冷しておき、先の水溶液に徐々に加える。析出する沈殿を汎取し、水、次いでメタノールでよく洗浄すれば、0.40g(31.7%)の1,3-dinitro-1-phenylhydrazonepropan-2-one(**IV**)が得られた。
 $\text{mp. } 167.0 \sim 168.0^\circ\text{C}$. IR: 3150 cm^{-1} (N-H), $1710 (\text{C=O})$, $1600 (\text{C=N})$, 1530 , $1330 (\text{NO}_2)$. NMR (acetone d-6): δ $6.10 (2\text{H}, s)$, $7.25 \sim 7.80 (5\text{H}, m)$, $12.40 (1\text{H}, \text{br.s})$. Found: C, 43.43; H, 3.14; N, 22.54%; Calcd. for $\text{C}_9\text{H}_8\text{N}_4\text{O}_5$: C, 42.86; H, 3.20; N, 22.22%.

この場合、benzenediazonium chlorideの量を、3倍当量用いて、同様に処理すれば、生成物として、0.59g(35.7%)の1,3-bis(phenylhydrazone)-1,3-dinitropropan-2-one(**V**)が得られた。
 $\text{decomp. } 138^\circ\text{C}$. IR: 3200 cm^{-1} (N-H), $1690 (\text{C=O})$, $1600 (\text{C=N})$, 1530 , $1350 (\text{NO}_2)$. NMR (acetone d-6): δ $7.1 \sim 7.7 (10\text{H}, m)$, $12.48 (2\text{H}, \text{br.s})$. Found: C, 50.68; H, 3.10; N, 23.64%; Calcd. for $\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{N}_6\text{O}_5$: C, 50.56; H, 3.39; N, 23.59%.

4-Hydroxy-3-nitro-1-phenyl-5-phenylazopyrazole (**VI**)

0.1gの1,3-bis(phenylhydrazone)-1,3-dinitropropan-2-one(**IV**)を100ccのメタノールに懸濁させ、2時間加熱還流した後、メタノールを半量まで濃縮し放冷すれば、0.08g(93.2%)の4-hydroxy-3-nitro-1-phenyl-5-phenylazopyrazole(**VI**)が得られた。赤色針状結晶(メタノール)、 $\text{mp. } 218.0 \sim 219.0^\circ\text{C}$. IR: 3400 cm^{-1} (OH), $1590 (\text{C=N})$, 1520 , $1345 (\text{NO}_2)$.

Found: C, 58.32; H, 3.43; N, 22.63%; Calcd. for $C_{15}H_{11}N_5O_3$: C, 58.25; H, 3.59; N, 22.65%.

3,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1-(2'-pyridyl)-4-pyridone (IIb)

1.0g の 3,5-dinitro-1-(2'-pyridyl)-4-pyridone (Ib) を、
Ia と同様 K 处理すれば、0.8g (66.3%) の 3,5-bis(ethoxy-
carbonyl)-1-(2'-pyridyl)-4-pyridone (IIb) が得られた。無
色フリズム晶(ベンゼン), mp. 150.0 - 151.0°C. IR: 1715 cm^{-1}
(C=O), 1665 (C=O). NMR (CDCl_3): δ 1.32 (6H, t),
4.31 (4H, q), 7.4 (2H, m), 7.9 (1H, m), 8.53 (1H, dd), 8.83
(2H, s). Found: C, 61.03; H, 4.96; N, 8.98%; Calcd.
for $C_{16}H_{16}N_2O_5$: C, 60.75; H, 5.10; N, 8.86%.

3,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1-[2'-(6'-methylpyridyl)]-4- pyridone (IIc)

無色フリズム晶(ベンゼン), mp. 168.5 - 169.0°C. IR:
1750 cm^{-1} (C=O), 1675 (C=O). NMR (CDCl_3): δ 1.42
(6H, t), 2.62 (3H, s), 4.33 (4H, q), 7.2 (2H, m),
7.82 (1H, t), 8.81 (2H, s). Found: C, 62.02; H, 5.56;
N, 8.54%; Calcd. for $C_{17}H_{18}N_2O_5$: C, 61.81; H, 5.49;
N, 8.48%.

3,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1-(4'-pyridyl)-4-pyridone (IID)

無色板状晶(ベンゼン), mp. 201.0 - 202.0°C. IR:
1755 cm^{-1} (C=O), 1650 (C=O). NMR (CDCl_3): δ 1.32
(6H, t), 4.33 (4H, q), 7.39 (2H, dd), 8.34 (2H, s), 8.82
(2H, dd). Found: C, 60.98; H, 5.11; N, 8.67%;

Calcd. for $C_{16}H_{16}N_2O_5$: C, 60.75; H, 5.10; N, 8.86%.

第4章 1,3-Dinitro-4-quinolizone
の環変換反応

4-1 はじめに。

第2章 6節で、4位あるいは6位に置換基を持つ3,5-ジニトロ-1-メチル-4(or 6)-置換-2-ピリドン(1m,n,o)と、Na·DADC, Na·EAAとの反応について検討を加え、反応点及び結合の開裂の模式についてでは、置換基のない場合と同様に反応は進行するが、炭素アニオンの初期攻撃の位置については、置換基の性質によりかわることがわかった。すなわち、電子供与基であるメチル基が、4位についている場合は、6位に、またメチル基が6位についている場合は、4位に、さうに電子吸引性の感応効果を示すメトキシ基が4位についている場合は、その4位に、いずれの場合も、4位と6位へから、電子密度の低い方の位置に、初期攻撃が起つており、置換基をもたらす場合の初期攻撃が4位(第2章5節)であったのに対して、置換基が反応経路に影響を及ぼしていることが明らかになった。

ここに基質として用いる1,3-dinitro-4-quinolizone(1p)は、一種の3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン誘導体であるが、ピリドン環の1位と6位を、1,3-ブタジエン・ユニットで環化した形であり、ピリドン環との間に共役が考えられるため、Na·DADC..あるいはNa·EAAのようなβ-ケトエステルのモノナトリウム塩との反応について、前述の1,6-dimethyl-3,5-dinitro-2-pyridone(1n)等とは、異なった置換基による影響を考えられ、興味がわくたれる。




Fig.4-1 1p

4-2 1,3-Dinitro-4-quinolizone (**1p**)とNa·DADC,
Na·EAAとの反応

1,3-Dinitro-4-quinolizone (**1p**)と1.5倍当量のdiethyl-sodioacetondicarboxylate (Na·DADC) とピリジン中で、 $0\text{--}5^\circ\text{C}$ で処理すれば、 $84.0\text{--}85.0^\circ\text{C}$ の融点を示す無色の針状結晶 (**2p**) が得られた。元素分析の結果から、生成物 **2p** は $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{NO}_8$ なる実験式をもつことがわかった。また **2p** のIRスペクトルから、エステルカルボニル基、ニトロ基、及び水酸基によると考えられる吸収が観察され、塩化銀反応においても左側性水酸基の存在が示唆された。NMRスペクトルからは、 $1.40, 1.44\text{ ppm}$ と $4.43, 4.44\text{ ppm}$ K. カラーセK異なる形状況Kある二組のエチルエステルによるとみられるシグナルが、また 8.71 ppm Kには1ケの芳香環プロトンが、さらK $11.94, 12.26\text{ ppm}$ Kには、重水交換により消失する2ケの水酸基プロトンによるとみられるシングレットピークがみえた。

以上の各データ及び第2章の **1a** と Na·DADCとの反応の結果等から、生成物 **2p** は diethyl 2,4-dihydroxy-5-nitro-isophthalate (**2p**)であることを確認した。なお **2p** の收率は 58.9% であった。




Fig. 4-2

一方、1,3-dinitro-4-quinolizone (*1p*) を 3倍当量の ethyl sodioacetoacetate と前述と同じく処理すれば、非常にわずか (5.1%) ではあるが、112.0-113.0 °C の融点を示す、無色の針状結晶 ethyl 2,6-dihydroxy-3-nitrobenzoate (*4p*) が得られた。 *4p* の構造の決定については、以下に示す各データによった。まず、元素分析の結果から、 $C_9H_9NO_6$ なる実験式をもつことがわかった。IRスペクトルには、エステルカルボニル基、ニトロ基、及び水酸基の特徴的な吸収が観察された。塩化第一鉄反応にも陽性であり、一元性水酸基の存在が示唆された。*4p* のNMRスペクトルからは 1.44, 4.48 ppm にエステルのエチル基によるとみられるシグナルが、また 6.52, 8.15 ppm には、互いに 9.0 Hz の J 値でカップリングしている、2ケの芳香環プロトンによるシグナルがみられた。この 9.0 Hz という J 値から、2ケの芳香環プロトンは互いにオルト位に位置することがわかった。さらには 12.43, 12.61 ppm に重水交換により消失する 2ケのシングルレットが観察された。




Fig.4-3

以上のように、1,3-dinitro-4-quinolizone (*1p*) と diethyl sodioacetonedicarboxylate, ethyl sodioacetoacetateとの反応でも、環の変換反応がおこり、しかもその反応が、環の変換により生じるべきもう一方の生成物が、単離確認されていないの

で、確定性に欠けるところがあろうが、得られた生成物、**2p**, **4p**から判断する限り、4-キハリゾン環の2位及び4位であると考えるのが最も妥当であろう。

Diethyl sodioacetonedicarboxylateとの反応生成物、diethyl 2,4-dihydroxy-5-nitroisophthalate (**2p**)からでは、初期攻撃が、2位と4位のどちらにおきか決定はできないが、もう一つの試薬、ethyl sodioacetoacetateとの反応生成物、ethyl 2,6-dihydroxy-3-nitrobenzoate (**4p**)から推測することができる。すなわち、ethyl sodioacetoacetateのX4ル炭素が1,3-dinitro-4-quinalzoneの4位を攻撃し、X4レン炭素が2位を攻撃したとすると、生成物は、ethyl 2,4-dihydroxy-5-nitrobenzoateになるが (Fig 4-4-a)、実際に得られた生成物は、ethyl 2,6-di-hydroxy-3-nitrobenzoate (**4p**)であり、これは、Na·EAAのX4ル炭素が**1p**の2位を攻撃し、X4レン炭素が4位を攻撃した結果と考えられる (Fig 4-4-b)。





Fig 4-4




Fig. 4-5

*1,3-Dinitro-4-pyridone (1p)*と*ethyl sodioacetoacetate*との反応で、第2章5節で述べたと同じ理由で、初期攻撃がEA Aのメチル炭素である場合に二環構造をもった塩への移行が可能であるとの考え方をすれば、*1p*の2位（2-ピリドン環の4位に相当）がNa·EAAのメチルアニオンによる求核攻撃を受けて、Meisenheimer complex (*11p*)が形成され、次いで、分子内の水素移動により新しいメチレン炭素アニオン (*12p*)が形成される。このメチレン炭素アニオンが、4-キノリゾン環の4位（2-ピリドン環の2位に相当）を分子内求核攻撃をして、[3.3.1]系の二環構造中間塩 (*15p*)を形成すると解される。この塩のカルボニル基の立ち上り構造からの電子対のやりとりにより、4-キノリゾン環の4-5位間の結合が室素（4位）に、電子対を残し開裂し、さらく4-キノリゾン環の1-2位間の結合が1位炭素に、電子対を残し開裂し、生成物である*ethyl 2,6-dihydroxy-3-nitrobenzoate (4p)*が生成されるものと考えられる。

第2段の分子内求核攻撃が、2章で述べた2-ピリドン類の場合と異なり9a位（2-ピリドン環の6位に相当）ではなく、4位（2-ピリドン環の2位に相当）のカルボニル炭素による理由としては、9a位の親電子性が縮合したピリジン環からの電子供与により、抑えられていること、また9a位炭素が正四面体構造をとりにくいうちを立体的な不利等により、今一つ残されて、親電子中心位（4位）に求核攻撃がおこったものと考えられる。

第2章1節で述べた3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類の親電子中心として期待される2位、4位、及び6位のうち、2位が残されていたのが、この4-キノリゾン系（2-ピリドンの一種として）で4位のカルボニル炭素（2-ピリドン系の2位に相当）が、求核攻撃をうけたことにより、2位、4位、及び6位の全ての位

置の親電子性が実証されたものと考える。

4-3 実験の部

1,3-Dinitro-4-quinolizone (1p)

B.S.Thyagarajan等⁵²⁾の方法に従って、ethyl 2-pyridyl-acetate⁵³⁾と ethyl ethoxymethylenemalonate⁵⁴⁾から得た 1,3-bis(ethoxycarbonyl)-4-quinolizone を加水分解し、ジカルボン酸を誘導し、さらに硝酸 ($d=1.48$)とともに加熱しニトロ化を行ない 1,3-dinitro-4-quinolizone (1p) を得た。mp. 243°C (decomp.) (Lit. decomp 230°C)⁵²⁾

1,3-Dinitro-4-quinolizone (1p) と Na·DADCとの反応

1.0g の 1,3-dinitro-4-quinolizone (1p) を 150cc の DMF 溶液に溶解し、攪拌下、0.11g のナトリウムと 1.4g の diethyl acetonedicarboxylate から得た diethyl sodioacetonedicarboxylate の DMF 溶液 (50cc) を -5~0°C を保ちながら、5 時間で滴下、混合物をそのまま一夜 -5~0°C に保ち、使用したナトリウムと当量の希塩酸を加え、減圧下、できりだけ低温で、溶媒の DMF を留去する。さらに pH を 3~4 に調整し、クロロホルムで抽出、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、クロロホルムを留去、ベンゼン溶媒で、シリカゲルカラムクロマトグラフィー付す。ベンゼン溶媒から、0.75g (58.9%) の diethyl 2,4-dihydroxy-5-nitroiso-phthalate (2p) が得られた。無色板状晶 (石油ベンジン)。mp. 85.0~86.0°C. IR: 3200 cm⁻¹ (OH), 1750 (C=O), 1545, 1350 (NO₂). NMR (CDCl₃): δ 1.40 (3H, t), 1.43 (3H, t), 4.43 (2H, q), 4.44 (2H, q), 8.71 (1H, s), 11.94

(1H, s), 12.26 (1H, s). Found: C, 48.31; H, 4.44; N, 4.61%; Calcd. for $C_{12}H_{13}NO_8$: C, 48.17; H, 4.38; N, 4.70%

1,3-Dinitro-4-quinolizone (1p) と Na·EAA の反応

1.0g の 1,3-dinitro-4-quinolizone (1p) を上記と同様 K. 0.11g のナトリウムと 0.83g の ethyl acetoacetate から得た ethyl sodioacetoacetate と処理し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーへベンゼン溶液から 0.05g (5.2%) の ethyl 2,6-di-hydroxy-3-nitrobenzoate (4p) が得られた。無色針状晶(石油ベンジン), mp. 112.0-113.0°C. IR: 3100 cm^{-1} (OH), 1650 (C=O), 1540, 1350 (NO₂). NMR (CDCl_3): δ 1.44 (3H, t), 4.48 (2H, q), 6.52 (1H, d J=9.0Hz), 8.15 (1H, d J=9.0Hz), 12.43 (1H, s), 12.61 (1H, s). Found: C, 47.51; H, 3.81; N, 6.08%; Calcd. for $C_9H_9NO_6$: C, 47.58; H, 3.99; N, 6.17%.

第5章 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン類の Meisenheimer complex の安定性について

5-1 はじめに

前章まで述べてきたように、3,5-ジニトロ-1-置換-2(or4)-ピリドン類と、活性メチレン化合物のモノナトリウム塩との環の変換反応において、まずはじめに、Meisenheimer型の付加中間体が形成されることが明らかになってきた。

1,3-ジニトロ-5-置換ベンゼン、あるいは1,3,5-trinitrobenzeneの種々のMeisenheimer complexについて、その色と構造の關係や種々の反応の中間体としての性質に関する研究が古くより多くなされており、前掲の Strauss の総説²⁰⁾によくまとめられている。ジニトロピリジン系の Meisenheimer complex についても、二、三の報告がみられるが、^{55,56)}ジニトロピリドン類(1)の Meisenheimer complex については検討されておらず、既知の、ベンゼン系、ピリジン系から得られる Meisenheimer complex との安定性の比較においても興味がもたらされるところである。





Fig. 5-1


そこで、前章まで取り扱って来た 3,5-ジニトロ-1-置換-2(or4)-ピリドン類(1, or I) と sodium methoxide からなる Meisenheimer complex の安定性について、可視スペクトルを用いて、その平衡定数から論じ、ベンゼン系の Meisenheimer

complexとの比較をおこなった。

5-2 3,5-ジニトロ-1-置換-2(or 4)-ピリドン類と sodium methoxideによる Meisenheimer complexについて
3,5-Dinitro-1-methyl-2-pyridone (**Ia**) をメタノール溶液中、 sodium methoxideと混金すると、 ただちに黄色を帯びた溶液となり、 可視部に強い吸収極大 ($450\text{ nm } \varepsilon = 3.11 \times 10^4$) を示し、 Meisenheimer complexが形成されたものと考えられる。他の 3,5-ジニトロ-1-置換-2-ピリドン (**1b, 1f, 1e, 1k**) 及び 3,5-ジニトロ-1-置換-4-ピリドン (**Ia, Ib, Id**) も **1a** の場合と同様に sodium methoxideの作用により、 ただちに Meisenheimer complexを形成し、 2-ピリドン系の Meisenheimer complexは $440\sim450\text{ nm}$ に吸収極大を示し、 4-ピリドン系の Meisenheimer complexは $350\sim360\text{ nm}$ 付近に極大値を示した。



- a: methyl
- b: *m*-dinitrobenzyl
- e: 2',4'-dinitrophenyl
- f: 2'-pyridyl
- k: methoxy



- a: methyl
- b: 2'-pyridyl
- d: 4'-pyridyl


Fig. 5-2

ここで得られた Meisenheimer complexは、吸湿性で、単離はしていないが、 NMRスペクトルから、 Meisenheimer complex

其特徴的な環プロトンがみられた。すなわち、 sp^3 混成炭素につれているプロトンが $5.5 \sim 6.0 \text{ ppm}$ K、 sp^2 混成炭素についているプロトンが $8.5 \sim 8.7 \text{ ppm}$ K、それそれダブルレットとして観察された。(Table 5-2 参照)

第二章5節で既に述べたように、2-ピリドン系の場合、 450nm 付近に吸収極大を示す Meisenheimer complex は、求核試剤が、4位を攻撃して形成されたものと考えられる。

こうして得られたピリドン系の Meisenheimer complex のメタノール溶液の可視スペクトルから、この系の平衡定数を求め、Meisenheimer complex の安定性の目安とした。平衡定数 K の決定については、次式によった。



$$K = \frac{[C]}{([P_0] - [C])([OMe] - [C])} = \frac{A_i/\epsilon}{([P_0] - A_i/\epsilon)([OMe] - A_i/\epsilon)}$$

P: Pyridone

C: Meisenheimer complex

A_i: OMe の任意の濃度 $[OMe]$ に対応する吸光度

ϵ : モル吸光係数

この平衡系において、平衡が 100% Meisenheimer complex の方へすれた場合は、[C] は pyridone の初期濃度 $[P_0]$ と等しく、その時の吸光度を A とすれば、モル吸光係数 ϵ は $\epsilon = A/[C] = A/[P_0]$ となる。この式を用いて任意のモル濃度における OMe を作用させた場合の吸光度を A_i とし、さるくその時の Meisenheimer complex

の濃度を $[C_i]$ とすれば $[C_i] = A_i/\epsilon$ となる。例えは、3,5-dinitro-1-methyl-2-pyridone (**1a**) と sodium methoxide から形成された Meisenheimer complex についてみると、**1a** の濃度を $2.0 \times 10^{-5} M/l$ と一定にしておき、sodium methoxide の **1a** K 対するモル比を、等モルから順次大きくしてゆき、それぞれの場合の吸光度を求めると、そのモル比が 10~20 位程度のところになると、もはや吸光度の増大がみられなくなり、50 位のところでも、ほとんど変化が認められず、平衡がすでに Meisenheimer complex の方へ、すれせつてしまっているものと考えられる。そこで、モル比が 50 のところの吸光度 (0.62) を使用し、モル吸光係数を求め (3.11×10^4)、この ϵ を使用し、遂に各々の OMe^- 濃度における吸光度 A_i の値から、平衡定数 K を求めた。その結果を Table 5-1 に示した。

Table 5-1

[Pyridone] (1a) M/l	[OCH ₃ ⁻] M/l	Absorbance	$A/\epsilon = [C]$	K
2.0×10^{-5}	4.0×10^{-5}	0.138	0.44×10^{-5}	7.97×10^3
"	6.0	0.193	0.62	8.30
"	8.0	0.244	0.78	8.87
"	10.0	0.319	1.03	11.6
"	12.0	0.326	1.05	9.95
"	14.0	0.376	1.21	11.8
"	18.0	0.605	1.95	24.3
"	20.0	0.623	2.00	
"	50.0	0.627	2.02	
"	100.0	0.624	2.01	

Table 5-1 から、3,5-dinitro-1-methyl-2-Pyridone (1a) + sodium methoxide と Meisenheimer complex の平衡反応に於




Fig. 5-3

ける平衡定数 K の値としては、 $9 \sim 10 \times 10^3$ と考えるのが妥当であろう。同様にして、幾つかの 3,5-ジニトロ-1置換-2(or4)-ピリドンと sodium methoxide との Meisenheimer complex の平衡定数 K を求めた。その結果は NMR データと共に Table 5-2 に示した。

さて、この可視スペクトルの測定に際して、2-ピリドン系の場合には、380 nm 附近 K 、また 4-ピリドン系の場合には 300 nm 附近 K 、それぞれ、等吸収点が観察されることがあり、当該の平衡反応以外の副反応は起こっていないものと考えられる。

1-置換基の違いによる Meisenheimer complex の安定性は、Table 5-2 に示されている K の値から、1-置換基の基としての電気陰性度と密接な関係があり、電気陰性度が大きい、置換基をもつものほど、安定な Meisenheimer complex を形成するものと云えよう。1-Xトキシ体の Meisenheimer complex が予期以上に不安定であるのは、N-OMe の共鳴効果が重要な役割をせず、感応効果が大きく寄与しているためと解釈される。

2-ピリドン系では、1-置換基の性質が Meisenheimer complex の安定性に大きな影響を及ぼしている (1-Xメル体の K と 1-(2'-ピリジル)体の K の比は 1 : 100) のに対して、4-ピリドン系の場合には、

Table 5-2

Meisenheimer Complexes	R	λ_{max}^{nm} (ϵ) $\times 10^4$	K	M'	NMR		
					$H_\alpha \delta$	$H_\beta \delta$	$-CH_3 \delta$
	$-CH_3$	450 (3.11)	9×10^3 \downarrow 10×10^3	5.94 (d, 1.5Hz)	8.71 (d, 1.5Hz)	3.16	
		444 (2.99)	1×10^5 \downarrow 2×10^5	6.02 (d, 2.0Hz)	8.78 (d, 2.0Hz)	2.96	
		442 (2.95)	1×10^6 \downarrow 2×10^6	6.80 (d, 2.5Hz)	8.68 (d, 2.5Hz)	3.25	
	$-OCH_3$	440 (3.22)	$> 10^6$	6.03 (d, 1.5Hz)	8.61 (d, 1.5Hz)	3.25	
		440 (2.37)	$> 10^6$	6.26 (d, 1.5Hz)	8.82 (d, 1.5Hz)	3.14	
	$-CH_3$	356 (2.11)	1×10^3 \downarrow 2×10^3	6.22 (d, 1.5Hz)	8.59 (d, 1.5Hz)	3.16	
		343 (1.92)	6×10^3 \downarrow 9×10^3	7.08 (d, 2.5Hz)	9.37 (d, 2.5Hz)	3.16	
		338 (1.96)	3×10^4 \downarrow 4×10^4	6.47 (d, 1.5Hz)	8.74 (d, 1.5Hz)	3.14	

その差があまり大きくなない ($1-X$ チル体の K と $1-(2'-\text{ピリジル})$ 体の K の比は約 1.5 ± 10) ことがわかる。これは、導入された、 X トキシ基に対して、パラ位にある置換基の電子的効果が、Meisenheimer complex の安定性に大きな寄与をしていることを示しているものと考えられ、ベンゼン系の Meisenheimer complex の安定性が、2位及び 6位の置換基よりも 4位の置換基によるという事実と対応するものである。

2-ピリドン系の Meisenheimer complex と 4-ピリドン系の Meisenheimer complex とでは、一般的に 2-ピリドン系の方が安定であることが、 K の値から推測される。この理由としては、Fig 5-4 に示すように、極限構造式を考えると、2-ピリドン系の場合は、負電荷が遠く離れているのにに対して、4-ピリドン系の場合には、負電荷が近接しているため安定化のための寄与が小さくなると考えられる。











Fig. 5-4

Table 5-3 について、ベンゼン系、あるいはピリジン系の Meisenheimer complex の平衡定数と、今回測定した 2-ピリドン系の Meisenheimer complex の平衡定数を比較してみると、ピリドン系の Meisenheimer complex の安定性が、ベンゼン系、あるいはピリジン系の Meisenheimer complex のそれより大きくなることがある。

Table 5-3

			
$K = >10^6 \sim 1 \times 10^3$	$K = 4 \times 10^4 \sim 1 \times 10^3$	$K = 1 \sim 2 \times 10^4$	
			
$K = 20$ ⁵⁷⁾	$K = 2$ ⁵⁵⁾	$K = 1 \sim 2 \times 10^4$ ⁵⁸⁾	$K = 2 \sim 4 \times 10^3$ ⁵⁶⁾

このことは、Fig 5-4 にみられるように、2あるいは4-ピリドン系の Meisenheimer complex では、カルボニル基が、アニオンを安定化させるのに寄与しているのに對して、ベンゼン系、あるいはピリジン系の Meisenheimer complex では、このような寄与が期待できないためと考えられる。

ベンゼン系、ピリジン系のうち、gem-Xトキシ型をとる Meisenheimer complex は、モノメトキシ型の Meisenheimer complex に比べて、異常に大きな K の値をもち安定 (Table 5-3)

であるが、2-ピリドン系の場合は、gem-Xトキシ型のMeisenheimer complex も他の Meisenheimer complex と安定性に於いてそれほど大きな差はない。これは、ベンゼン系、あるいはピリジン系に於ける gem-Xトキシ型の Meisenheimer complex が π -complex によることにより、既置換Xトキシ基が環平面からずれ、両オルト位のニトロ基が環と同一平面をとりやすくなり安定化するためと解釈できるが、2-ピリドン系の Meisenheimer complex では、どのような効果より、カルボニル基の安定化効果が大きく、平衡定数も、他の Meisenheimer complex の光とあまり変わらないものと考える。

以上、環の変換反応の基質として用いた 3,5-ジニトロ-1置換2-ピリドン類、および 3,5-ジニトロ-1置換-4-ピリドン類は、Meisenheimer complex の平衡定数からみても、ポリニトロベンゼン系、あるいはジニトロピリジン系の Meisenheimer complex のそれより大きく、安定であることがわかれ、分光学的にも、3,5-ジニトロ-1置換-2(or 4)-ピリドン類が強い親電子性をもつ化合物であることが実証されたものと若える。

5-3 実験の部

Pyridone の濃度は、 $2 \times 10^{-5} M$ とした。Meisenheimer complex の生成及び可視スペクトルの測定に使用したメタノールは、マグネシラムメテラートで加熱還流した後、30-cm-Widmer 分留管を用いて、3度蒸留したもの用いた。Sodium methoxide は、メタノールKナトリウムを湯かし、メチルオレンジを指示薬として 0.01N-塩酸で滴定し濃度を決定し、必要量を取り出して使用した。Pyridone 液と sodium methoxide を混合してから測定までの時間は、10分とした。また、時間経過による、吸

吸位置及び吸強度の変化はみとめられなかつた。測定温度は多少の変化はあるが $10\sim13^{\circ}\text{C}$ であつた。

Referrences

- 1) for example H. S. Mosher, "Heterocyclic Compounds," Vol. 1, Chap. 8, ed. by R. C. Elderfield, John Wiley & Sons, New York (1950).
- 2) A. E. Tschichibabin, J. Russ. Phys. Chem. Soc., 46, 1216 (1914). cf. Chem. Abstr., 9, 1901 (1915).
- 3) T. Zincke, Ann., 330, 367 (1904).
- 4) F. W. Bergstrom and S. H. McAllister, J. Am. Chem. Soc., 52, 2845 (1930).
- 5) K. Ernst and J. Water, Ber., 54, 1351 (1921).
- 6) E. Ochiai, "Aromatic Amine Oxides," Elsevier Publishing, Amsterdam (1967).
- 7) A. R. Katritzky and J. M. Lagowski, "Chemistry of the Heterocyclic N-Oxides," Academic Press, London (1970).
- 8) E. C. Taylor and A. J. Crovetti, J. Org. Chem., 19, 1633 (1954).
- 9) 滝名正和, 薬誌, 81, 594 (1961).
- 10) B. Bobranski, L. Kochansko, and A. Kowalewska, Ber., 71, 2385 (1938).
- 11) 村上増雄, 松村崇三, 日化誌, 20, 393 (1948).
- 12) 堅田貞佐, 薬誌, 67, 51 (1947).
- 13) 滝名正和, 第三回複素環化学会講演予稿集, S-51 (1972).
- 14) E. Matsumura, F. Ishibashi, and T. Nashima, Bull. Chem. Soc. Jpn., 43, 3540 (1970).
- 15) S. Sugasawa and M. Kirisawa, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 4, 139 (1956).

- 16) E. Matsumura, M. Ariga, and T. Ofuji, Bull. Chem. Soc. Jpn., 43, 3210 (1970).
- 17) E. Matsumura and M. Ariga, Mem. Osaka Kyoiku Univ., 19, 77 (1970).
- 18) E. Matsumura and M. Ariga, Bull. Chem. Soc. Jpn., 46, 3144 (1973).
- 19) E. Matsumura and M. Ariga, Bull. Chem. Soc. Jpn., 50, 237 (1975).
- 20) M. J. Strauss, Chem. Rev., 70, 667 (1970); Acc. Chem. Res., 7, 181 (1974).
- 21) W. Zimmermann, Z. Physiol. Chem., 253, 257 (1931).
- 22) R. Foster and C. A. Fyfe, Tetrahedron, 22, 1831 (1966).
- 23) O. Fischer and M. Chur, J. Prakt. Chem., 93, 363 (1916).
- 24) H. Tomisawa and R. Fujita, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 21, 2585 (1973).
- 25) H. Tomisawa and H. Hongo, Tetrahedron Lett., 2465 (1967); Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 18, 925 (1970).
- 26) E. C. Taylor and R. O. Kan, J. Am. Chem. Soc., 85, 776 (1963).
- 27) F. C. Schaefer, K. R. Huffman, and G. A. Peters, J. Org. Chem., 27, 548 (1962).
- 28) M. I. Foreman, R. Foster, and M. J. Strauss, J. Chem. Soc., 2112 (1969); M. J. Strauss, T. Jensen, H. Shran, and K. O'Conner, J. Org. Chem., 35, 383 (1970).
- 29) K. Kohashi, Y. Okura, and T. Momose, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 18, 2157 (1970); ibid., 19, 213, 2065 (1971); ibid., 21, 118 (1973). - 72 -

- 30) W. S. Benica and O. Givsvold, J. Am. Pharm. Assoc., 34,
42 (1945).
- 31) F. Ratz, Monatsh. Chem., 26, 1487 (1905).
- 32) C. T. Chang, F. C. Chen, T. S. Chen, K. K. Hsu, T. Ueng,
and M. Hung, J. Chem. Soc., 3414 (1961).
- 33) A. R. Katritzky, J. Chem. Soc., 2063 (1956).
- 34) 松村崇三、有賀正祐、佐田康夫、第10回複素環化學討論会(筑
波)。講演要旨集 p.146 (1977).
- 35) 松村崇三、有賀正祐、佐田康夫、第11回複素環化學討論会(金
沢)。講演要旨集 p.132 (1978).
- 36) E. A. Prill and S. M. McElvain, Org. Synth., Coll. Vol.
II, 419 (1951).
- 37) A. Raczka, A. Swirska, and H. Bojarska Dahiig, Acta
Pola. Pharm., 20, 155 (1963).
- 38) A. H. Barrie, G. T. Newbold, and F. S. Spring, J. Chem.
Soc., 2590 (1951).
- 39) E. Matsumura, T. Hirooka, and K. Imagawa, Nippon Kagaku
Zasshi, 82, 616 (1961).
- 40) T. Takahashi and F. Yoneda, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo),
6, 442 (1958).
- 41) F. Ramirez and P. W. Ostwalden, J. Am. Chem. Soc., 81,
156 (1956).
- 42) M. von Ammers and H. J. den Hertog, Rec. Trav. Chim.
Pays-Bas, 75, 1259 (1956).
- 43) F. T. Dinan and H. Tieckelman, J. Org. Chem., 29, 1650
(1964).

- 44) V. M. Rodinov, I. V. Machinskaya, and V. M. Belikov,
Zhur. Obschei. Khim., 18, 917 (1948). cf. Chem.
Abstr., 43, 127 (1949).
- 45) D. J. Cook, R. E. Bowen, P. Sorter, and E. D. Daniels,
J. Org. Chem., 26, 4949 (1961).
- 46) K. Takeda and K. Igarashi, Shionogi Kenkyusho Nenpo, 1,
1 (1951).
- 47) S. M. Parmeter, Org. Reactions, 10, 1 (1959).
- 48) T. Takahashi and F. Yoneda, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo),
6, 365 (1958).
- 49) F. H. Allen and J. R. Thirtle, Org. Synth., Coll. Vol.
III, 136 (1955).
- 50) R. Adams and S. Miyano, J. Am. Chem. Soc., 76, 3168
(1954).
- 51) P. A. de Villiers and H. J. den Hertog, Rec. Trav. Chim.
Pays-Bas, 76, 647 (1957).
- 52) B. S. Thyagarajan and P. V. Gopalakrishnan, Tetrahedron,
20, 1051 (1964).
- 53) R. B. Woodward and E. C. Kornfeld, Org. Synth., Coll.
Vol. III, 413 (1955).
- 54) W. E. Parham and L. J. Reed, Org. Synth., Coll. Vol.
III, 395 (1955).
- 56) C. Abbolito, C. Iavalone, G. Illuminati, E. Stegel,
and A. Vazzoler, J. Am. Chem. Soc., 91, 6746 (1969).
- 56) P. Bemporad, G. Illuminati, and F. Stegel, J. Am. Chem.
Soc., 91, 6742 (1969).

- 57) V. Gold and C. Rochester, J. Chem. Soc., 1692 (1964).
- 58) T. H. Fendler, E. J. Fendler, and C. E. Griffin, J. Org. Chem., 34, 1689 (1969).

謝 辞

本研究は、大阪教育大学有機化学研究室にて行なわれたものであり、終始度ろぬ暖かい御指導を贈りまして松村栄三教授へ心より感謝いたします。

種々の適切な御助言をしていただきいた菜嶋健夫教授、森泰助教授にお礼申し上げます。

また、本研究に際して、有益な御討論をしていただきいた任田康夫助手を始めとする有機化学研究室の方々へ感謝いたします。

NMRスペクトルの測定に御便宜をお計り下さり、且つ、有益な御助言を下さいました、大阪大学産業科学研究所の三角莊一教授へ感謝いたします。