Title	2-Amino-3, 3-dichloroacrylonitrile (ADAN) の合成と反応に関する研究
Author(s)	松村, 興一
Citation	大阪大学, 1976, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/31729
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、 〈a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed"〉 大阪大学の博士論文について 〈/a〉 をご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏名・(本籍)	まつ 松	むら 村	こう 興	いち 一
学位の種類	薬	学	博	士
学位記番号	第	3646	号	
学位授与の日付	昭和51年4月5日			
学位授与の要件	学位規則第5条第2項該当			
学位論文題目	2-Amino-3,3-dichloroacrylonitrile (ADAN) の合成と反応 に関する研究			
論文審査委員	(主査) 教授	吉岡 一郎		
	(副査) 教授	池原 森男	教授 柘井雅一郎	教授 田村 恭光

論 文 内 容 の 要 旨

緒 論

著者は医薬品や種々のヘテロ環状化合物の合成原料として利用価値の高い炭素数3~4のニトリル類の合成研究に従事してきたが、さらにニトリル類の有用性の一層の拡大を図るべく、ニトリル類を出発原料とするアミノ酸の新しい合成ルート(式-1)の開発を目的として本研究に着手した。

アルデヒドを出発原料とするアミノ酸の合成法は strecker 法をはじめ多くの方法が知られているが、ニトリルを出発原料とする方法は近年二、三の方法が報告¹⁾されているが、本研究開始当時は Baumgarten 法が知られていたにすぎなかった²⁾。

また一方、C≡N三重結合へのシアン化水素の付加反応は、シアン化水素自身の低重合による adenine の prebiotic な生成経路中に存在することが知られており³⁾、実際 adenine の合成法の一つとなっている⁴⁾。またそのほかシアノ基が隣接炭素上の電子吸引性基により活性化されている場合に行ることが知られていた⁵⁾。

著者は式-1によるフェニルアラニンの合成を目的として検討したが、これは成功しなかった。

しかし、一連の検討において dihalogenoacetonitrile の C≡N 基にシアン化水素が容易に付加し、1:1付加物を与えること、およびこのものゝ構造が iminonitrile 構造でなく enaminonitrile 構造であることを見出した(X=Clのとき2-amino-3,3-dichloroacrylonitrileを略し、以下ADANと

称する)。

ADANおよび4は分子中に2個のハロゲン原子, C=C二重結合, アミノ基, シアノ基を有する多官能性化合物であり, 合成も容易であるところからその反応性を検討した。

ADANおよび4は3,3-dihalogenodehydroalanineの誘導体とみなすことができるが, 3位のハロゲン原子, C=C二重結合が種々の求核試薬に対して活性であること, およびこのハロゲン原子の還元あるいは有機金属試薬との反応により水素, アルキル基, アリール基に変換されることを利用し一群のアミノ酸の誘導体に導けることを確かめた。

また一方ADANおよび4はC=C二重結合に直結した4個の官能基を有し, それらが下図に示すような4通りの組合せで環化反応に参与する可能性が考えられた。

AおよびBの組合せによるヘテロ環状化合物の合成はβ-halogeno-およびβ,β-dihalogeno化合物などで比較的知られているところから, 主としてCおよびD様式によりヘテロ環状化合物の合成を検討した。その結果C様式により5-アミノ-および5-メルカプトオキサゾール類が, またD様式の反応によりイミダゾール類がそれぞれ高収率で得られることを見出した。

このようにADANおよび4がアミノ酸誘導体およびヘテロ環状化合物の合成原料として有用であることを明らかにした。

本 論

第I章 2-Amino-3,3-dichloroacrylonitrile(ADAN)の合成

第I章第1節 ADAN発見の端緒

ニトリルを出発原料とするアミノ酸合成(式-1)のmodel出発物としてC₆H₅CH₂CNを選び, シアン化水素との反応を検討したがいずれも原料回収に終わった。C₆H₅CCl₂CNに誘導したところ相当するiminonitrileを合成することができた。亜鉛末による塩素原子の還元を試みたところiminonitrile(16)と推定される化合物が得られたが, スペクトルデータからenaminonitrile(1a)であること

がわかった。また還元的アセチル化でも 2, 3 しか得られなかった。この実験から iminonitrile 基の α -位に水素原子が存在すると、より安定な enamionitrile へ異性化すると知見を得た。

第 I 章第 2 節 ADAN の合成

シアノ基の α -位に水素原子を有する種々のハロゲノニトリルとシアン化水素との反応を検討中、dihalogenoacetonitrile のシアノ基に HCN が容易に付加し、1 : 1 付加物を高収率で与えることを見出した。この付加物の構造は iminonitrile 構造を有する 5 とのスペクトルデータの比較 (Table I) により enamionitrile 構造 (ADAN および 4) をとることを確認した。

ADAN の若干の性質

合成の容易な ADAN を用いて R_1SNa , $\text{R}_1\text{R}_2\text{NH}$ との反応を行なった。 R_1SNa との反応は室温で進行し相当する bis-置換体を与えたが、 $\text{R}_1=\text{CH}_3$, C_2H_5 のときは低収率であり、この場合は化合物 16 の加水分解による方法が有利である。

一方 $\text{R}_1\text{R}_2\text{NH}$ との反応では R_1SNa の場合と異なり $\text{CHCl}_2\text{CONR}_1\text{R}_2$, $\text{CHCl}_2\text{CONH}_2$ の混合物が得られた。この推定反応機構を示す。

Table I. Comparison of Spectral Data of Iminonitrile (5) and Enaminonitriles (ADAN, 4)

	$\text{CCl}_3-\text{C}=\text{C} \begin{matrix} \text{NH} \\ \text{CN} \end{matrix}$ (5)	$\text{Cl}-\text{C}=\text{C} \begin{matrix} \text{NH}_2 \\ \text{CN} \end{matrix}$ (ADAN)	$\text{Br}-\text{C}=\text{C} \begin{matrix} \text{NH}_2 \\ \text{CN} \end{matrix}$ (4)
mp or bp	bp 24° (0.3mmHg)	mp 61°	mp 76-7°
IR ν_{max} cm ⁻¹	(Liq. film) 3230, 2250, 1634	(Nujol) 3400, 3320, 3190, 2250, 1610	(Nujol) 3450, 3340, 3200, 2250, 1610, 1594sh
NMR (CDCl ₃) δ ppm	11.36, 11.84 (2 : 1, br)	3.67 (br)	3.86 (br)
UV $\lambda_{\text{max}}^{\text{CHCl}_3}$ (ϵ)	260.0 (177)	260.5 (9300)	264.5 (9660)

第II章 ADAN誘導体の合成と反応

第II章第1節 ADANのN-Acyl体およびSchiff baseの合成

ADANおよび4は空気中ではやや不安定であり徐々に分解する。そこでNH₂基の誘導体としてN-Acyl体およびSchiff baseの合成を行なった。代表化合物例をTable IIに示す。

Table II. Derivatives of 2-Amino-3,3-dihaloacrylonitriles

Compd. no.	X	$\begin{array}{l} \text{X} \\ \diagdown \\ \text{C}=\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{A} \\ \searrow \text{CN} \end{array} \\ \diagup \\ \text{X} \end{array}$	Starting mat.	Yield (%)	Mp (°C)
6a	Cl	NHCHO	ADAN	97	148–150
b	Cl	NHCOCH ₃	{ ADAN 5	{ 98 58	128–130
c	Cl	NHCO _n -C ₃ H ₇	ADAN	98	83–84
d	Cl	NHCOCF ₃	ADAN	98	76–77
e	Br	NHCOCH ₃	4	93	172–173 (d)
f	Br	NHCOCF ₃	4	93	89–90.5
7	Cl	N(COCH ₃) ₂	{ ADAN 6b	{ 72 ~100	oil
8	Cl	N=CH-OC ₂ H ₅	ADAN	96	bp 62–63/3 mmHg
9a	Cl	N=CH-C ₆ H ₅	ADAN	95	78–79
b	Br	N=CH-C ₆ H ₅	4	93	97–98
c	Cl	N=CH- <i>o</i> -HOC ₆ H ₄	ADAN	95	124–125
d	Cl	N=CH- α -Naphthyl	ADAN	96	121–122
e	Cl	N=CH- α -Thienyl	ADAN	94	108–110

第II章第2節 Imide化合物の合成

ADANおよびそのN-acetyl体(6b)とAc₂Oとを触媒量の硫酸の存在下に反応させると imide 化合物(10a)が one step で得られることを見出した。

この反応は ADAN, 4, 2-amino-3,3-bis(substituted mercapto)-acrylonitrile およびこれらの N-acyl 体で一般的であることがわかった。

Table III. Preparation of 2-Acylamino-3,3-bisubstituted-N-acylacrylamides (10)

Compd. no.	X	(10) R	R'	Method	Y(%)	Mp(°C)
10a	Cl	CH ₃	CH ₃	{ A B }	{ 93 95 }	174-178 (d)
b	Br	CH ₃	CH ₃	A	93	167-169 (d)
c	Cl	CH ₃	n-C ₃ H ₇	B	85	172-174 (d)
d	Cl	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	{ A B }	{ 85 92 }	191-194 (d)
e	Cl	n-C ₉ H ₁₉	n-C ₉ H ₁₉	A	93	158-160 (d)
f	SCH ₃	CH ₃	CH ₃	{ A B }	{ 75 47 }	183-185

反応機構の考察

ニトリルから直接イミド化合物を与える文献例としては、ニトリルとカルボン酸とを酸触媒存在下、200°以上の高温に加熱した場合シアノ基とカルボキシル基との交換反応が起こり、その中間体としてイミドが単離されることが古くから知られている⁶⁾。またβ-ketonitrileではβ位のカルボニル基の関与が考えられ、この場合は緩和な条件で相当するイミド化合物を与えることが知られている⁷⁾。

ADAN, 4およびそれらのN-acyl体からの反応も緩和であり、同様な2位N-acyl基の関与が考えられる。

を検討した。

Schiff base (9) と S, O, N- nucleophile とは容易に反応し、単なる置換生成物 (15) が好収率で得られた (Table IV)。

Table IV. Preparation of Various Schiff Bases (15)

Compd. no.	Y	R	Yield (%)	Mp (°C)
15a	CH ₃ S	C ₆ H ₅	87	57—59
b	C ₆ H ₅ S	C ₆ H ₅	88	140—141
c	CH ₃ O	C ₆ H ₅	67	89—90
d	C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₅	84	72—74
e	-NH	C ₆ H ₅	79	121—123
f		C ₆ H ₅	82	145—146

一方、N-acyl 体 (6) の場合には求核試薬の種類により異なった生成物を与えた。即ち S-nucleophile との反応では単なる置換生成物 (16 および 17) が得られたが、O-nucleophile の場合には主生成物は orthoester (18) であった。また Schiff base (9) との最大の相違点は N-nucleophile との反応であり通常 5-aminoxazole deriv. (19) が得られた。代表的な化合物例を Table V に示す (19 は第三章第 1 節で詳述)。

Table V.

Compd. no.	Structure	Yield (%)	Mp (°C)
16a	$(\text{CH}_3\text{S})_2\text{C}=\text{C}\begin{matrix} \text{NHCCH}_3 \\ \text{CN} \end{matrix}$	92	122–123.5
b	$(\text{C}_2\text{H}_5\text{S})_2\text{C}=\text{C}\begin{matrix} \text{NHCCH}_3 \\ \text{CN} \end{matrix}$	89	86–87
17a	$\begin{matrix} \text{CH}_3\text{S} \\ \text{Cl} \end{matrix}\text{C}=\text{C}(\text{NHCCH}_3)\text{CN}$	63	145–147
b	$\begin{matrix} \text{C}_6\text{H}_5\text{S} \\ \text{Cl} \end{matrix}\text{C}=\text{C}(\text{NHCCH}_3)\text{CN}$	80	137–138
18a	$(\text{CH}_3\text{O})_3\text{CCH}\begin{matrix} \text{NHCCH}_3 \\ \text{CN} \end{matrix}$	86	91–92
b	$(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_3\text{CCH}\begin{matrix} \text{NHCCH}_3 \\ \text{CN} \end{matrix}$	79	103–105

また化合物 6 の CN 基を COOCH_3 , CONH_2 , CONHCCH_3 , COOH 等に変換した 2-Acylamino-3,3-dichloroacrylic acid deriv. の場合でも 3 位の塩素原子は活性であった。S-nucleophile との代表的な反応例を Table VI に示す。

Table VI. Preparation of 2-Acylamino-3,3-bis(substituted-mercapto)-acrylic Acid Derivatives

Y	R ₁	R	Yield (%)	Mp (°C)
COOCH_3	C_6H_5	CH_3	87	129–132
CONH_2	CH_3	CH_3	60	166–168
CONH_2	C_6H_5	CH_3	70	159–160
$\text{CONHC}(\text{CH}_3)_3$	C_6H_5	CH_3	86	211–212
CONHCCH_3	C_6H_5	CH_3	58	153–155
COOH	C_6H_5	CH_3	42	173–175(d)

第 II 章第 5 節 亜鉛末還元および有機銅試薬との反応

Schiff base (9 a) を亜鉛末還元すると monochloro 体を得られ、また N-acyl 体 (6) と di-n-butylcopper lithium との反応でも 3 位ハロゲン原子の一方が置換された。これら生成物の configuration は不明であるが、共に一方の異性体が選択的に生成している。

これら monohalogeno 化合物の 3 位のハロゲン原子は活性であり、例えば N, S-nucleophile との反

Table VII. 2-Substituted-5-(substituted amino) oxazole-4-carbonitriles

Compd. no.	NR ₁ R ₂	R	Starting mat.	Yield (%)	Mp (°C)
19a	NH ₂	CH ₃	6 b	22-56	152-153
b	NHNH ₂	CH ₃	6 b	88	163-165(d)
c	NHCH ₃	CH ₃	6 b	98	116-117
d	NHCH ₂ CH ₃	CH ₃	6 b	99	63-64
e	NH-	CH ₃	{ 6 b 7 }	{ 98 98 }	84-85
f		CH ₃	{ 6 b 6 e 7 }	{ 98 98 ~100 }	81-82
g		H	6 a	90	112-113
h		CF ₃	{ 6 b 6 f }	{ 98 97 }	46-47
i		n-C ₃ H ₇	6 c	98	34-35
j		CH ₃	6 b	97	46-47

Bifunctional amineとして1,3-propanediamineとN-acyl体(6b)との反応でも同様の閉環反応によりoxazole(19)が得られたが、1,2-ethylenediamineおよび2-aminoethanethiolと6bとの反応ではoxazole(19)はほとんど生成せず、もう一つの五員環化合物である20a, bが得られた。

反応機構の考察

N-Acy体(6)とアミンとの反応では、二の例外が認められるものの、ほとんどの場合oxazole(19)に閉環した。この閉環反応の機構を次の様に推定している。

Mechanism

Y	R ₁ R ₂ NH	(19)		(25)	
		Yield (%)	Yield (%)	Mp (°C)	
CN	n-PrNH ₂	99	—	—	
"		98	—	—	
COOCH ₃	n-PrNH ₂	55	43	69—71	
"		94	—	—	
CONHCOCH ₃	n-PrNH ₂	5(Y=CONH ₂)	70 (Y=CONH ₂)	115—117(d)*	
"		{ 83 9(Y=CONH ₂)	—	—	
CONH ₂	NH ₃	10	43	96—98(d)	
"	n-PrNH ₂	9	77	*	
"		5	56	153—155(d)	

反応機構の考察

この様な基質間の反応性の相異の説明としては、反応系において imino formとの平衡関係の存在が考えられ、enamide formからは oxazole(19)が、また imino formからは α, α -diamino acid deriv.(25)が生成すると推定される。

第Ⅲ章第2節 5-Mercaptoxazole-4-carbonitrile類の合成

ADANおよび4から容易に誘導される2-acetylamino-3,3-dihydroacrylonitrile(6b, e)および2-acetylamino-3,3-bismethylmercaptoacrylonitrile(16a)から含フッ素アミノ酸の合成を目的としてAg₂O-HF/CH₃CNと100°で反応させたところ、いずれの場合も含フッ素化合物の生成は認められなかった。しかしながら16aから少量の油状物が得られ、スペクトルデータなどから脱メルカプタンを伴う閉環反応により2-methyl-5-methylmercaptooxazole-4-carbonitrile(26)が生成したことを見出した。

5-Mercaptooxazole類はほとんど文献例がなく¹⁰⁾、また脱メルカプタンを伴う oxazole 閉環反応も Cornforth らによる HgCl₂ を用いて低収率ながら oxazole が得られたとの報告が知られているにすぎない¹¹⁾。

そこでさらに反応条件の検討を行なったところ、Ag₂O、Ag₂CO₃、AgOAc などの銀化合物を用い、CH₃CN 中加熱すると、収率はほとんど定量的となった。

Table IX. 2-Substituted-5-(substituted mercapto) oxazole-4-carbonitriles

R ₁	R	Yield (%)	Mp (°C)
CH ₃	H	72	oil
CH ₃	CH ₃	98	oil
CH ₃	C ₂ H ₅	95	oil
CH ₃	n-C ₃ H ₇	97	oil
C ₆ H ₅	n-C ₃ H ₇	95	oil

さらにこの新しい oxazole (26) 閉環反応を検討したところ 2-acylamino-3-substituted-3-(substituted mercapto) acrylonitrile (29) および 2-acylamino-3,3-bis(substituted mercapto) acrylic acid deriv. でも一般的であることがわかり、高収率で oxazole (26) が得られた。代表反応例を、Table X, XI に示す。

Table X. 2-Methyl-5-alkyl(or aryl) oxazole-4-carbonitriles

R ₁	R ₃	Yield (%)	Mp (°C)
C ₆ H ₅	n-C ₄ H ₉	99	oil
CH ₃	C ₆ H ₅	97	48-50

Table XI. 2-Substituted-5-(substituted mercapto) oxazole Derivatives

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 \text{R}_1\text{S} & & \text{NHCOR} \\
 & \diagdown & / \\
 & \text{C}=\text{C} & \\
 & / & \diagdown \\
 \text{R}_1\text{S} & & \text{Y}
 \end{array}
 \xrightarrow[\text{CH}_3\text{CN, reflux}]{4 \text{ Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4}
 \begin{array}{c}
 \text{Y} & \text{N} \\
 \diagdown & / \\
 \text{R}_1\text{S} & \text{C} & \text{O} \\
 & / & \diagdown \\
 & \text{C} & \\
 & \diagup & \diagdown \\
 & \text{N} & \text{R}
 \end{array}
 \end{array}
 \quad (26)$$

R ₁	R	Y	Yield (%)	Mp (°C)
C ₆ H ₅	CH ₃	COOCH ₃	96	oil
CH ₃	CH ₃	CONH ₂	89	238–239(d)
C ₆ H ₅	CH ₃	CONH ₂	90	160–161
C ₆ H ₅	CH ₃	CONHC(CH ₃) ₃	92	72– 73
CH ₃	CH ₃	CONHCOCH ₃	86	105–106
C ₆ H ₅	CH ₃	CONHCOC ₂ H ₅	87	63– 64
CH ₃	C ₂ H ₅	CONHCOC ₂ H ₅	77	57– 59

第三章第3節 Imidazole-5(4)-carbaldehyde類の合成

Hartkeら¹²⁾は Schiff base (9) の類縁化合物から imidazole 化合物の合成を報告しているが、この反応を 9 に適用したところ同様な反応が進行し imidazole (29) が得られた。29 は容易に加水分解され対応するアルデヒド体 (30) を与えた。この反応をさらに検討したところ HCl 以外に HBr, HJ でも進行することがわかった (Table XII)。

Table XII.

Imidazole-5(4)-carbaldehydes (1)

X	R	HY	(29)	(30)	mp (°C)
			Yield (%)	Yield (%)	
Cl	C ₆ H ₅	HCl	97	98	169—171
Br	C ₆ H ₅	HCl	66	97	
Cl	C ₆ H ₅	HBr	89	86	191—192
Cl	C ₆ H ₅	HI	—	29	208—209
Cl	o-Cl-C ₆ H ₄	HCl	90	99	245—249(d)
Cl	p-Br-C ₆ H ₄	HCl	87	96	264—266(d)
Cl	o-NO ₂ -C ₆ H ₄	HCl	90	98	163—164
Cl	o-OH-C ₆ H ₄	HCl	93	99	245—247(d)
Cl	α-Naphthyl	HCl	87	94	204—205
Cl	α-Thienyl	HCl	91	97	211—212

また Schiff base (9) から容易に得られる 15a, b および 15f でも全く同様の反応が進行した。これら imidazole 化合物 (30) は文献未載であり, purine base, その他の縮合ヘテロ環状化合物の出発原料として有用と推定される。

結 論

I. Dihalogenoacetonitrile の C≡N 基にシアン化水素が容易に付加し新規エナミノニトリルである 2-amino-3,3-dihalogeno-acrylonitrile (X=Cl のとき ADAN と略称) が高収率で得られることを見出した。

II. 2-Amino-3,3-dihalogenoacrylonitrile は分子内に 2 個のハロゲン原子, C=C 二重結合, NH₂ 基, C≡N 基を有する多官能性化合物であるところから, その有用性を検討した。

II-1. 2-Amino-3,3-dihalogenoacrylonitrile は 3,3-dihalogenodehydroalanine deriv. とみなすことができ, 2 位 C≡N 基は対応する酸アミド, カルボン酸に容易に加水分解される

こと、および3位のハロゲン原子、C=C二重結合が有機金属試薬を含む種々の求核試薬や還元剤に対して活性であるところからアミノ酸誘導体の合成中間体として有用であることを見出した。

II-2. 2-Amino-3,3-dihaloacetonitrileはC=C二重結合に直結して4個の官能基を有しこれらの間で4通りの組合せで環化反応に参加することが可能であり、たとえばオキサゾール、イミダゾール類がそれぞれ高収率で得られることを見出した。

以上の結果から2-amino-3,3-dihaloacrylonitrileはアミノ酸誘導体およびヘテロ環状化合物の合成中間体として多方面の用途を有する化合物であると考えられる。

引用文献

- 1) a) Y. Wolman, and S. L. Miller, *Tetrahedron Letters*, 1199 (1972).
b) U. E. Diner, and Morsley, *Tetrahedron Letters*, 3145 (1972).
c) K. Ogura, and G. Tsushihashi, *J. Am. Chem. Soc.*, **96**, 1960 (1974).
- 2) H. E. Baumgarten, J. E. Dirks, J. M. Peterson, and R. L. Zey, *J. Org. Chem.*, **31**, 3708 (1966).
- 3) J. Oró, and A. P. Kimball, *Arch. Biochem. Biophys.*, **94** 217 (1961).
- 4) H. Wakamatsu, Y. Yamada, T. Saito, J. Kumashiro, and T. Takenishi, *J. Org. Chem.*, **31**, 2035 (1966).
- 5) a) Röhm and Haas, Ger. Patent, 1053500 (1959) [*C. A.*, **55**, 9286d (1961)].
b) W. J. Middleton, and C. G. Krespan, *J. Org. Chem.*, **33**, 3625 (1968).
c) R. W. Begland, A. Cairncross, D. S. Donald, D. R. Harter, W. A. Sheppard, and O. W. Webster, *J. Am. Chem. Soc.*, **93**, 4953 (1971).
- 6) a) C. E. Colby et al., *Am. Chem. J.*, **13**, 1 (1891).
b) D. A. Klein, *J. Org. Chem.*, **36**, 3050 (1971).
- 7) J. F. Wolfe, and Chung-Li C. Mao, *J. Org. Chem.*, **31**, 3069 (1966).
- 8) a) B. S. Drach, É. P. Sviridov, A. A. Kisilenko, and A. V. Kirsanov, *Zh. Org. Khim.*, **9**, 1818 (1973).
b) B. S. Drach, É. P. Sviridov, and T. Y. Lavrenyuk, *Zh. Org. Khim.*, **10**, 1271 (1974).
- 9) B. S. Drach, and G. N. Mis'kevich, *Zh. Org. Khim.*, **10**, 2315 (1974).
- 10) T. Naito, K. Ueno, and T. Miki, Japan Patent 23088 (1969) [*C. A.*, **71**, 124405(1969)].
- 11) J. W. Cornforth, and H. T. Huang, *J. Chem. Soc.*, 1964 (1964).
- 12) K. Hartke, and B. Seib, *Pharmazie*, **30**, 517 (1970).

研究論文

- 1) β, β -Dichlo- α -aminoacrylonitrile
K. Matsumura, T. Saraie, and N. Hashimoto, *Chem. Comm.*, 705 (1972).
- 2) Studies of Nitriles. VII. Synthesis and Properties of 2-Amino-3,3-dichloroacryloni-

trile(ADAN)

K. Matsumura, T. Saraie, and N. Hashimoto, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo),
"submitted".

- 3) Studies of Nitriles. VIII. Reactions of N-Acyl Derivatives of ADAN(2-Amino-3, 3-dichloroacrylonitrile) with Amines(Part 1). A New Synthesis of 2-Substituted-5-(substituted amino) oxazole-4-carbonitriles and -4-N-acylcarboxamides

K. Matsumura, T. Saraie, and N. Hashimoto, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo),
"submitted".

- 4) Studies of Nitriles. IX. Reactions of 2-Acetylamino-3, 3-dichloroacrylic Amide and -N-acylamide with Aliphatic Amines(Part 2). Syntheses of Some α, α -Diamino Acid Derivatives

K. Matsumura, H. Shimadzu, O. Miyashita, and N. Hashimoto, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), "submitted".

- 5) Studies of Nitriles. X. Synthesis and Reactions of 2-Acylamino-3, 3-bis(substituted mercapto) acrylonitriles and Their Derivatives. A New Synthesis of 2-Substituted-5-(substituted mercapto) oxazole-4-carbonitriles and Their Derivatives

K. Matsumura, O. Miyashita, H. Shimadzu, and N. Hashimoto, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), "submitted".

- 6) Studies of Nitriles. XI. Preparation and Chemistry of Schiff Bases of ADAN, 2-Amino-3, 3-dichloroacrylonitrile. A Highly Effective Conversion into 2-Substituted-4(5)-chloroimidazole-5(4)-carbaldehydes

K. Matsumura, M. Kuritani, H. Shimadzu, and N. Hashimoto, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), "submitted".

参考論文

- 1) Studies of Nitriles. I. Synthesis of Fumalo- and Maleonitrile by a Novel Pyrolytic Coupling Reaction

N. Hashimoto, K. Matsumura, and K. Morita, J. Org. Chem., **34**, 3410 (1969).

- 2) Studies of Nitriles. III. Synthesis of Chlorocyanoacetylene and Cyanoacetylene, and a Novel Malononitrile Synthesis from Chlorocyanoacetylene

N. Hashimoto, K. Matsumura, T. Saraie, Y. Kawano, and K. Morita, J. Org. Chem., **35**, 675 (1970).

- 3) Studies of Nitriles. IV. Synthesis of Isoxazoles and Pyrazoles from Three Carbon Nitriles

K. Matsumura, T. Saraie, Y. Kawano, N. Hashimoto, and K. Morita, J. Takeda Res. Lab., **30**, 475 (1971).

4) "Review" Organic Syntheses with Acetylenic Compounds

K. Matsumura, and K. Morita, J. Takeda Res. Lab., **30**, 154 (1971).

5) Studies of Nitriles. V. Reactivity of Cyanoethynylmagnesium Bromide

K. Matsumura, T. Saraie, and N. Hashimoto, J. Takeda Res. Lab., **30**, 682 (1971).

論文の審査結果の要旨

1. 2-amino-3,3-dichloroacrylonitrile(ADAN) の新しい合成法を開発し, その誘導体の合成と反応を検討し合成中間体としての有用性を確めた。
2. ADANが金属試薬を含む求核試薬や還元剤に対し活性であることを見出し, アミノ酸合成の中間体として有用であることを明らかにした。
3. ADANより高収率でオキサゾールおよびイミダゾール等の複素環状化合物に誘導し, これらの新しい合成法を確立した。
4. 上記の各反応の反応機構を考察した。

以上の知見は薬学博士として十分価値あるものと認める。