

Title	術中, 術後における性腺刺激ホルモン, テストステロンの動態 : 特に変動のメカニズムについて
Author(s)	中島, 篤巳
Citation	大阪大学, 1979, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/32338
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、〈a href="https://www.library.osaka- u.ac.jp/thesis/#closed">大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University

-[38]

氏名·(本籍) 草 島 麓 色

学位の種類 医 学 博 士

学位記番号 第 4465 号

学位授与の日付 昭和54年1月31日

学位授与の要件 学位規則第5条第2項該当

学位論文題目 術中,術後における性腺刺激ホルモン,テストステロンの動態

―特に変動のメカニズムについて ―

論文審査委員 (主査) 教授 松本 圭史

> (副查) 教授 倉智 敬一 教授川島 康生

論文内容の要旨

〔目 的

現在までの研究で、全身麻酔下手術時には、性腺刺激ホルモン(LH)ーテストステロン系の動態について次のように報告して来た。それは、手術の種類とは関係なく、LHは術中に上昇し、術後は減少し、第2病日に最低値を示し、再び上昇を始めて第7病日に有意に高値をとるが、テストステロン(以下①と略す)は、LHの上昇にもかかわらず、術中より減少し、第2病日に最低値をとり、第7病日にも、まだ、有意に低値を示すということである。以上の結果は、手術ストレス時の①の減少は、LHの減少による二次的なものではなく、睾丸における①生合成能の低下によることを示唆する。本稿では、この①生合成低下のメカニズムを、以下のステップにしたがって解明する。

ステップ①:手術のストレスを、全身麻酔と執刀とに分離して、その影響を検討する。

ステップ②: ①減少は、LHに対する睾丸の感受性の低下によるものかどうかを検討する。

ステップ③:①の減少は、①生合成系路のどの部位でブロックされているかを検討する。

〔方法ならびに成績〕

対象は、胆石、胃潰瘍、胃癌、肺結核、肺癌の成人男子70名である。麻酔は、thiopental一笑気、酸素、ハロセン、サクシニル・コリン・クロライドで、手術は、胆摘、胃切、肺切術を午前9時に開始した。

LHはRadioimmunoassayで、①はCompetitive protein binding methodで、尿中ステロイドは、関一松本の方法によって測定した。

§ステップ①……第 I 群(全麻下手術群):麻酔導入直前,後30分, 1 時間(執刀後30分), 2 ~ 3

時間(手術終了時),第2病日,第7病日に採血した

LHは、30分より有意に上昇し、1時間でピークを示し、以後下降し、手術終了時には術前値に、第2病日には最低値をとった後、再び上昇し、第7病日には高値を示した。これに対して①は、執刀後より減少の一途をたどり、第2病日に最低値をとった後、第7病日にもまだ有意に低値を示した。

第Ⅱ群(全麻下気管支鏡群):採血は第Ⅰ群と同じ。LHの変動は第Ⅰ群に類似していたが、①は 検査中は変動なく、第2病日に減少した。この群は、第Ⅲ群の成績より、気管支鏡はLH、①変動の ストレスとなっていないことから、全麻のみの影響が現われていると解される。

第Ⅲ群(局麻下気管支鏡群):局麻剤は塩酸リドカインを使用し、採血はⅠ群と同じ。LH、①に変動はみられなかった。

§ステップ②……A群(術3カ月前の10例)とB群(術第7病日の20例)とに、HCG2000IUを筋注し、前、3時間、6時間と採血し①を測定した。A群は6時間後に①の有意な上昇をみた。B群はA群に比し、絶対量の増加は小であったが、前値が低いためにその増加率はA群と同じであり、HCGに対して反応を示した。

〔総 括〕

LHは全身麻酔の影響で分泌が一時的に上昇するが、①は執刀のストレスによって睾丸での生合成が抑制される。術中、術直後のLHと①とは各々独立した要因で変動する(ステップ①)。睾丸における①生合成の低下は、LHに対する睾丸の感受性の低下によるものではない(ステップ②)。 そして手術時の①の生合成低下は、 17α -OH·progesterone →Testosterone の所で抑制されている可能性を示唆する成績を得た。

論文の審査結果の要旨

大手術ストレス時には末梢血中 Testosterone(以下 T)が約3週間有意に減少していることが我我の研究で明らかにされた。著者は、その T値の減少機序を明らかにした。①血中 T値は、術中・術後を通じて低値に保たれるが、 L H は術中及び第7病日に高値を示す。これは、 T値減少は、性腺刺激ホルモン分泌減少による二次的変化ではない。② T 分泌減少は、性腺刺激ホルモンに対する間細胞の感受性の低下によるものではない。③ T 分泌の減少は、 C_{21} - Steroid の側鎖断裂能の低下によるも

のと考えられる。④さらに著者は術中のLHの上昇は全身麻酔の影響により、T値減少は主として執 刀のストレスの影響によることを明らかにした。

以上のように著者が、手術ストレス時の睾丸テストステロン分泌能低下と性腺刺激ホルモン上昇と の機序を明らかにしたことは意義あるものと考えられる。