



Title	超低体温体外循環の適正灌流条件に関する研究：血液ガス動態，代謝性変動からみた適正灌流量に関する実験的検討
Author(s)	奥田，彰洋
Citation	大阪大学，1983，博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/33606
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、 ＜a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed">https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed >大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏 名・(本籍)	おく 奥	だ 田	あき 彰	ひろ 洋
学 位 の 種 類	医	学	博	士
学 位 記 番 号	第	5	9	20 号
学位授与の日付	昭和 58 年 3 月 3 日			
学位授与の要件	学位規則第 5 条第 2 項該当			
学 位 論 文 題 目	超低体温体外循環の適正灌流条件に関する研究 —血液ガス動態, 代謝性変動からみた適正灌流量に関する 実験的検討—			
論 文 審 査 委 員	(主査)			
	教 授	川 島	康 生	
	(副査)			
	教 授	中 馬	一 郎	教 授 吉 矢 生 人

論 文 内 容 の 要 旨

〔目 的〕

低体温法は開心術の有用な補助手段であり、現在は単純超低体温法、あるいは体外循環併用超低体温法が広く行なわれている。

完全循環停止を行なうこれらの方法では、その許容時間に制約があり、また脳障害の発生はこれらの方法の重大な合併症である。そこでこれらの欠点を取り除いた開心術補助手段として超低体温体外循環 (DHCPB) が用いられるようになってきた。しかしその適正灌流条件はいまだ明らかではない。

DHCPBでは酸素消費量 ($\dot{V}O_2$) の低下にともない灌流量の減量が可能と考えられる。既に著者らは 20°C DHCPBにおける最大酸素摂取を充たす灌流量は 60ml/kg/min 以上であり、 30ml/kg/min 以下の灌流量においては $\dot{V}O_2$ は有意に低下している事を報告した。即ち、このような灌流量で DHCPBを行なうと、生体では hypoxia が進行し酸素負債が発生する可能性がある。

本研究においては実験的に 4 時間にわたる 20°C DHCPB を種々の灌流量で行ない、その間、及び復温過程の血液ガス動態、代謝性変動を検討した。また、 20°C DHCPB の適正灌流量を求める事を目的とした。

〔方法ならびに成績〕

雑種成犬 30 頭を用いて pentobarbital 30mg/kg を静注し麻酔導入。その後氷冷による表面冷却を 30°C 迄行ない、更に灌流量 90ml/kg/min で 20°C 迄中心冷却を行なった。体内各部の温度が 20°C に平衡した後、灌流量を減量して 4 時間の DHCPB を行ない、その後再び灌流量 90ml/kg/min で常温迄中心加温を行なった。

20℃ DHCPB中の灌流量により次の3群に分け実験を行なった。

I群：60ml/kg/min (10頭)，II群：30ml/kg/min (9頭)，III群：15ml/kg/min (11頭)。

1. 動脈血酸素飽和度 S_{aO_2} はDHCPB中99%以上の値が維持された。 S_{vO_2} はI群では96.7～96.9，II群では88.0～89.9，III群では74.1～77.2%であった。復温開始後， S_{vO_2} は一旦上昇するが体温の上昇にともない次第に低下した。
2. 全身酸素消費量 $\dot{V}_{O_2}$ はDHCPB中I群では1.04～1.12，II群では0.86～0.88，III群では0.70～0.72 ml/kg/minとほぼ一定の値が維持された。また各群間の $\dot{V}_{O_2}$ には有意な差が認められた ($p<0.001$)。復温開始後早期ではII，III群の $\dot{V}_{O_2}$ はI群のそれに比し有意に高値を示し，更に体温の上昇にもかかわらず一旦 $\dot{V}_{O_2}$ は有意に減少した。復温開始後20分以降は各群の $\dot{V}_{O_2}$ は増加が持続したが，有意差は認められなかった。
3. 動脈血炭酸ガス分圧 P_{aCO_2} はDHCPB中各群ともほぼ40mmHg 台の値が維持されていた。復温開始後早期にはII，III群の P_{aCO_2} はI群のそれに比し有意に高値を示した ($p<0.01$ ， $p<0.001$)。
4. 全身炭酸ガス排泄量 $\dot{V}_{CO_2}$ はDHCPB中各群間に有意差を認めなかったが，復温開始後早期にはII，III群の $\dot{V}_{CO_2}$ はI群のそれに比し有意に高値を示した。復温開始後20分以降は，各群の $\dot{V}_{CO_2}$ には有意差は認められなかった。
5. base excess (BE) はDHCPB中各群とも有意に低下するが ($p<0.001$)，II，III群のBEはDHCPB20分以降は，I群のそれに比し有意に低値を示した ($p<0.05$ ， $p<0.01$)。復温開始後30分では各群ともBEの改善が認められたが，III群のそれは有意な改善ではなかった。
6. 乳酸は中心冷却時，各群とも急上昇した。また，DHCPB中灌流量の小さな群ほど増加傾向は大きく，復温開始後もその差は持続した。
7. excess lactate (XL) は乳酸同様中心冷却時最大の増加を示した。

DHCPB中I群のXLは有意に減少を示したが ($p<0.01$)，II，III群のそれは殆んど変動が認められなかった。復温開始後各群ともXLの改善が認められた。I，II群のそれは有意な改善であったが，III群のXLはI群のそれに比してなお高値を示した ($p<0.01$)。

〔総括〕

- 1) DHCPB中の $\dot{V}_{O_2}$ には各群間に有意な差が認められた ($p<0.001$)。
- 2) II，III群においては復温開始後早期にDHCPB中の $\dot{V}_{O_2}$ の差に対応する酸素負債の存在を示唆する $\dot{V}_{O_2}$ の有意な変動が認められた。この変動はIII群においてより著明であった。
- 3) DHCPB中の $\dot{V}_{CO_2}$ には各群間に有意差を認めなかったが，復温開始後早期にはII，III群の $\dot{V}_{CO_2}$ はI群の $\dot{V}_{CO_2}$ に比し有意に高値を示していた ($p<0.001$ ， $p<0.05$)。
- 4) I群においてはDHCPB中，pH，BE等酸塩基平衡，乳酸，XL等，代謝面の変動は他群に比し軽度で，復温時にはより良好な改善傾向が認められた。
- 5) これら血液ガス動態，代謝性変動からI群ではDHCPB中，充分好氣的代謝が行なわれており，測定された $\dot{V}_{O_2}$ は生体の酸素需要と一致していると考えられた。
- 6) 以上の成績より，20℃ DHCPBを行なった3群の灌流量のうち，血液ガス動態，代謝面の変動が

らみた適正灌流量は60ml/kg/minと考えられた。

論文の審査結果の要旨

本論文は実験犬を用いて20℃超低体温体外循環を種々の灌流量で行ない、体外循環中、及び復温過程における血液ガス動態、代謝性変動と灌流量との関連を実験的に検討し、超低体温体外循環を安全に実施するための適正灌流量を明らかにしたものである。この成果は、最近広く行なわれるようになった超低体温体外循環に応用され、その安全性の向上に寄与するものと考えられる。