



Title	Synergy of IL-12 and IL-18 for IFN- γ Gene Expression : IL-12-Induced STAT4 Contributes to IFN- γ Promoter Activation by Up-Regulating the Binding Activity of IL-18-Induced Activator Protein 1
Author(s)	中平, 雅清
Citation	大阪大学, 2002, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/43795
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏名	なかひらまさきよ 中 平 雅 清
博士の専攻分野の名称	博士(医学)
学位記番号	第 16860 号
学位授与年月日	平成14年3月25日
学位授与の要件	学位規則第4条第1項該当 医学系研究科分子病態医学専攻
学位論文名	Synergy of IL-12 and IL-18 for IFN- γ Gene Expression: IL-12-Induced STAT4 Contributes to IFN- γ Promoter Activation by Up-Regulating the Binding Activity of IL-18-Induced Activator Protein 1 (IFN- γ 遺伝子発現に対するIL-12とIL-18の相乗効果: IL-12によって活性化されたSTAT4は、IL-18によって誘導されたAP-1のDNAへの結合活性を上昇させることによってIFN- γ プロモーターの活性化に寄与する)
論文審査委員	(主査) 教授 濱岡 利之
	(副査) 教授 平野 俊夫 教授 宮坂 昌之

論文内容の要旨

【目的】

IL-12とIL-18は、IFN- γ 産生に対して相乗的に作用することが知られている。その相乗効果機構の1つとして、IL-12によるIL-18レセプター(IL-18R)の発現誘導がある。又、両サイトカインがIFN- γ 産生に対して異なるシグナル経路を有する事から、レセプターアクティベーターのシグナルレベルにおいても相乗効果機構の存在が指摘されてきた。実際、IL-12はSTAT4を、IL-18はNF- κ BとAP-1を活性化し、ヒトIFN- γ 遺伝子プロモーターへのこれらの転写因子の結合が報告されている。しかし、マウスでは明らかなSTAT4結合配列は確認されておらず、STAT4がどのようにしてIFN- γ プロモーターの活性化を行うのか不明であった。そこで本研究では、IL-12、IL-18に反応できるマウスTh1クローン2D6を用いて、IFN- γ 遺伝子活性化に対するIL-12とIL-18の相乗効果機構をSTAT4の役割に焦点を当てて解析した。

【方法】

IFN- γ 産生とそのmRNAの定量にはELISAとRNase Protection Assayを用いた。各転写因子のDNAへの結合はEMSA、Oligo DNA Precipitationにより検討した。遺伝子活性化能については、マウスIFN- γ プロモーターにルシフェラーゼ遺伝子を連結したレポーター(standard)と、同プロモーター上のSTAT結合配列欠失レポーター(S-1)とAP-1結合配列欠失レポーター(S-2)を用いて解析した。

【成績】

(1)IL-12-unstarved 2D6はIL-18刺激だけでもIL-12/IL-18共刺激に匹敵する高いIFN- γ 産生を示したが、IL-12-starved 2D6ではIL-18Rの発現レベルに差は無いにも拘らず、共刺激でしか高いIFN- γ 産生を示さなかった。又、IFN- γ mRNAの発現、ルシフェラーゼアッセイ(standardレポーター)、AP-1のDNAへの結合においても同様の傾向が見られた。従って、両サイトカインは転写レベルでもIFN- γ 産生に対して相乗的に作用すると考えられた。(2)STAT4は、マウスIFN- γ プロモーター上のSTAT common binding motifにほとんど結合しなかった。又、S-1レポーターでは共刺激で相乗的なプロモーター活性化が見られたのに対し、S-2レポーターでは見られなかった。つまり、相乗的な転写の活性化には、IL-18によって誘導されたAP-1が結合するsiteが必要であり、STAT4は直接ア

ロモーターへの結合をせずに転写の活性化を増強しうると考えられた。(3)そこで AP-1 の主な構成成分である c-Jun と STAT4 の会合を見たところ、その会合が IL-12 刺激依存性に観察された。又、c-Jun のセリンリン酸化は、IL-18 刺激によって見られ、これは JNK の活性化を反映していた。(4)次に oligo DNA Precipitation により AP-1 site への各転写因子の結合を見たところ、IL-12/IL-18 の群で c-Jun 及び STAT4 の結合が最も多く見られた。又、過剰量の free の AP-1 site DNA の競合により、c-Jun のみならず STAT4 の結合も見られなくなった。このことから、STAT4 は c-Jun と会合することにより間接的に DNA へ結合すると考えられた。(5)c-Jun-STAT4複合体の量は IL-12、IL-12/IL-18 の両群で大きな差は無かったにも拘らず、AP-1 site に結合した c-Jun の量は共刺激の方がはるかに多く見られた。これらのことから、共刺激によって起こる c-Jun の DNA への結合活性の増大には、c-Jun-STAT4複合体の形成の他に c-Jun のセリンリン酸化が必要であると考えられた。実際、核内の c-Jun のセリンリン酸化の割合は非常に低かったにも拘らず、DNA へ結合した c-Jun のセリンリン酸化の割合は高かった。(6)Primary Activated T cell を用いた実験でも、2D6 と同様に共刺激で最も強い AP-1 の誘導が見られたが、NF- κ B の活性化については IL-18、IL-12/IL-18 の両群で差は無かった。このことより、IL-12 からのシグナルは NF- κ B ではなく、選択的に AP-1 の結合活性を上昇させると考えられた。

【総括】

IL-12 と IL-18 の共刺激によって各々 STAT4 のチロシンリン酸化とセリンリン酸化 c-Jun を含む AP-1 が誘導される。これらは、核内で複合体を形成し、AP-1-binding site に対して STAT4 free AP-1 に比べて強い結合活性を示す。この結果として、IL-12 と IL-18 による相乗的な IFN- γ 遺伝子の転写の活性化が起こると考えられた。

論文審査の結果の要旨

IL-12 と IL-18 は、共に IFN- γ 産生を誘導するサイトカインであり、両サイトカインは IFN- γ 産生に対して相乗的に作用する事が知られている。その相乗効果機構の 1 つとして、すでに IL-12 による functional な IL-18 レセプターの発現誘導が報告されている。又、両サイトカインが異なる signaling pathway を有する事から、シグナルレベルにおいても、相乗効果機構の存在がヒト IFN- γ 遺伝子プロモーターにおいて指摘してきた。しかし、マウス IFN- γ 遺伝子プロモーター上には明らかな STAT4 binding site が確認されておらず、マウスにおいてどのように STAT4 が IFN- γ プロモーターを活性化するのか不明であった。

本研究は、この両サイトカインによる相乗的な IFN- γ 産生機構について、主に STAT4 の役割に焦点を当てて進められた。実験の結果、IL-12/IL-18 共刺激により、IL-12 によってチロシンリン酸化された STAT4 と、IL-18 によってセリンリン酸化された AP-1 の構成成分である c-Jun との会合がおこることが示された。この形成された複合体は IFN- γ プロモーター上の AP-1 site に対して非常に高い binding activity を示し、その結果相乗的なプロモーターの活性化が得られると考えられた。そしてこの時活性化された STAT4 は、プロモーター上のほぼ同一領域に存在する STAT common binding motif への結合を必要とせずに、相乗的なプロモーター活性化を誘導したのである。このことは、STAT が DNA への直接の結合をせずに、協調した転写制御を行うという最初の報告であり、この分野における非常に重要な概念の提示として興味深い。よって、この研究論文は、博士（医学）の学位の授与に値するものと考えられる。