



Title	The Mcm2p-binding, but not Mcm2p-phosphorylation, is important for the function of Cdc7/Dbf4 protein kinase during initiation of chromosomal DNA replication in <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
Author(s)	中井, 渉
Citation	大阪大学, 2003, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/44085
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、 https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed 大阪大学の博士論文について ご参照ください 。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏 名	なか い わたる 中 井 渉
博士の専攻分野の名称	博 士 (理 学)
学 位 記 番 号	第 1 7 5 3 9 号
学 位 授 与 年 月 日	平成 15 年 3 月 25 日
学 位 授 与 の 要 件	学位規則第 4 条第 1 項該当 理学研究科生物学専攻
学 位 論 文 名	The Mcm2p-binding, but not Mcm2p-phosphorylation, is important for the function of Cdc7/Dbf4 protein kinase during initiation of chromosomal DNA replication in <i>Saccharomyces cerevisiae</i> . (出芽酵母染色体 DNA 複製開始における Cdc7/Dbf4 protein kinase の機能は Mcm2p のリン酸化ではなく Mcm2p との結合である)
論 文 審 査 委 員	(主査) 教 授 杉野 明雄 (副査) 教 授 品川日出夫 教 授 野島 博

論 文 内 容 の 要 旨

真核生物の染色体 DNA 複製の開始は複数の蛋白質によって厳密に制御されており、細胞周期を通じて S 期にのみ 1 回だけ行われ完全に終了することが必要である。これまでに真核生物の DNA 複製開始に関与する因子として ORC、Cdc6、MCM、Cdc45 等が同定されてきた。この中で MCM 複合体は複製ライセンス因子として機能していると考えられている。出芽酵母 *CDC7* は protein kinase をコードし、G1/S 期に発現される Dbf4p と複合体を形成することにより、protein kinase 活性が現れる。この Cdc7/Dbf4 複合体は染色体 DNA 複製開始を制御していることが知られており、Cdc7/Dbf4 複合体による複製開始前複合体 (pre-replicative complex, pre-RC) 中の MCM 複合体のリン酸化が S 期の開始を引き起こすと考えられている。

これまでに我々は、バキュロウイルス系を用いて Sf21 細胞内で発現させた Cdc7/Dbf4 複合体を精製し、酵母から精製した GST-Mcm2p を *in vitro* で効率良くリン酸化することを明らかにしてきた。しかし、*in vivo* においても Cdc7/Dbf4 複合体が Mcm2p を基質としているのか、またそのリン酸化が複製の開始をどのように制御しているのかなどまだ不明な点が多い。そこで本研究では、Cdc7/Dbf4 複合体による Mcm2p のリン酸化の役割を明らかにしたいと考え、Mcm2p のリン酸化部位の同定およびその解析を行った。

酵母から精製した GST-Mcm2p は Cdc7/Dbf4 複合体により効率良くリン酸化されるが、Alkaline Phosphatase により脱リン酸化処理した GST-Mcm2p はほとんどリン酸化されなかった。これは、未同定の protein kinase により *in vivo* であらかじめリン酸化された蛋白のみが基質になることを示している。

そこで、複製開始における Mcm2p のリン酸化の役割を解明するために、MALDI-TOF を用いてリン酸化部位の同定を行った。その結果、酵母菌体内において GST-Mcm2p はすでに 8 箇所リン酸化されていることが分かった。リン酸化部位だと推測されるセリンは全てアラニンもしくはグルタミン酸に置換し、変異 GST-Mcm2p および変異 *mcm2* 株を作成した。この変異 GST-Mcm2p は *in vitro* において Cdc7/Dbf4 複合体により全くリン酸化されず、また、脱リン酸化処理した変異株抽出液中の Mcm2p は SDS-PAGE において移動度の違いは見られなかった。従って、本研究でアラニンに置換した部位は同時に Cdc7/Dbf4 protein kinase のリン酸化部位であると考えられる。しかし、変異

*mcm2*株は成育可能であり、FACS 解析においても S 期の進入と進行は正常であった。

これまで、two-hybrid 解析によって Mcm2p と Dbf4p とは相互作用するが、変異 Mcm2-1p では Dbf4p との相互作用が弱くなり、*mcm2-1* 変異と *dbf4-1* 変異の二重変異株は致死となることが報告されている。今回、この変異 Mcm2p と Dbf4p との相互作用を調べたところ、その相互作用は弱く、さらに、温度感受性変異 Dbf4p との間には相互作用が見られなかった。この実験結果と一致して、この二重変異株も致死になった。これらの結果から、細胞内において、Cdc7/Dbf4 複合体による Mcm2p のリン酸化は成育に必須では無いが、リン酸化された Mcm2p を含む Mcm2-7 複合体に少なくとも Dbf4p が結合し、その複合体の構造変化をもたらすことが染色体 DNA 複製開始に必須であると結論される。

論文審査の結果の要旨

本研究では、染色体複製開始に必要な Cdc7/Dbf4 複合体による Mcm2p のリン酸化の複製開始反応における役割を解明する為に、MALDI-TOF を用いて Mcm2p のリン酸化部位の同定を行った。その結果、酵母菌体内において GST-Mcm2p はすでに 8 箇所リン酸化されていることが分かった。リン酸化部位の Ser、Thr を全て Ala に置換し、変異 GST-Mcm2p および変異 *mcm2* 株を作成した。この変異 GST-Mcm2p は *in vitro* において Cdc7/Dbf4 複合体により全くリン酸化されず、また、脱リン酸化処理した変異株抽出液中の Mcm2p は SDS-PAGE において移動度の違いは見られなかった。しかし、変異 *mcm2* 株は成育可能であり、S 期の進入と進行は正常であった。一方、two-hybrid 解析、及び *in vitro* 結合実験によって、Cdc7p/Dbf4p は野生型 Mcm2p のみならず、変異 Mcm2-1p とも相互作用していることを明らかにした。しかし、この相互作用は温度感受性 Dbf4p と変異 *mcm2p* ではなくなっていることから、細胞内において、Cdc7/Dbf4 複合体による Mcm2p のリン酸化は成育に必須では無く、Cdc7p/Dbf4p が Mcm2-7 複合体に結合し、その複合体の構造変化をもたらすことが染色体 DNA 複製開始に必須であると結論された。これらの研究結果は真核生物染色体複製開始機構の理解に多大の貢献をするもので、博士（理学）の学位論文として十分価値があると認める。