



Title	Roles of C-terminal Src Kinase in Epithelial Construction and Maintenance
Author(s)	八木, 玲子
Citation	大阪大学, 2008, 博士論文
Version Type	
URL	<a href="https://hdl.handle.net/11094/49289">https://hdl.handle.net/11094/49289</a>
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、<a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed">大阪大学の博士論文について</a>をご参照ください。

*The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA*

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏 名 や 八 木 れい こ

博士の専攻分野の名称 博 士 (生命機能学)

学 位 記 番 号 第 2 2 1 8 0 号

学 位 授 与 年 月 日 平成 20 年 3 月 25 日

学 位 授 与 の 要 件 学位規則第4条第1項該当

生命機能研究科生命機能専攻

学 位 論 文 名 Roles of C-terminal Src Kinase in Epithelial Construction and Maintenance

(表皮組織構築における SFK/Csk の生理的機能解析)

論 文 審 査 委 員 (主査)

教 授 仲野 徹

(副査)

教 授 目加田英輔 教 授 月田早智子 准教授 名田 茂之

## 論 文 内 容 の 要 旨

Carboxy-terminal Src kinase (Csk) is a negative regulator of Src family tyrosine kinases (SFks) which play pivotal roles in controlling cell adhesion, migration and cancer progression. To elucidate the *in vivo* role of Csk in epithelial tissues, I conditionally inactivated Csk in squamous epithelia using the keratin-5 promoter/Cre-loxP system in mice. The mutant mice developed apparent defects in the skin, esophagus and forestomach, with concomitant chronic inflammation and epithelial hyperplasia. Analysis of primary keratinocytes showed that the expression of mesenchymal marker proteins, matrix metalloproteinases (MMPs) and the proinflammatory cytokine TNF- $\alpha$  were elevated in the mutant cell. These aberrant gene expressions could be suppressed by anti-inflammatory reagent FK506 through inactivation of Calcineurin and NF $\kappa$ B pathway. Furthermore, treatment with the anti-inflammatory reagent FK506 rescued hyperplasia in the mutant epidermis, indicating that epidermal hyperplasia was associated with inflammation. Analysis of the susceptibility of Csk hetero-mutant mice to two-stage skin carcinogenesis revealed that papillomas arose earlier and in greater numbers compared with those of wild-type littermates did. It suggested that SFK activity was strictly regulated by Csk and deregulation of them promoted papilloma formation. Histology of the mutant epidermis revealed delayed differentiation and impaired cell-cell adhesion in the basal cell layers. Primary cultured keratinocytes also showed defects in formation of cell-cell adhesion and cytoskeletal remodeling. Defective cell-cell adhesion observed in mutant keratinocytes was found to be accompanied with irregular cytoskeletal remodeling by altered Rac1/RhoA activity. In addition, mitotic defects were caused by downregulation of RhoA activity in the mutant keratinocytes. Fluorescent resonance energy transfer analysis also showed that Rac1/RhoA was activated at multiple places of cell periphery in the mutant keratinocytes, which might account for the loss of cell polarity by Csk inactivation. These observations suggest that the SFK/Csk circuit plays crucial roles in development and maintenance of epithelia by controlling cellular cytoskeletal organization, cell polarity as well as phenotypic conversion linked to inflammatory events.

## 論文審査の結果の要旨

申請者は、非受容体型チロシンキナーゼファミリーSFKの抑制因子Cskを表皮組織特異的にノックアウトしたマウスを作製し、その表現型発現機構の解析を行なった。その結果、Cskノックアウト表皮角化細胞から分泌されるTNF- $\alpha$ やMMP9によって誘導される表皮下の炎症によって表皮の過形成が生じること、さらには活性化されたRac1によって細胞骨格形成のバランスが変化し、細胞間接着形成不全を引き起こすことを明らかにした。そして、多段階的発がんモデル実験によって、SFK/Cskのシグナルががんの形成促進に寄与し得ることを示した。

以上、申請者による研究は、未解決とされるSFK/Cskシグナルとがんとの関わりの理解につながるものであり、学位の授与に値すると思われる。