Title	La structure du groupe des similitudes directes $G\tilde{O}^+_6(Q)$ sur un corps de caractéristique 2
Author(s)	Ohara, Akiko
Citation	Osaka Mathematical Journal. 1958, 10(2), p. 239-257
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/7127
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

**La Structure du Groupe des Similitudes Directes $GO_n^+(\mathbb{Q})$
 sur un Corps de Caractéristique 2.**

Par Akiko OHARA

1. Soient K un corps commutatif de caractéristique 2 et E un espace vectoriel de dimension n sur K . On appelle forme quadratique une application Q de E dans K qui satisfait à une identité de la forme

$$(1) \quad Q(\lambda x + \mu y) = \lambda^2 Q(x) + \mu^2 Q(y) + \lambda \mu f(x, y),$$

où f est une forme bilinéaire sur $E \times E$ et où x, y sont des vecteurs de E et λ, μ des éléments de K . On peut alors définir les notions d'une forme quadratique "non dégénérée" ou "défective", d'un vecteur "singulier", de "l'indice" de Q et d'un sous-espace "isotrope", de même que dans le cas de caractéristique $p \neq 2$, [1]. Nous supposons toujours que la dimension de E soit paire $n = 2m$ et que Q soit une forme quadratique non dégénérée d'indice $\nu \leq m$. Comme f est une forme alternée, il existe une base symplectique pour f , $(e_i)_{1 \leq i \leq 2m}$ dans E . Alors, on peut écrire $Q(x)$, $x = \sum_{i=1}^{2m} e_i \xi_i$, sous la forme¹⁾

$$(2) \quad Q(x) = \sum_{i=1}^{m-\nu} \{Q(e_i)\xi_i^2 + \xi_i \xi_{m+i} + Q(e_{m+i})\xi_{m+i}^2\} + \sum_{j=m-\nu+1}^m \xi_j \xi_{m+j}.$$

Une collinéation semi-linéaire u , relative à un automorphisme σ de K , est appelée une semi-similitude si on a

$$(3) \quad Q(u(x)) = r_u(Q(x))^\sigma \quad (x \in E),$$

r_u étant une constante non nulle, appelée multiplicateur de u . Les semi-similitudes forment un groupe. Désignons ce groupe par $\Gamma O_n(Q)$. Les transformations de $\Gamma O_n(Q)$ associées à l'automorphisme identique de K forment un sous-groupe distingué $GO_n(Q)$ de $\Gamma O_n(Q)$, appelé *le groupe des similitudes*. Celles de multiplicateur 1 forment *le groupe orthogonal*

1) D'après la définition, on obtient d'abord par récurrence sur m l'expression de $Q(x)$ telle que $Q(x) = \sum_{i=1}^m \{Q(e_i)\xi_i^2 + \xi_i \xi_{m+i} + Q(e_{m+i})\xi_{m+i}^2\}$. Ensuite, pour tout vecteur singulier a et tout plan non isotrope P contenant a , il existe dans P un vecteur singulier et un seul $b \neq a$, tel que $f(a, b) = 1$, (cf. [1], p. 20). Donc, dans le cas de l'indice $\nu \geq 1$, on peut choisir une base (e_i) de sorte que les 2ν termes $Q(e_l), Q(e_{m+l})$ où $m - \nu + 1 \leq l \leq m$ s'annulent.

$O_n(Q)$. Soit $A(Q) = \sum_{j=1}^m Q(e_j)Q(e_{m+j})$ le pseudo-discriminant de Q , ([1] p. 63), relative à la base symplectique $(e_i)_{1 \leq i \leq 2m}$, et soit v une similitude symplectique, c'est-à-dire une transformation telle que $f(v(x), v(y)) = r_\nu f(x, y)$. Si l'on écrit v sous la forme de matrice $\begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix}$, $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij})$, $D = (d_{ij})$, $1 \leq i, j \leq m$, et si l'on pose $Q_1(x) = Q(v(x))$, le pseudo-discriminant $A(Q_1)$ de Q_1 est donné par

$$(4) \quad A(Q_1) = r_\nu^2 A(Q) + D(v)^2 + r_\nu D(v),$$

où $D(v) = \sum_{i,j=1}^m \{Q(e_j)a_{ij}c_{ij} + Q(e_{m+j})b_{ij}d_{ij} + b_{ij}c_{ij}\}^{2\nu}$. Si v appartient à $GO_n(Q)$, on a $A(Q_1) = r_\nu^2 A(Q)$ et $D(v)^2 + r_\nu D(v) = 0$. On a donc $D(v) = 0$ ou $D(v) = r_\nu$. Le sous-groupe de $GO_n(Q)$ formé des transformations v telles que $D(v) = 0$ est appelé *le groupe des similitudes directes*. Désignons ce groupe par $GO_n^+(Q)$.

Dans le cas de caractéristique $p \neq 2$, B. L. van der Waerden [2] et J. Dieudonné [3] ont déterminé les structures des groupes $GO_n^+(Q)$ pour $n = 4, 6$ et celles des groupes $O_n^+(Q)$ pour $n = 3, 5$. Pour $n = 6$ et l'indice $\nu = 3, 2$, on peut voir que ces résultats sont indépendants de la caractéristique du corps de base. Il nous reste à examiner la structure du groupe $GO_6^+(Q)$ pour les indices 1 et 0, le corps de base étant de caractéristique 2.

2. Nous allons d'abord démontrer trois séries de lemmes préliminaires concernant les corps (1-6), les formes quadratiques (7-10) et la commutativité des collinéations avec des collinéations ou des corrélations (11-13). Dans tout ce travail, on suppose que le corps de base K soit de caractéristique 2.

Lemme 1. *Si l'on a une extension quadratique K_1 sur K obtenue par adjonction d'une racine ρ de l'équation $X^2 + X + a = 0$, $a \in K$, et si l'on a $\xi^2 + \xi = b$, $\xi \in K_1$, $\xi \notin K$, $b \in K$, il existe alors un élément α dans K tel que $a + b = \alpha^2 + \alpha$.*

En effet, en posant $\xi = c\rho + d$, $c, d \in K$, on a $\xi^2 + \xi = c^2\rho^2 + d^2 + c\rho + d = c^2(\rho^2 + \rho) + (c^2 + c)\rho + d^2 + d = c^2a + (c^2 + c)\rho + d^2 + d$. Comme $(c^2 + c)\rho$ doit être dans K , on a $c^2 + c = 0$, donc $c = 0$ ou $c = 1$. Comme $c \neq 0$, on a $c = 1$, donc $a + b = d^2 + d$.

Soient K_1, K_2 les extensions quadratiques de K obtenues par adjonc-

2) Pour obtenir $A(Q_1)$ il suffit de calculer $\sum_{j=1}^m Q(v(e_j))Q(v(e_{m+j})) = \sum_{j=1}^m Q\{\sum_{i=1}^m (a_{ij}e_i + b_{ij}e_{m+i})\} \times Q\{\sum_{i=1}^m (c_{ij}e_i + d_{ij}e_{m+i})\}$, en utilisant la relation $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & E \\ E & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & r_\nu E \\ r_\nu E & 0 \end{pmatrix}$.

tion des racines ρ_1, ρ_2 des équations $X^2 + X + c_1 = 0, X^2 + X + c_2 = 0, c_1, c_2 \in K$. Désignons par K_0 leur corps composé $K_1 K_2$ et par K_3 l'extension $K(\rho_1 + \rho_2)$. Supposons que K_1 et K_2 soient linéairement disjoints.

Lemme 2. *Pour un élément λ de K_0 , si $\lambda^2 + \lambda$ appartient à K , alors λ doit être dans K_1, K_2 ou K_3 . (Cf. Théorie de Galois)*

Lemme 3. *Soient σ_1, σ_2 les automorphismes de K_0 sur K tels que $\rho_1^{\sigma_1} = \rho_1 + 1, \rho_2^{\sigma_1} = \rho_2, \rho_1^{\sigma_2} = \rho_1, \rho_2^{\sigma_2} = \rho_2 + 1$. Si un élément ζ de K_0 est tel que $\zeta \zeta^{\sigma_1}$ appartient à K , alors ζ peut être écrit $\zeta = \zeta_1 \zeta_3, \zeta_1 \in K_1, \zeta_3 \in K_3$. De même, pour un élément ζ tel que $\zeta \zeta^{\sigma_2}$ appartient à K , on a $\zeta = \zeta_2 \zeta_3, \zeta_2 \in K_2, \zeta_3 \in K_3$.*

Si l'on pose $\zeta = \gamma \rho_2 + \delta, \gamma, \delta \in K_1$, on a $\zeta \zeta^{\sigma_1} = (\gamma \rho_2 + \delta)(\gamma^{\sigma_1} \rho_2 + \delta^{\sigma_1}) = \gamma \gamma^{\sigma_1} \rho_2^2 + \gamma \delta^{\sigma_1} \rho_2 + \delta \gamma^{\sigma_1} \rho_2 + \delta \delta^{\sigma_1}$ et alors on a $\zeta \zeta^{\sigma_1} + c_2 \gamma \gamma^{\sigma_1} + \delta \delta^{\sigma_1} + (\gamma \gamma^{\sigma_1} + \gamma \delta^{\sigma_1} + \delta \gamma^{\sigma_1}) \rho_2 = 0$. Comme $\zeta \zeta^{\sigma_1} + c_2 \gamma \gamma^{\sigma_1} + \delta \delta^{\sigma_1}$ est un élément dans K , on a $\gamma \gamma^{\sigma_1} + \gamma \delta^{\sigma_1} + \delta \gamma^{\sigma_1} = 0$. Montrons ensuite qu'il existe un élément b dans K tel que $\zeta \{1 + b(\rho_1 + \rho_2)\}$ ou bien $\zeta \{b(\rho_1 + \rho_2)\}$ appartient à K_1 . Pour un élément x de K_0 , on a $\zeta \{1 + x(\rho_1 + \rho_2)\} = (\gamma \rho_2 + \delta) \{1 + x(\rho_1 + \rho_2)\} = c_2 x \gamma + \delta + x \delta \rho_1 + \{\gamma + x(\gamma \rho_1 + \gamma + \delta)\} \rho_2$. Si $\gamma \rho_1 + \gamma + \delta \neq 0$, posons $x = \gamma(\gamma \rho_1 + \gamma + \delta)^{-1} = b$. L'élément $b = \gamma(\gamma \rho_1 + \gamma + \delta)^{-1}$ est un élément de K_1 tel que $\zeta \{1 + b(\rho_1 + \rho_2)\} = c_2 b \gamma + \delta + b \delta \rho_1$ appartient à K_1 . D'après la relation $\gamma \gamma^{\sigma_1} + \gamma \delta^{\sigma_1} + \delta \gamma^{\sigma_1} = 0$, on a $b^{\sigma_1}(\gamma \rho_1 + \gamma + \delta) = \gamma^{\sigma_1}(\gamma^{\sigma_1} \rho_1 + \delta^{\sigma_1})^{-1}(\gamma \rho_1 + \gamma + \delta) = (\gamma^{\sigma_1} \rho_1 + \delta^{\sigma_1})^{-1}(\gamma \gamma^{\sigma_1} \rho_1 + \gamma \gamma^{\sigma_1} + \gamma^{\sigma_1} \delta) = (\gamma^{\sigma_1} \rho_1 + \delta^{\sigma_1})^{-1}(\gamma \gamma^{\sigma_1} \rho_1 + \gamma \delta^{\sigma_1}) = \gamma$, c'est-à-dire $b^{\sigma_1} = b$ et donc b est un élément de K . Si $\gamma \rho_1 + \gamma + \delta = 0$, pour un élément arbitraire $b \neq 0$ dans K , on a $\zeta \{b(\rho_1 + \rho_2)\} = (\gamma \rho_2 + \delta) \{b(\rho_1 + \rho_2)\} = b(\gamma \rho_2 + \gamma \rho_1 + \gamma)(\rho_1 + \rho_2) = b \gamma (\rho_1 + \rho_2 + 1)(\rho_1 + \rho_2) = b \gamma (c_1 + c_2)$, ce qui appartient à K_1 . Désignons par ζ_3 l'élément $\{1 + b(\rho_1 + \rho_2)\}^{-1}$ ou l'élément $\{b(\rho_1 + \rho_2)\}^{-1}$, et par ζ_1 l'élément $c_2 b \gamma + \delta + b \delta \rho_1$ ou l'élément $b \gamma (c_1 + c_2)$, suivant que $\gamma \rho_1 + \gamma + \delta \neq 0$ ou bien $\gamma \rho_1 + \gamma + \delta = 0$. Alors on obtient $\zeta = \zeta_1 \zeta_3, \zeta_1 \in K_1, \zeta_3 \in K_3$. De la même façon, on peut démontrer la deuxième partie du lemme.

Lemme 4. *Soit K un corps commutatif admettant un automorphisme involutif π . S'il existe un élément c dans K tel que $c^\pi = c$ et qui n'est pas de la forme $\lambda \lambda^\pi$ dans K , alors on peut former une extension quadratique L de K ayant les éléments $1, \omega$ comme base tels que $\omega^2 = c, \xi^\pi = \omega^{-1} \xi \omega, \xi \in K$.*

On peut le voir immédiatement à l'aide des théorèmes 3 et 4 de J. Dieudonné. ([3] p. 184 et p. 186)

Lemme 5. *Soient K, L, π, c vérifiant les mêmes conditions que dans le lemme précédent. Soit F un espace vectoriel sur K de dimension paire $2n$ et soit θ une collinéation de F relative à l'automorphisme π et telle que $\theta^2(x) = xc$. Si l'on pose $x(\xi + \omega \eta) = x \xi + \theta(x) \eta, x \in F, \xi, \eta \in K$, l'espace*

F devient un espace vectoriel F' de dimension n par rapport à L .

En raison des relations $\theta(x\xi) = \theta(x)\xi^\pi$ et $\theta^2(x) = xc$, $x \in F$, $\xi \in K$, on peut facilement vérifier les axiomes d'espace vectoriel et on a une structure d'espace vectoriel sur F par rapport à L .

Lemme 6. Soit K un corps commutatif admettant les automorphismes involutifs π, σ tels que $\pi\sigma = \sigma\pi$ et soit L une extension quadratique sur K définie par les éléments de base $1, \omega$ tels que $\omega^2 = c$, $\xi^\pi = \omega^{-1}\xi\omega$, $c^\sigma = c^\pi = c \in K$, $\xi \in K$. En posant $\alpha^{\sigma'} = \eta_1^\sigma + \omega\eta_2^{\pi\sigma}$ où $\alpha = \eta_1 + \omega\eta_2$ est un élément arbitraire de L avec $\eta_1, \eta_2 \in K$, on peut prolonger l'automorphisme σ en un antiautomorphisme σ' de L .

En effet, pour deux éléments arbitraires α, β dans L , $\beta = \zeta_1 + \omega\zeta_2$, $\zeta_1, \zeta_2 \in K$, on vérifie que $(\alpha\beta)^{\sigma'} = \{(\eta_1 + \omega\eta_2)(\zeta_1 + \omega\zeta_2)\}^{\sigma'} = \{\eta_1\zeta_1 + \eta_1\omega\zeta_2 + \omega\eta_2\zeta_1 + \omega\eta_2\omega\zeta_2\}^{\sigma'} = \{\eta_1\zeta_1 + \omega\eta_1^\pi\zeta_2 + \omega\eta_2\zeta_1 + \omega^2\eta_2^\pi\zeta_2\}^{\sigma'} = \{\eta_1\zeta_1 + \omega\eta_1^\pi\zeta_2 + \omega\eta_2\zeta_1 + c\eta_2^\pi\zeta_2\}^{\sigma'} = \{(\eta_1\zeta_1 + c\eta_2^\pi\zeta_2) + \omega(\eta_1^\pi\zeta_2 + \eta_2\zeta_1)\}^{\sigma'} = (\eta_1\zeta_1 + c\eta_2^\pi\zeta_2)^\sigma + \omega(\eta_1^\pi\zeta_2 + \eta_2\zeta_1)^{\pi\sigma} = \eta_1^\sigma\zeta_1^\sigma + c\eta_2^{\pi\sigma}\zeta_2^\sigma + \omega\eta_1^\sigma\zeta_2^{\pi\sigma} + \omega\eta_2^{\pi\sigma}\zeta_1^\sigma = \eta_1^\sigma\zeta_1^\sigma + \omega^2\eta_2^{\pi\sigma}\zeta_2^\sigma + \omega\eta_1^\sigma\zeta_2^{\pi\sigma} + \omega\eta_2^{\pi\sigma}\zeta_1^\sigma$, et que $\beta^{\sigma'}\alpha^{\sigma'} = (\zeta_1^\sigma + \omega\zeta_2^{\pi\sigma})(\eta_1^\sigma + \omega\eta_2^{\pi\sigma}) = \zeta_1^\sigma\eta_1^\sigma + \zeta_1^\sigma\omega\eta_2^{\pi\sigma} + \omega\zeta_2^{\pi\sigma}\eta_1^\sigma + \omega\zeta_2^{\pi\sigma}\omega\eta_2^{\pi\sigma} = \zeta_1^\sigma\eta_1^\sigma + \omega\zeta_1^{\pi\sigma}\eta_2^{\pi\sigma} + \omega\zeta_2^{\pi\sigma}\eta_1^\sigma + \omega^2\zeta_2^{\pi\sigma}\eta_2^{\pi\sigma}$. Comme K est commutatif, on a $(\alpha\beta)^{\sigma'} = \beta^{\sigma'}\alpha^{\sigma'}$. Il est clair que $\omega^{\sigma'} = \omega$, $\xi^{\sigma'} = \xi^\sigma$, $\xi \in K$.

Lemme 7. Soit $\rho^2 + \rho = ab$, alors la forme $a\xi^2 + \xi\eta + b\eta^2$ se décompose en $a\left(\xi + \frac{\rho}{a}\eta\right)\left(\xi + \frac{\rho+1}{a}\eta\right)$.

Lemme 8. Soient K un corps commutatif et F un espace vectoriel de dimension 4 sur K ayant pour base les vecteurs $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$. Soit $Q(x) = a_1\xi_1^2 + \xi_1\xi_3 + a_3\xi_3^2 + a_2\xi_2^2 + \xi_2\xi_4 + a_4\xi_4^2$ la forme quadratique à quatre variables sur K . Si le pseudo-discriminant $\Delta(Q)$ est de la forme $\mathfrak{p}(b) = b^2 + b$, il existe alors une base de F telle que $Q(x) = a_1(\eta_1^2 + \eta_1\eta_3 + a_1a_3\eta_3^2) + a_2(\eta_2^2 + \eta_2\eta_4 + a_1a_3\eta_4^2)$, et alors $\Delta(Q)$ devient nul. Si $\Delta(Q)$ n'est pas de la forme $\mathfrak{p}(b)$ dans K , $Q(x)$ s'écrit sous la forme : $Q(x) = a_1(\eta_1^2 + \eta_1\eta_3 + a_1a_3\eta_3^2) + a_2(\eta_2^2 + \eta_2\eta_4 + a_2a_4\eta_4^2)$.

Faisons le changement de variables : $\eta_1 = \xi_1$, $\eta_2 = \xi_2 + \frac{b}{a_2}\xi_4$, $\eta_3 = \frac{1}{a_1}\xi_3$, $\eta_4 = \frac{1}{a_2}\xi_4$. La forme quadratique s'écrit $Q(x) = a_1\{\eta_1^2 + \eta_1\eta_3 + a_1a_3\eta_3^2\} + a_2\{\eta_2^2 + \eta_2\eta_4 + (b^2 + b + a_2a_4)\eta_4^2\} = a_1\{\eta_1^2 + \eta_1\eta_3 + a_1a_3\eta_3^2\} + a_2\{\eta_2^2 + \eta_2\eta_4 + a_1a_3\eta_4^2\}$. Dans l'autre cas, si l'on fait le changement de variables : $\eta_1 = \xi_1$, $\eta_2 = \xi_2$, $\eta_3 = \frac{1}{a_1}\xi_3$, $\eta_4 = \frac{1}{a_2}\xi_4$, on obtient la forme cherchée.

REMARQUE. Soit la forme quadratique $Q(x) = a_1\xi_1^2 + \xi_1\xi_3 + a_3\xi_3^2 + a_2\xi_2^2 + \xi_2\xi_4 + a_4\xi_4^2$ d'indice 0. Soient ρ_1, ρ_2 des racines des équations $X^2 + X + a_1a_3 = 0$, $X^2 + X + a_2a_4 = 0$. Désignons $K(\rho_1), K(\rho_2), K(\rho_1, \rho_2)$ par K_1, K_2, K_0

respectivement. D'après le lemme 1, si $\rho_2 \in K_1$, alors $\mathcal{A}(Q)$ est de la forme $\mathfrak{p}(b)$ dans K . Réciproquement, si $\mathcal{A}(Q)$ est de la forme $\mathfrak{p}(b)$ dans K , comme on a $\mathcal{A}(Q) = b^2 + b = a_1 a_3 + a_2 a_4 = \rho_1^2 + \rho_1 + a_2 a_4$, on a $\rho_2 = \rho_1 + b \in K_1$; en utilisant le lemme 8, on peut supposer $\rho_1 = \rho_2$. Alors le fait que $\rho_1 = \rho_2$ équivaut à la condition que $\mathcal{A}(Q)$ est de la forme $\mathfrak{p}(b)$ dans K . Dans ces conditions on arrive au lemme suivant.

Lemme 9. Soient $Q(x)$, $\rho_1, \rho_2, K_1, K_2, K_0$ vérifiant les mêmes conditions que la remarque. (i) Si $\rho_1 = \rho_2 = \rho$, et si σ est un automorphisme de K_1 tel que $\rho^\sigma = \rho + 1$, alors $a_1 a_2$ n'est pas de la forme $\zeta \zeta^\sigma$ dans K_1 . (ii) Si $\rho_1 \neq \rho_2$, et si σ_1, σ_2 sont des automorphismes de K_0 tels que $\rho_1^{\sigma_1} = \rho_1 + 1, \rho_2^{\sigma_1} = \rho_2, \rho_1^{\sigma_2} = \rho_1, \rho_2^{\sigma_2} = \rho_2 + 1$, alors $a_1 a_2$ n'est pas de la forme $\zeta \zeta^\pi$ dans K_0 , où $\pi = \sigma_1 \sigma_2$.

(i) Si l'on avait $a_1 a_2 = \zeta \zeta^\sigma, \zeta \in K_1$, on aurait $\frac{a_2}{a_1} = \left(\frac{\zeta}{a_1}\right) \left(\frac{\zeta}{a_1}\right)^\sigma = \zeta' \zeta'^{\sigma}$. Selon la forme $Q(x)$ du lemme 8, et le lemme 7, si l'on prend $\eta_1 + \rho \eta_3 = \zeta', \eta_2 + \rho \eta_4 = 1$, on aurait $Q(x) = a_1 \{\eta_1^2 + \eta_1 \eta_3 + a_1 a_3 \eta_3^2\} + a_2 \{\eta_2^2 + \eta_2 \eta_4 + a_1 a_3 \eta_4^2\} = a_1 \{\eta_1 + \rho \eta_3\} \{\eta_1 + (\rho + 1) \eta_3\} + a_2 \{\eta_2 + \rho \eta_4\} \{\eta_2 + (\rho + 1) \eta_4\} = a_1 \zeta' \zeta'^{\sigma} + a_2 = 0$, pour un vecteur non nul, contrairement à l'hypothèse de l'indice 0.

(ii) Si on avait $a_1 a_2 = \zeta \zeta^\pi, \zeta = \alpha \rho_2 + \beta, \alpha, \beta \in K_1$, on aurait $a_1 a_2 = (\alpha \rho_2 + \beta)(\alpha^{\sigma_1} \rho_2 + \alpha^{\sigma_1} + \beta^{\sigma_1}) = \alpha \alpha^{\sigma_1} \rho_2^2 + \alpha \alpha^{\sigma_1} \rho_2 + \alpha \beta^{\sigma_1} \rho_2 + \beta \alpha^{\sigma_1} \rho_2 + \alpha^{\sigma_1} \beta + \beta \beta^{\sigma_1} = a_2 a_4 \alpha \alpha^{\sigma_1} + \alpha^{\sigma_1} \beta + \beta \beta^{\sigma_1} + (\alpha \beta^{\sigma_1} + \beta \alpha^{\sigma_1}) \rho_2$. D'où on tire

$$(5) \quad \alpha \beta^{\sigma_1} + \beta \alpha^{\sigma_1} = 0$$

$$(6) \quad a_1 a_2 + a_2 a_4 \alpha \alpha^{\sigma_1} + \alpha^{\sigma_1} \beta + \beta \beta^{\sigma_1} = 0.$$

(a) Si $\beta \neq 0$, d'après (5) on a $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\sigma_1} = \frac{\alpha}{\beta}$, donc $\frac{\alpha}{\beta} \in K$. Il existe alors un élément a dans K tel que $\alpha = a\beta$. De la formule (6), on tire $a_1 a_2 + a_2 a_4 a^2 \beta \beta^{\sigma_1} + a \beta \beta^{\sigma_1} + \beta \beta^{\sigma_1} = 0$ et $a_1 a_2 \frac{1}{\beta \beta^{\sigma_1}} + a_2 a_4 a^2 + a + 1 = 0$. En posant $\frac{1}{\beta} = b\rho_1 + c, b, c \in K$, on a $\frac{1}{\beta \beta^{\sigma_1}} = (b\rho_1 + c)(b\rho_1 + b + c) = b^2 a_1 a_3 + c^2 + bc$, et alors on a $a_1 a_2 (b^2 a_1 a_3 + c^2 + bc) + a_2 a_4 a^2 + a + 1 = 0$. En multipliant par a_2 , cette formule se ramène à $a_1 (ca_2)^2 + (ca_2)(ba_1 a_2) + a_3 (ba_1 a_2)^2 + a_2 1^2 + 1(aa_2) + a_4 (aa_2)^2 = 0$. Pour le vecteur non nul $x_0 = ca_2 \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + ba_1 a_2 \varepsilon_3 + aa_2 \varepsilon_4$, la forme $Q(x_0)$ se réduirait à 0, ce qui contredit l'hypothèse que cette forme soit d'indice 0. (b) Si $\beta = 0$, on a $a_1 a_2 = a_2 a_4 \alpha \alpha^{\sigma_1}$ d'après (6). En posant $\frac{1}{\alpha} = b\rho_1 + c$, on a $a_1 a_2 \frac{1}{\alpha \alpha^{\sigma_1}} = a_1 a_2 (b^2 a_1 a_3 + c^2 + bc) = a_2 a_4$. Comme dans le cas (a) on aurait $a_1 (ca_2)^2 + (ca_2)(ba_1 a_2) + a_3 (ba_1 a_2)^2 + a_4 a_2^2 = 0$. Par suite, pour le vecteur $x_0 = ca_2 \varepsilon_1 + ba_1 a_2 \varepsilon_3 + a_2 \varepsilon_4 \neq 0$, la forme $Q(x_0)$ serait égale à 0, contrairement à l'hypothèse de l'indice 0.

Lemme 10. Soient K, L les corps du lemme 4, soient F, F' les espaces vectoriels des dimensions $2n, n$ respectivement, considérés dans le lemme 5 et soient σ, σ' les antiautomorphismes donnés dans le lemme 6. Alors, la relation $g'(x, y) = g(x, y) + \omega c^{-1}g(\theta(x), y)$ établit une correspondance entre formes sesquilinéaires³⁾ g sur $F \times F$ relatives à l'antiautomorphisme σ et formes sesquilinéaires g' sur $F' \times F'$ relatives à l'antiautomorphisme σ' . De plus, si la forme g' est hermitienne, la forme g l'est aussi. Réciproquement, si la forme g est hermitienne définie par une corrélation φ de F dans F^* telle que ${}^t\varphi = \varphi, \varphi\theta = c\check{\theta}\varphi$, alors la forme g' est aussi hermitienne.

Prenons d'abord une forme sesquilinéaire g' sur $F' \times F'$ relative à l'antiautomorphisme σ' , c'est-à-dire, $g'(x\alpha, y) = \alpha^{\sigma'}g'(x, y), g'(x, y\alpha) = g'(x, y)\alpha$ pour $x, y \in F', \alpha \in L$. Posons $g'(x, y) = g(x, y) + \omega g_1(x, y)$, où g et g_1 sont des applications de $F' \times F'$ dans K . Quand on considère F' comme espace vectoriel sur K , g est une forme sur $F \times F$. Puisque $g'(x\omega, y) = \omega^{\sigma'}g'(x, y) = \omega g'(x, y)$, on a $g(x\omega, y) + \omega g_1(x\omega, y) = \omega g(x, y) + \omega^2 g_1(x, y) = \omega g(x, y) + c g_1(x, y)$. Donc, $g(x\omega, y) = c g_1(x, y), g_1(x\omega, y) = g(x, y)$. Mais ces deux relations sont équivalentes. Car, on remarque d'abord que pour $\alpha \in K, g(x\alpha, y) = \alpha^{\sigma'}g(x, y)$ et $g_1(x\alpha, y) = \omega^{-1}\alpha^{\sigma'}\omega g_1(x, y) = \alpha^{\sigma'\pi}g_1(x, y)$. Alors, $g(x\omega, y) = c g_1(x, y)$ entraîne que $g(x\omega, y) = g_1(xc, y) = g_1(x\omega^2, y)$. Si x parcourt $F', x\omega = x'$, parcourt aussi F' . Donc cette relation s'écrit $g(x', y) = g_1(x'\omega, y)$. Réciproquement, si $g_1(x\omega, y) = g(x, y)$ on a $g(x\omega, y) = g_1(x\omega^2, y) = g_1(xc, y) = c g_1(x, y)$. D'autre part, on a $\theta(x) = x\omega$. Il s'en suit que pour une application sesquilinéaire g' de $F' \times F'$ dans L il existe une application sesquilinéaire g de $F \times F$ dans K telle que $g'(x, y) = g(x, y) + \omega c^{-1}g(\theta(x), y)$. Il est évident que si g' est hermitienne, c'est-à-dire $g'(y, x) = g'(x, y)^{\sigma'}$, g l'est aussi.

Inversement, considérons une forme sesquilinéaire g de $F \times F$ dans K . Si l'on pose $g'(x, y) = g(x, y) + \omega c^{-1}g(\theta(x), y)$, comme on a, pour $\alpha \in K, g(x\alpha, y) = \alpha^{\sigma'}g(x, y)$ et $g(\theta(x\alpha), y) = g(\theta(x)\alpha^\pi, y) = \alpha^{\pi\sigma'}g(\theta(x), y)$, on a alors $g'(x\alpha, y) = \alpha^{\sigma'}g(x, y) + \omega c^{-1}\alpha^{\pi\sigma'}g(\theta(x), y) = \alpha^{\sigma'}g(x, y) + \alpha^{\sigma'}\omega c^{-1}g(\theta(x), y) = \alpha^{\sigma'}g'(x, y)$. Et on a $g'(x\omega, y) = g(x\omega, y) + \omega c^{-1}g(\theta(x\omega), y) = \omega^2 c^{-1}g(x\omega, y) + \omega c^{-1}g(xc, y) = \omega\{\omega c^{-1}g(x\omega, y) + g(x, y)\} = \omega^{\sigma'}g'(x, y)$, car on a vu que $\omega^{\sigma'} = \omega$, (lemme 6). Lorsque l'on considère F comme un espace vectoriel F' sur L, g' est alors une application sesquilinéaire de $F' \times F'$ dans L . Supposons ensuite que la forme sesquilinéaire g soit définie par $g(x, y) = \langle \varphi(x), y \rangle$, telle que ${}^t\varphi = \varphi, \varphi\theta = c\check{\theta}\varphi$. Alors la forme g est hermitienne: $g(y, x) = g(x, y)^{\sigma'}$. Montrons que la forme g' est hermitienne.

3) On trouve la définition de la forme sesquilinéaire à §5, chap. I [1].

En effet, on a $g(\theta(x), y)^\pi = g(y, \theta(x))^{\pi\sigma' \ 4)} = g(\theta^{-1}(y)c, x)^{\sigma'} = cg(x, \theta^{-1}(y))^{\sigma'/2 \ 5)}$
 $= cg(x, \theta(y)c^{-1}) = g(x, \theta(y))$. Comme on a $\omega^{-1}\zeta\omega = \zeta^\pi$ pour $\zeta \in K$, on a
 $\omega g(\theta(x), y)^{\pi\sigma'} = g(\theta(x), y)^{\sigma'}\omega$. D'où on trouve finalement $g'(y, x) = g(y, x)$
 $+ \omega c^{-1}g(\theta(y), x) = g(x, y)^{\sigma'} + \omega c^{-1}g(x, \theta(y))^{\sigma'} = g(x, y)^{\sigma'} + \omega c^{-1}g(\theta(x), y)^{\pi\sigma'}$
 $= g(x, y)^{\sigma'} + c^{-1}g(\theta(x), y)^{\sigma'}\omega = g(x, y)^{\sigma'} + g(\theta(x), y)^{\sigma'}c^{-\sigma'}\omega^{\sigma'} = \{g(x, y) +$
 $\omega c^{-1}g(\theta(x), y)\}^{\sigma'} = g(x, y)^{\sigma'}$.

Désignons par $F^{(2)}$ l'espace des bivecteurs sur F . Toute application semi-linéaire v de F dans lui-même a une puissance extérieure seconde qui est une application semi-linéaire $v^{(2)}$ de $F^{(2)}$ sur lui-même définie par $v^{(2)}(x \wedge y) = v(x) \wedge v(y)$, où x, y sont des vecteurs arbitraires de F .

Les trois lemmes suivants sont déduits des résultats obtenus au cours des démonstrations du cas de la caractéristique $p \neq 2$, [3]. Comme ces résultats ne dépendent pas de la caractéristique, nous ne donnons pas de nouveau leurs démonstrations.

Lemme 11. *Soit K un corps commutatif admettant un automorphisme involutif σ et soit F un espace vectoriel de dimension 4 sur K . Soit θ une collinéation de F dans lui-même relative à σ telle que $\theta^2(x) = cx, c = c^\sigma \in K, x \in F$. Pour une transformation linéaire $v \in GL_4(F)$, si l'on a $u = \mu v^{(2)}, \mu \in K$ et $u\theta^{(2)} = \theta^{(2)}u$, alors on a $u = \gamma v'^{(2)}, \gamma = \gamma^\sigma \in K, v' \in GL_4(F)$ tel que $v'\theta = \theta v'$, et $\mu = \gamma\beta^2, \beta \in K$.*

Lemme 12. *Soient L une extension non commutative de K, σ un automorphisme involutif de L et σ' un antiautomorphisme involutif de L permutant à σ . Soient φ une corrélation involutive de F dans F^* relative à σ' et θ une collinéation involutive de F dans lui-même relative à σ telle que $\theta^2(x) = cx, x \in F, c$ étant un élément du centre de L et que $\varphi\theta = c\theta\varphi$.*
 (i) *Si l'on a $\varphi v = \lambda v\varphi, v \in GL_4(F), \lambda \in L$, alors $\lambda = \lambda^{\sigma'}$ et λ appartient au centre de L .* (ii) *Si en outre on a $v\theta = \theta v$, alors $\lambda = \lambda^\sigma$ est un élément de K .*

Lemme 13. *Soient ψ une application canonique de $F^{(2)}$ sur $F^{(2)*}$ et φ une corrélation involutive de F dans F^* relative à un automorphisme involutif σ de K . Pour $v \in GL_4(F), \mu \in K$, si l'on a $\mu v^{(2)}\psi^{-1}\varphi^{(2)} = \psi^{-1}\varphi^{(2)}\mu v^{(2)}$, on a alors $\varphi v = \lambda v\varphi, \lambda \in K$, et $\lambda = \lambda^\sigma, |v| = \mu^{\sigma^{-1}}\lambda^2$ où $|v|$ est le déterminant de v .*

3. Considérons d'abord le cas de l'indice 1. Soit E un espace vectoriel de dimension 6 sur K . Supposons que la forme quadratique $Q(x)$ soit rapportée à une base symplectique $(e_i)_{1 \leq i \leq 6}$ telle que

4) On a $\varphi\theta = c'\theta^{-1}\varphi, {}^t\varphi = \varphi$ et ${}^t\theta\varphi = c\varphi\theta^{-1}$.
 5) Comme $\theta^2 = c$, on a $\theta^{-1} = c^{-1}\theta$.

$$(7) \quad Q(x) = a_1 \xi_1^2 + \xi_1 \xi_4 + a_4 \xi_4^2 + a_2 \xi_2^2 + \xi_2 \xi_5 + a_5 \xi_5^2 + \xi_3 \xi_6,$$

où la forme quadratique à quatre variables $a_1 \xi_1^2 + \xi_1 \xi_4 + a_4 \xi_4^2 + a_2 \xi_2^2 + \xi_2 \xi_5 + a_5 \xi_5^2$ est d'indice 0, ce qui entraîne en particulier que $a_1 a_4, a_2 a_5$ ne sont pas de la forme $\wp(b) = b^2 + b$ dans K . Le pseudo-discriminant est

$$(8) \quad \begin{aligned} \Delta(Q) &= Q(e_1)Q(e_4) + Q(e_2)Q(e_5) \\ &= a_1 a_4 + a_2 a_5. \end{aligned}$$

Soient ρ, ρ' des racines des équations $X^2 + X + a_1 a_4 = 0, X^2 + X + a_2 a_5 = 0$. Selon la remarque du n°2, nous sommes amenés à distinguer deux cas, suivant que $\Delta(Q)$ est de la forme $\wp(b)$ dans K ou non, autrement dit que $\rho = \rho'$ ou $\rho \neq \rho'$.

4. Cas où $\Delta(Q)$ est de la forme $\wp(b)$ dans K . D'après le lemme 8, la forme quadratique $Q(x)$ peut être écrite (pour une base convenable)

$$Q(x) = a_1 \{ \xi_1'^2 + \xi_1' \xi_4' + (\rho^2 + \rho) \xi_4'^2 \} + a_2 \{ \xi_2'^2 + \xi_2' \xi_5' + (\rho^2 + \rho) \xi_5'^2 \} + \xi_3' \xi_6'.$$

Soit K_1 l'extension quadratique de K obtenue par adjonction de ρ et soit E_1 l'espace vectoriel obtenu par extension à K_1 du corps des scalaires K de E . Alors la forme Q est la restriction à E de la forme Q_1 définie sur E_1 telle que

$$Q_1(x) = a_1 \{ \xi_1' + \rho \xi_4' \} \{ \xi_1' + (\rho + 1) \xi_4' \} + a_2 \{ \xi_2' + \rho \xi_5' \} \{ \xi_2' + (\rho + 1) \xi_5' \} + \xi_3' \xi_6'.$$

Les transformations de $GO_6^+(Q)$ sont les restrictions à E des transformations de $GO_6^+(Q_1)$ qui permutent avec la transformation semi-linéaire involutive $w: (\xi_1', \dots, \xi_6') \rightarrow (\xi_1'^\sigma, \dots, \xi_6'^\sigma)$ de E_1 , où σ est l'unique K -automorphisme de K_1 , distinct de l'identité. Par le changement de coordonnées: $\eta_1 = a_1(\xi_1' + \rho \xi_4'), \eta_2 = a_2(\xi_2' + \rho \xi_5'), \eta_3 = \xi_3', \eta_4 = \xi_1' + (\rho + 1)\xi_4', \eta_5 = \xi_2' + (\rho + 1)\xi_5', \eta_6 = \xi_6'$, on a la forme quadratique d'indice 3 sur K_1 ,

$$Q_1(x) = \eta_1 \eta_4 + \eta_2 \eta_5 + \eta_3 \eta_6.$$

Comme $a_1(\xi_1'^\sigma + \rho \xi_4'^\sigma) = a_1 \{ \xi_1' + (\rho + 1) \xi_4' \}^\sigma = a_1 \eta_4^\sigma, a_2(\xi_2'^\sigma + \rho \xi_5'^\sigma) = a_2 \{ \xi_2' + (\rho + 1) \xi_5' \}^\sigma = a_2 \eta_5^\sigma, \xi_1'^\sigma + (\rho + 1) \xi_4'^\sigma = (\xi_1' + \rho \xi_4')^\sigma = a_1^{-1} \eta_1^\sigma, \xi_2'^\sigma + (\rho + 1) \xi_5'^\sigma = (\xi_2' + \rho \xi_5')^\sigma = a_2^{-1} \eta_2^\sigma$, la transformation w s'écrit $(\eta_1, \dots, \eta_6) \rightarrow (a_1 \eta_4^\sigma, a_2 \eta_5^\sigma, \eta_3^\sigma, a_1^{-1} \eta_1^\sigma, a_2^{-1} \eta_2^\sigma, \eta_6^\sigma)$. Soient F_1 l'espace vectoriel de dimension 4 sur K_1 et $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ les éléments de sa base. Désignons par $F_1^{(2)}$ l'espace des bivecteurs sur F_1 . On peut alors identifier E_1 à $F_1^{(2)}$ par la correspondance des éléments de base telle que $(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6) \leftrightarrow (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3, \varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4, \varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)$. Si θ est la transformation semi-linéaire relative à σ de F_1 dans lui-même: $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_4, a_2 \varepsilon_3, a_1 \varepsilon_2, a_1 a_2 \varepsilon_1)$, $\theta^{(2)}$ est la transformation semi-linéaire de $F_1^{(2)}$ dans lui-même: $(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow$

$(a_2(\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4), a_1(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4), a_1 a_2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4), a_1^2 a_2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2), a_1 a_2^2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3), a_1 a_2(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3))$. On a alors $w = (a_1 a_2)^{-1} \theta^{(2)}$. D'après le lemme 9 (i), $a_1 a_2$ n'est pas de la forme $\zeta \zeta^\sigma$ dans K_1 . Alors, en vertu du lemme 4, on peut former l'extension quadratique K_2 de K_1 ayant 1 et ω comme base, avec $\omega^2 = a_1 a_2$, $\zeta^\sigma = \omega^{-1} \zeta \omega$ pour $\zeta \in K_1$. K_2 est le corps de quaternions généralisés sur K qui correspond au couple $(a_1 a_4, a_1 a_2)$: les quatre éléments 1, ρ , ω , $\rho \omega$ forment une base telle que $\omega^2 = a_1 a_2$, $\rho^2 + \rho = a_1 a_4$, $\omega^{-1} \rho \omega = \rho + 1$. Comme θ est une transformation involutive telle que $\theta^2(x) = a_1 a_2 x$, d'après le lemme 5, l'espace F_1 peut être considéré comme un espace vectoriel F_2 de dimension 2 sur K_2 . D'autre part, pour l'indice 3 on sait que $GO_6^+(Q) \simeq \frac{K_1^* \times GL_4(F_1)}{\{(\lambda^2, \lambda^{-1})\}}$ où λ parcourt K^* , [2], [3]. Alors, toute transformation u de $GO_6^+(Q_1)$ peut être écrite $u = \mu v^{(2)}$, où μ est un élément de K_1^* (homothétie) et v est une transformation linéaire sur F_1 . La condition $wu = uw$ donne $\theta^{(2)} \mu v^{(2)} = \mu v^{(2)} \theta^{(2)}$, et d'après le lemme 11 on a $u = \gamma v^{(2)}$ où $\gamma = \gamma^\sigma \in K$, $v' \in GL_4(F_1)$, $v' \theta = \theta v'$. Mais, on peut considérer v' comme une transformation linéaire de F_2 sur lui-même. La correspondance $\gamma v'^{(2)} \rightarrow u$ est donc un homomorphisme de $K^* \times GL_2(F_2)$ sur $GO_6^+(Q)$, avec un noyau $\{(\gamma^2, \gamma^{-1})\}$. On en conclut que $GO_6^+(Q) \simeq \frac{K^* \times GL_2(F_2)}{\{(\gamma^2, \gamma^{-1})\}}$ où γ parcourt K^* .

5. Cas où $A(Q)$ n'est pas de la forme $\mathfrak{p}(b)$ dans K . Les deux extensions quadratiques $K(\rho)$ et $K(\rho')$ sont linéairement disjointes sur K . Désignons par K_1 leur composé $K(\rho)K(\rho')$. Soit E_1 l'espace vectoriel obtenu à partir de E en étendant K à K_1 . La forme quadratique $Q(x)$ est la restriction à E de la forme

$$Q_1(x) = a_1 \{ \xi_1' + \rho \xi_4' \} \{ \xi_1' + (\rho + 1) \xi_4' \} + a_2 \{ \xi_2' + \rho' \xi_5' \} \{ \xi_2' + (\rho' + 1) \xi_5' \} + \xi_3' \xi_6'$$

sur E_1 , (lemmes 7 et 8). Si l'on fait le changement de coordonnées: $\eta_1 = \xi_1' + \rho \xi_4'$, $\eta_2 = a_2(\xi_2' + \rho' \xi_5')$, $\eta_3 = \xi_3'$, $\eta_4 = a_1 \{ \xi_1' + (\rho + 1) \xi_4' \}$, $\eta_5 = \xi_2' + (\rho' + 1) \xi_5'$, $\eta_6 = \xi_6'$, on a la forme d'indice 3 sur K_1 ,

$$Q_1(x) = \eta_1 \eta_4 + \eta_2 \eta_5 + \eta_3 \eta_6.$$

Soient σ, τ les automorphismes de K_1 tels que $\rho^\sigma = \rho + 1$, $\rho'^\sigma = \rho'$, $\rho^\tau = \rho$, $\rho'^\tau = \rho' + 1$. On peut considérer que toute transformation de $GO_6^+(Q)$ est la restriction à E d'une transformation de $GO_6^+(Q_1)$ qui permute avec les deux transformations semi-linéaires w, w' sur E_1 données par $w: (\xi_1', \dots, \xi_6') \rightarrow (\xi_1'^\sigma, \dots, \xi_6'^\sigma)$ et $w': (\xi_1', \dots, \xi_6') \rightarrow (\xi_1'^\tau, \dots, \xi_6'^\tau)$. Les transformations w, w' sont $(\eta_1, \dots, \eta_6) \rightarrow (a_1^{-1} \eta_4^\sigma, \eta_2^\sigma, \eta_3^\sigma, a_1 \eta_1^\sigma, \eta_5^\sigma, \eta_6^\sigma)$ et $(\eta_1, \dots, \eta_6) \rightarrow (\eta_1^\tau, a_2 \eta_5^\tau, \eta_3^\tau, \eta_4^\tau, a_2^{-1} \eta_2^\tau, \eta_6^\tau)$. Soit F_1 un espace vectoriel de dimension 4 sur K_1 et soient φ, φ' deux corrélations relatives aux automorphismes σ, τ de F_1 sur F_1^* (l'espace dual de F_1) telles que $\varphi: (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \rightarrow (a_1 \varepsilon_2^*, a_1 \varepsilon_1^*,$

$\varepsilon_4^*, \varepsilon_3^*$), $\varphi' : (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_3^*, a_2\varepsilon_4^*, \varepsilon_1^*, a_2\varepsilon_2^*)$. Les applications semi-linéaires de $F_1^{(2)}$ sur $F_1^{(2)*}$ déduites de φ, φ' sont $\varphi^{(2)} : (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow (a_1^2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, a_1(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, a_1(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*, (\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, a_1(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, a_1(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*)$ et $\varphi'^{(2)} : (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow (a_2(\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, a_2(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*, a_2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, a_2^2(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, a_2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*)$. Désignons par ψ l'application canonique de $F_1^{(2)}$ sur $F_1^{(2)*}$ telle que $(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow ((\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*)$. On constate alors que

$$(9) \quad w = \psi^{-1}a_1^{-1}\varphi^{(2)}, \quad w' = \psi^{-1}a_2^{-1}\varphi'^{(2)}.$$

Comme dans le cas précédent, pour tout $u \in GO_6^+(Q_1)$, on a $u = \mu v^{(2)}$ où μ est une homothétie dans E_1 et v appartient à $GL_4(F_1)$. Les deux conditions $wu = uw, w'u = uw'$ s'écrivent avec les relations (9) $\psi^{-1}\mu^\sigma\varphi^{(2)}v^{(2)} = \mu v^{(2)}\psi^{-1}\varphi^{(2)}, \psi^{-1}\mu^\tau\varphi'^{(2)}v^{(2)} = \mu v^{(2)}\psi^{-1}\varphi'^{(2)}$. Or, d'après le lemme 13, on a

$$(10) \quad \varphi v = \lambda \overset{\vee}{v} \varphi, \quad \varphi' v = \lambda' \overset{\vee}{v} \varphi', \quad \lambda, \lambda' \in K_1.$$

Donc, pour que la restriction de $u = \mu v^{(2)}$ appartienne à $GO_6^+(Q)$ il faut et il suffit que v permute projectivement avec φ, φ' . Mais, si l'on introduit l'application semi-linéaire $\theta = a_2\varphi'^{-1}\varphi$ de F_1 sur lui-même, relative à l'automorphisme $\pi = \sigma\tau = \tau\sigma$, ces conditions sont remplacées par

$$(11) \quad \varphi v = \lambda \overset{\vee}{v} \varphi, \quad \theta v = \lambda'' \overset{\vee}{v} \theta, \quad \lambda, \lambda'' \in K_1.$$

Comme on peut voir facilement, θ est l'application de F_1 sur lui-même : $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \rightarrow (a_1\varepsilon_4, a_1a_2\varepsilon_3, \varepsilon_2, a_2\varepsilon_1)$, donc on a

$$(12) \quad \theta^2(x) = a_1a_2x.$$

D'après le lemme 9 (ii) a_1a_2 ne peut pas être écrit sous la forme $\zeta\zeta^\pi, \zeta \in K_1$. Formons à l'aide du lemme 4 l'extension quadratique K_2 de K_1 ayant 1 et ω pour base, définie par $\omega^2 = a_1a_2, \omega^{-1}\zeta\omega = \zeta^\pi, \zeta \in K_1$. Lorsque l'on considère l'extension quadratique K_0 de K obtenue par adjonction d'une racine de l'équation $X^2 + X + 4(Q) = 0$, alors π laisse invariant tous les éléments de K_0 et K_0 est le centre de K_2 . L'extension K_2 est ainsi le corps de quaternions généralisés sur K_0 , qui correspond au couple (a_1a_4, a_1a_2) . Considérons l'espace vectoriel F_1 , en vertu du lemme 5, comme un espace vectoriel par rapport à K_2 . Désignons cet espace par F_2 . D'après le lemme 6, l'automorphisme σ peut se prolonger en un antiautomorphisme σ' de K_2 . Par le lemme 10, la forme g_1 sur F_1 définie par $g_1(x, y) = \langle \varphi(x), y \rangle$ correspond sur F_2 à la forme g telle que $g(x, y) = g_1(x, y) + (a_1a_2)^{-1}\omega g_1(\theta(x), y)$. Et de plus, on a $\varphi\theta = a_1a_2\overset{\vee}{\theta}\varphi$, parce que l'on a $\theta^2(x) = a_2^2\varphi'^{-1}\varphi\varphi'^{-1}\varphi(x) = a_1a_2x$, donc $\varphi\theta(x) = a_1a_2{}^t(a_2\varphi'^{-1}\varphi)^{-1}\varphi(x) = a_1a_2\overset{\vee}{\theta}\varphi(x)$. Comme ${}^t\varphi = \varphi, g_1$ est alors hermitienne. En utilisant le lemme 10, g est aussi hermitienne.

D'autre part, en raison des relations (11) et (12), on a $\theta v\theta(x) = \lambda''v\theta^2(x) = \lambda''a_1a_2v(x)$ et $\theta v\theta(x) = \theta(\lambda''^{-1}\theta v(x)) = \lambda''^{-\pi}\theta^2v(x) = \lambda''^{-\pi}a_1a_2v(x)$; ceci montre que $\lambda''\lambda''^\pi = 1$. Si l'on choisit un élément β dans K_1 tel que $\beta^{1-\pi} = \lambda''$, $t = \beta v$ est une application linéaire de F_1 sur lui-même, telle que $\theta t = t\theta$. Car la condition (11) donne $\theta(\beta^{-1}t) = \lambda''(\beta^{-1}t)\theta$, $\beta^{-\pi}\theta t = \lambda''\beta^{-1}t\theta$, et $\theta t = \beta^\pi\lambda''\beta^{-1}t\theta = t\theta$. En appliquant le lemme 13 aux relations $u = \mu v^{(2)} = \mu\beta^{-2}t^{(2)} = \mu_0t^{(2)}$, $wu = uw$, $w'u = uw'$ et (9), on a

$$(13) \quad \varphi t = \lambda_0 \underset{\vee}{t}\varphi, \quad \varphi' t = \lambda_0' \underset{\vee}{t}\varphi', \quad \lambda_0 = \lambda_0^\sigma \in K_1, \quad \lambda_0' = \lambda_0'^\tau \in K_1, \\ |t| = \mu_0^{\sigma-1}\lambda_0^2 = \mu_0'^{\tau-1}\lambda_0'^2.$$

Mais d'après les relations $t\theta = \theta t$, $\theta = a_2\varphi'^{-1}\varphi$, et (13), on a $t\varphi'^{-1}\varphi = \varphi'^{-1}\varphi t = \varphi'^{-1}\lambda_0 \underset{\vee}{t}\varphi$, $\lambda_0 \underset{\vee}{t}\varphi = \varphi' t \varphi'^{-1}\varphi = \lambda_0' \underset{\vee}{t}\varphi' \varphi'^{-1}\varphi = \lambda_0' \underset{\vee}{t}\varphi$, donc on a $\lambda_0 = \lambda_0'$. Comme $\varphi\theta = a_1a_2\theta\varphi$, $\varphi t = \lambda_0 \underset{\vee}{t}\varphi$, par le lemme 12 (i), λ_0 appartient à K_0 . De plus, comme $\theta t = t\theta$, il résulte du lemme 12 (ii), que λ_0 appartient à K . Remarquons t peut être considéré comme une application linéaire de F_2 sur lui-même, car $t(x\omega) = t\theta(x) = \theta t(x) = t(x)\omega$. Les relations (13) et $\theta t = t\theta$ entraînent que $g(t(x), t(y)) = g_1(t(x), t(y)) + (a_1a_2)^{-1}\omega g_1(\theta t(x), t(y)) = \lambda_0 g_1(x, y) + (a_1a_2)^{-1}\omega \lambda_0 g_1(\theta(x), y) = \lambda_0 g(x, y)$, ce qui montre que t appartient au groupe $GU_2(F_2, g)$. Inversement, si t appartient à $GU_2(F_2, g)$, on a aisément $g_1(t(x), t(y)) = \lambda_1 g_1(x, y)$, $\lambda_1^\sigma = \lambda_1^\tau = \lambda_1$, donc $\varphi t = \lambda_1 \underset{\vee}{t}\varphi$. Comme $t\theta = \theta t$, on a aussi $\varphi' t = \lambda_1 \underset{\vee}{t}\varphi'$. Alors, pour que $u = \mu_0 t^{(2)}$ appartienne à $GO_6^+(Q)$, il faut et il suffit qu'on ait les relations (13). D'après la deuxième relation de (13) on a $\mu_0^\tau = \mu_0^\sigma$ et $\mu_0 = \mu_0^\pi \in K_0$, ce qui est compatible avec les relations $|t||t|^\sigma = \mu_0^{\sigma-1}\lambda_0^2\mu_0^{1-\sigma}\lambda_0^2 = \lambda_0^4 = |t||t|^\tau$ et elles donnent aussi $|t| \in K_0$. Mais pour $\mu_0 = \gamma\beta_0$, $\gamma \in K$, $\beta_0 \in K_0$, on a de même $|t| = \mu_0^{\sigma-1}\lambda_0^2 = \beta_0^{\sigma-1}\lambda_0^2$. En résumant ce qui précède, on conclut que $GO_6^+(Q) \simeq \Gamma / \{(\gamma^2, \gamma^{-1})\}$ où Γ est le sous-groupe de $K_0^* \times GU_2(F_2, g)$ formé des couples (μ_0, t) tels que $|t| = \mu_0^{\sigma-1}\lambda_0^2$, $\mu_0 \in K_0^*$, $t \in GU_2(F_2, g)$ et où γ parcourt K^* .

6. Considérons ensuite le cas de l'indice 0. La forme quadratique $Q(x)$ peut s'écrire

$$Q(x) = a_1\xi_1^2 + \xi_1\xi_4 + a_4\xi_4^2 + a_2\xi_2^2 + \xi_2\xi_5 + a_5\xi_5^2 + a_3\xi_3^2 + \xi_3\xi_6 + a_6\xi_6^2,$$

où les éléments a_1a_4 , a_2a_5 , a_3a_6 ne sont pas de la forme $\wp(b)$ dans K . Soient $\rho_0, \rho_1, \rho_2, \rho_3$ des racines des équations: $X^2 + X + 4(Q) = 0$, $X^2 + X + a_1a_4 = 0$, $X^2 + X + a_2a_5 = 0$, $X^2 + X + a_3a_6 = 0$. Le pseudo-discriminant est $\Delta(Q) = a_1a_4 + a_2a_5 + a_3a_6 = \rho_0^2 + \rho_0$, où $\rho_0 = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3$. Le corps $K_1 = K(\rho_1, \rho_2, \rho_3)$ est une extension de K de degré 2, 4 ou 8.

(i) Dans le premier cas, on a $\rho_2, \rho_3 \in K(\rho_1)$. Considérons séparément les deux formes quadratiques $Q'(x) = a_1\xi_1^2 + \xi_1\xi_4 + a_4\xi_4^2 + a_2\xi_2^2 + \xi_2\xi_5 + a_5\xi_5^2$,

$Q''(x) = a_1\xi_1^2 + \xi_1\xi_4 + a_4\xi_4^2 + a_3\xi_3^2 + \xi_3\xi_6 + a_6\xi_6^2$ et par le lemme 1 notons que $\mathcal{A}(Q') = a_1a_4 + a_2a_5 = \mathfrak{p}(d')$, $\mathcal{A}(Q'') = a_1a_4 + a_3a_6 = \mathfrak{p}(d'')$, $d', d'' \in K$. Quand on applique le lemme 8 à Q', Q'' , on a (en remarquant que les formules de transformation sont les mêmes pour les coordonnées d'indice 1 et 4)

$$Q(x) = a_1(\xi_1'^2 + \xi_1'\xi_4' + a_1a_4\xi_4'^2) + a_2(\xi_2'^2 + \xi_2'\xi_5' + a_1a_4\xi_5'^2) \\ + a_3(\xi_3'^2 + \xi_3'\xi_6' + a_1a_4\xi_6'^2),$$

on peut alors supposer que $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho$. Dans ce cas, $\mathcal{A}(Q) = \rho^2 + \rho$ n'est pas de la forme $\mathfrak{p}(b)$ dans K et $\rho_0 = \rho$. D'après le lemme 7, la forme quadratique est ramenée sur K_1 à la forme Q_1 telle que

$$(14) \quad Q_1(x) = a_1\{\xi_1' + \rho\xi_4'\}\{\xi_1' + (\rho+1)\xi_4'\} + a_2\{\xi_2' + \rho\xi_5'\}\{\xi_2' + (\rho+1)\xi_5'\} \\ + a_3\{\xi_3' + \rho\xi_6'\}\{\xi_3' + (\rho+1)\xi_6'\},$$

dont l'indice sur $K_1 = K(\rho)$ est égal à 3.

Lorsque le degré de $K_1 = K(\rho_1, \rho_2, \rho_3)$ sur K est égal à 4, on a deux possibilités suivant que les trois extensions $K(\rho_1), K(\rho_2), K(\rho_3)$ sont distinctes ou non. (ii) Si elles sont distinctes, puisque ρ_3 doit appartenir à $K(\rho_1, \rho_2)$ et que $\rho_3^2 + \rho_3 = a_3a_6$, selon le lemme 2, ρ_3 doit appartenir à $K(\rho_1 + \rho_2)$. Comme $(\rho_1 + \rho_2)^2 + (\rho_1 + \rho_2) = a_1a_4 + a_2a_5$, $\rho_1 + \rho_2$ tenant le rôle de ρ du lemme 1, $\mathcal{A}(Q)$ est de la forme $\mathfrak{p}(d)$. Par le même changement de variables qu'au lemme 8, $Q(x)$ se transforme en $Q(x) = a_1\{\xi_1'^2 + \xi_1'\xi_4' + a_1a_4\xi_4'^2\} + a_2\{\xi_2'^2 + \xi_2'\xi_5' + a_2a_5\xi_5'^2\} + a_3\{\xi_3'^2 + \xi_3'\xi_6' + (d^2 + d + a_3a_6)\xi_6'^2\}$. Comme $d^2 + d + a_3a_6 = a_1a_4 + a_2a_5 = (\rho_1 + \rho_2)^2 + (\rho_1 + \rho_2)$, on a $Q(x) = a_1\{\xi_1'^2 + \xi_1'\xi_4' + (\rho_1^2 + \rho_1)\xi_4'^2\} + a_2\{\xi_2'^2 + \xi_2'\xi_5' + (\rho_2^2 + \rho_2)\xi_5'^2\} + a_3\{\xi_3'^2 + \xi_3'\xi_6' + ((\rho_1 + \rho_2)^2 + (\rho_1 + \rho_2))\xi_6'^2\}$. Donc, on peut supposer que $\rho_3 = \rho_1 + \rho_2$ et $\mathcal{A}(Q) = 0$. En conséquence, la forme Q étendue à K_1 s'écrit

$$(15) \quad Q_1(x) = a_1\{\xi_1' + \rho_1\xi_4'\}\{\xi_1' + (\rho_1+1)\xi_4'\} + a_2\{\xi_2' + \rho_2\xi_5'\}\{\xi_2' + (\rho_2+1)\xi_5'\} \\ + a_3\{\xi_3' + (\rho_1 + \rho_2)\xi_6'\}\{\xi_3' + (\rho_1 + \rho_2 + 1)\xi_6'\}.$$

(iii) Si deux des trois corps $K(\rho_1), K(\rho_2), K(\rho_3)$ coïncident, par exemple, $K(\rho_1) = K(\rho_2)$, comme dans le cas (i) on peut supposer que $\rho_1 = \rho_2 = \rho$. ρ_3 n'appartient pas à $K(\rho)$ et $\mathcal{A}(Q) = \rho^2 + \rho_3$ n'est pas de la forme $\mathfrak{p}(b)$ dans K . En utilisant le lemme 7 et le lemme 8, la forme Q s'écrit sur K_1 sous la forme

$$(16) \quad Q_1(x) = a_1\{\xi_1' + \rho\xi_4'\}\{\xi_1' + (\rho+1)\xi_4'\} + a_2\{\xi_2' + \rho\xi_5'\}\{\xi_2' + (\rho+1)\xi_5'\} \\ + a_3\{\xi_3' + \rho_3\xi_6'\}\{\xi_3' + (\rho_3+1)\xi_6'\}.$$

L'indice de Q sur $K(\rho_0)$ est égal à 1 ou 3. Si cet indice est 3, il existe un sous-espace de dimension 3 dans E_0 (espace vectoriel obtenu en étendant K à $K(\rho_0)$) qui rencontre le sous-espace $\{\xi_3 = \xi_6 = 0\}$. Alors, la restriction de Q à ce sous-espace, $Q_0(x) = a_1\xi_1^2 + \xi_1\xi_4 + a_4\xi_4^2 + a_2\xi_2^2 + \xi_2\xi_5 + a_5\xi_5^2$

a l'indice 1 ou 2 sur $K(\rho_0)$. En changeant de base, on peut supposer, par exemple, que $a_1 a_4 = \beta^2 + \beta$, $\beta \in K(\rho_0)$; en appliquant le lemme 1, on a $4(Q) + a_1 a_4 = a_2 a_5 + a_3 a_6 = \wp(d)$ dans K . D'après le lemme 8, après le changement de base, on peut supposer que $\rho = \rho_3$, ceci est le cas (i). Par conséquent, dans le cas (iii) on ne traite que la forme Q d'indice 1 sur $K(\rho_0)$ et dans ce cas la forme Q_0 est d'indice 0 sur $K(\rho_0)$. Dans le cas où le degré de K_1 sur K est égal à 4, les raisonnements précédents prouvent que la condition que $K(\rho_1), K(\rho_2), K(\rho_3)$ sont distincts est équivalente à celle que $4(Q)$ est de la forme $\wp(b)$ dans K .

(iv) Lorsque le degré de K_1 sur K est égal à 8, ρ_i n'appartient pas à $K(\rho_j, \rho_k)$, $i \neq j, i \neq k, i, j, k = 1, 2, 3$, et $4(Q) = (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)^2 + (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)$ n'est pas de la forme $\wp(b)$ dans K . D'après le lemme 7 et le lemme 8, la forme s'écrit sur K_1

$$(17) \quad Q_1(x) = a_1 \{ \xi_1' + \rho_1 \xi_4' \} \{ \xi_1' + (\rho_1 + 1) \xi_4' \} + a_2 \{ \xi_2' + \rho_2 \xi_5' \} \{ \xi_2' + (\rho_2 + 1) \xi_5' \} \\ + a_3 \{ \xi_3' + \rho_3 \xi_6' \} \{ \xi_3' + (\rho_3 + 1) \xi_6' \} .$$

L'indice de Q sur $K(\rho_0)$ peut être égal à 0, 1, 2 ou 3. Comme dans le cas (iii), si cet indice est égal à 1, 2 ou 3, on peut trouver une base de E à laquelle au moins un de $a_1 a_4, a_2 a_5, a_3 a_6$, par exemple, $a_3 a_6$, est de la forme $\wp(\beta)$ dans $K(\rho_0)$. Par le lemme 1, on a $4(Q) + a_3 a_6 = a_1 a_4 + a_2 a_5 = \wp(d)$, $d \in K$. Par le lemme 8, en changeant de base, on peut supposer que $\rho_1 = \rho_2$, ce qui est examiné au cas (iii). Dans le cas (iv), on n'a donc à traiter que le cas où la forme Q est d'indice 0 sur $K(\rho_0)$.

7. Cas où le degré de K_1 sur K est égal à 2. Soient E un espace vectoriel de dimension 6 sur K et E_1 l'espace obtenu en étendant K à K_1 . Faisons le changement de coordonnées: $\eta_1 = a_1(\xi_1' + \rho \xi_4')$, $\eta_2 = a_2(\xi_2' + \rho \xi_5')$, $\eta_3 = a_3(\xi_3' + \rho \xi_6')$, $\eta_4 = \xi_1' + (\rho + 1) \xi_4'$, $\eta_5 = \xi_2' + (\rho + 1) \xi_5'$, $\eta_6 = \xi_3' + (\rho + 1) \xi_6'$. La forme (14) se transforme à la forme d'indice 3 sur E_1 telle que

$$Q_1(x) = \eta_1 \eta_4 + \eta_2 \eta_5 + \eta_3 \eta_6 .$$

Toute transformation du groupe $GO_6^+(Q)$ est la restriction à E d'une transformation de $GO_6^+(Q_1)$ qui permute avec la transformation semi-linéaire $w: (\xi_1', \dots, \xi_6') \rightarrow (\xi_1'^\sigma, \dots, \xi_6'^\sigma)$, où σ est l'automorphisme de K_1 sur K , distinct de l'identité. La transformation w est $(\eta_1, \dots, \eta_6) \rightarrow (a_1 \eta_4^\sigma, a_2 \eta_5^\sigma, a_3 \eta_6^\sigma, a_1^{-1} \eta_1^\sigma, a_2^{-1} \eta_2^\sigma, a_3^{-1} \eta_3^\sigma)$. De même que dans le cas de l'indice 1, nous considérons l'espace vectoriel F_1 de dimension 4 sur K_1 et l'espace des bivecteurs $F_1^{(2)}$ sur F_1 . Toute transformation u de $GO_6^+(Q_1)$ peut être écrite sous la forme $u = \mu v^{(2)}$, où μ est un élément de K_1^* et v appartient à $GL_4(F_1)$. D'autre part, prenons une corrélation involutive φ de F_1 sur F_1^* relative à l'automorphisme σ telle que $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_1^*, a_2 a_3 \varepsilon_2^*,$

$a_1 a_3 \varepsilon_3^*, a_1 a_2 \varepsilon_4^*$). L'application semi-linéaire $\varphi^{(2)}$ déduite de φ est une corrélation de $F_1^{(2)}$ sur $F_1^{(2)*}$ telle que $(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow (a_2 a_3 (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, a_1 a_3 (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, a_1 a_2 (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*, a_1^2 a_2 a_3 (\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, a_1 a_2^2 a_3 (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, a_1 a_2 a_3^2 (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*)$. Quand on désigne par ψ l'application canonique de $F_1^{(2)}$ sur $F_1^{(2)*}$ telle que $(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow ((\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*)$, on a alors $w = \psi^{-1}(a_1 a_2 a_3)^{-1} \varphi^{(2)}$. De la condition $wu = uw$, on tire $\psi^{-1} \varphi^{(2)} \mu v^{(2)} = \mu v^{(2)} \psi^{-1} \varphi^{(2)}$, et d'après le lemme 13 on a $\varphi v = \lambda \check{v} \varphi$, $|v| = \mu^{\sigma-1} \lambda^2$, $\lambda = \lambda^\sigma \in K$. On peut déterminer un élément μ dans K_1 satisfaisant à ces conditions, à un facteur près égal à un élément arbitraire γ de K^* . Si l'on pose $g(x, y) = \langle \varphi(x), y \rangle$, g est une forme hermitienne sur F_1 et v est une transformation appartenant au groupe $GU_4(F_1, g)$. Pour toute transformation v de $GU_4(F_1, g)$, l'application $v \rightarrow |v| \lambda^{-2}$ est une représentation de $GU_4(F_1, g)$ dans le groupe des éléments de norme 1 de K_1 . D'où, on peut déterminer complètement la correspondance entre la restriction à E d'une transformation de $GO_6^+(Q_1)$ et une transformation de $GU_4(F_1, g)$. On a alors l'isomorphisme $GO_6^+(Q) \simeq \Gamma / \{(\gamma^2, \gamma^{-1})\}$ où Γ est le sous-groupe de $K_1^* \times GU_4(F_1, g)$ formé des couples (μ, v) tels que $|v| = \mu^{\sigma-1} \lambda^2$, $\mu \in K_1^*$, $v \in GU_4(F_1, g)$ et où γ parcourt K^* .

8. Cas où le degré de K_1 sur K est égal à 4 et où $d(Q)$ est de la forme $\mathfrak{p}(b)$ dans K . Dans la forme quadratique (15), si l'on fait le changement de coordonnées tel que $\eta_1 = a_1(\xi_1' + \rho_1 \xi_4')$, $\eta_2 = a_2(\xi_2' + \rho_2 \xi_5')$, $\eta_3 = a_3\{\xi_3' + (\rho_1 + \rho_2) \xi_6'\}$, $\eta_4 = \xi_1' + (\rho_1 + 1) \xi_4'$, $\eta_5 = \xi_2' + (\rho_2 + 1) \xi_5'$, $\eta_6 = \xi_3' + (\rho_1 + \rho_2 + 1) \xi_6'$, on a la forme sur E_1 telle que

$$Q_1(x) = \eta_1 \eta_4 + \eta_2 \eta_5 + \eta_3 \eta_6 .$$

Soient σ_1, σ_2 les automorphismes de K_1 sur K distincts de l'identité, qui laissent invariants $K(\rho_2), K(\rho_1)$ respectivement. Toute transformation de $GO_6^+(Q)$ est la restriction à E d'une transformation de $GO_6^+(Q_1)$ qui permute avec les deux transformations semi-linéaires w_1, w_2 de E_1 telles que $w_1 : (\eta_1, \dots, \eta_6) \rightarrow (a_1 \eta_4^{\sigma_1}, \eta_2^{\sigma_1}, a_3 \eta_6^{\sigma_1}, a_1^{-1} \eta_1^{\sigma_1}, \eta_5^{\sigma_1}, a_3^{-1} \eta_3^{\sigma_1})$, et $w_2 : (\eta_1, \dots, \eta_6) \rightarrow (\eta_1^{\sigma_2}, a_2 \eta_5^{\sigma_2}, a_3 \eta_6^{\sigma_2}, \eta_4^{\sigma_2}, a_2^{-1} \eta_2^{\sigma_2}, a_3^{-1} \eta_3^{\sigma_2})$. Considérons deux collinéations θ_1, θ_2 sur F_1 relatives aux automorphismes σ_1, σ_2 telles que $\theta_1 : (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_3, a_3 \varepsilon_4, a_1 a_3 \varepsilon_1, a_1 \varepsilon_2)$, $\theta_2 : (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_2, a_2 a_3 \varepsilon_1, a_3 \varepsilon_4, a_2 \varepsilon_3)$. De la même manière qu'aux numéros précédents, on en tire aisément que $\theta_1^{(2)} : (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow (a_3(\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4), a_1 a_3(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3), a_1(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3), a_1^2 a_3(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2), a_1 a_3(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4), a_1 a_3^2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4))$, $\theta_2^{(2)} : (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow (a_2 a_3(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2), a_3(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4), a_2(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3), a_2 a_3(\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4), a_2^2 a_3(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3), a_2 a_3^2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4))$, et que $w_1 = (a_1 a_3)^{-1} \theta_1^{(2)}$, $w_2 = (a_2 a_3)^{-1} \theta_2^{(2)}$. Comme une transformation u de $GO_6^+(Q_1)$ s'écrit $u = \mu v^{(2)}$, $\mu \in K_1^*$, $v \in GL_4(F_1)$, les conditions $w_i u = u w_i$ sont remplacées par $(\theta_i v)^{(2)} = \mu^{1-\sigma_i} (v \theta_i)^{(2)}$, $i = 1, 2$. Comme $\theta_1^2(x) = a_1 a_3 x$, le lemme 11 prouve qu'on a

$u = \mu_1 t_1^{(2)}$, $\mu_1 \in K_1$, $t_1 \in GL_4(F_1)$ tel que $\mu_1^{\sigma_1} = \mu_1$, $t_1 \theta_1 = \theta_1 t_1$, $\mu = \mu_1 \beta_1^2$, $\beta_1 \in K_1$.

D'autre part, $a_1 a_3$ n'est pas de la forme $\zeta \zeta^{\sigma_1}$, $\zeta \in K_1 = K(\rho_1, \rho_2)$. En effect, si on avait $a_1 a_3 = \zeta \zeta^{\sigma_1}$, $\zeta \in K_1$, selon le lemme 3, on aurait $\zeta = \zeta_1 \zeta_3$, $\zeta_1 \in K(\rho_1)$, $\zeta_3 \in K(\rho_1 + \rho_2)$, d'où $a_1 a_3 = \zeta_1 \zeta_1^{\sigma_1} \zeta_3 \zeta_3^{\sigma_1}$. Si l'on pose $\frac{\zeta_3}{a_3} = \zeta_3'$ on a $\frac{a_1}{a_3} = \zeta_1 \zeta_1^{\sigma_1} \zeta_3' \zeta_3'^{\sigma_1}$. Par le changement de variables : $\xi_1' + \rho_1 \xi_4' = \zeta_1^{-1}$, $\xi_2' + \rho_2 \xi_5' = 0$, $\xi_3' + (\rho_1 + \rho_2) \xi_6' = \zeta_3'$, la forme quadratique Q deviendrait $Q(x) = a_1 \zeta_1^{-1} \zeta_1^{-\sigma_1} + a_3 \zeta_3' \zeta_3'^{\sigma_1} = 0$, pour un vecteur non nul, ce qui est contraire à l'hypothèse de l'indice 0. Appliquons la méthode générale. On peut définir l'extension quadratique L_1 de K_1 , avec les éléments de base 1, ω_1 , tels que $\omega_1^2 = a_1 a_3$, $\omega_1^{-1} \zeta \omega_1 = \zeta^{\sigma_1}$, $\zeta \in K_1$, (lemme 4). En prenant $\omega_1^{\sigma_2} = \omega_1$, on peut prolonger σ_2 en un antiautomorphisme sur L_1 . D'après le lemme 5, en posant $\theta_1(x) = x \omega_1$, l'espace vectoriel F_1 peut être considéré comme l'espace vectoriel F_1' de dimension 2 sur L_1 . Comme $\theta_2 \theta_1 = \theta_1 \theta_2$, pour $x' \in F_1'$, on a $\theta_2(x' \omega_1) = \theta_2 \theta_1(x') = \theta_1 \theta_2(x') = \theta_2(x') \omega_1 = \theta_2(x') \omega_1^{\sigma_2}$, θ_2 devient une collinéation sur F_1' , relative à l'automorphisme σ_2 de L_1 et t_1 , θ_1 deviennent des transformations de $GL_2(F_1')$.

Montrons ensuite que $a_2 a_3$ n'est pas de la forme $\zeta \zeta^{\sigma_2}$, $\zeta \in L_1$. Supposons que $a_2 a_3 = \zeta \zeta^{\sigma_2}$ pour un élément $\zeta = \alpha \omega_1 + \beta$, $\alpha, \beta \in K_1 = K(\rho_1, \rho_2)$, alors cette relation donne $a_2 a_3 = (\alpha \omega_1 + \beta)(\alpha^{\sigma_2} \omega_1^{\sigma_2} + \beta^{\sigma_2}) = \alpha \omega_1 \alpha^{\sigma_2} \omega_1 + \alpha \omega_1 \beta^{\sigma_2} + \beta \alpha^{\sigma_2} \omega_1 + \beta \beta^{\sigma_2} = \alpha \alpha^{\sigma_1 \sigma_2} \omega_1^2 + \alpha \beta^{\sigma_1 \sigma_2} \omega_1 + \beta \alpha^{\sigma_2} \omega_1 + \beta \beta^{\sigma_2} = a_1 a_3 \alpha \alpha^{\sigma_1 \sigma_2} + \beta \beta^{\sigma_2} + (\alpha \beta^{\sigma_1 \sigma_2} + \beta \alpha^{\sigma_2}) \omega_1 = 0$, donc

$$(18) \quad a_2 a_3 + a_1 a_3 \alpha \alpha^{\sigma_1 \sigma_2} + \beta \beta^{\sigma_2} = 0,$$

$$(19) \quad \alpha \beta^{\sigma_1 \sigma_2} + \beta \alpha^{\sigma_2} = 0.$$

Si $\beta = 0$, de la formule (18), on aurait $\frac{a_2}{a_1} = \alpha \alpha^{\sigma_1 \sigma_2}$, d'où $a_1 a_2 = (a_1 \alpha)(a_1 \alpha)^{\sigma_1 \sigma_2}$, $a_1 \alpha \in K(\rho_1, \rho_2)$, ce qui ne peut pas se produire, par le lemme 9. Supposons donc $\beta \neq 0$. La formule (19) entraîne $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha^{\sigma_2}}{\beta^{\sigma_1 \sigma_2}} = \left(\frac{\alpha}{\beta^{\sigma_1}}\right)^{\sigma_2}$. Si l'on pose $\frac{\alpha}{\beta^{\sigma_1}} = \eta$, on a $\eta \beta^{\sigma_1} = \eta^{\sigma_2} \beta$. En le posant dans (18), on a $a_2 a_3 = a_1 a_3 \eta \beta^{\sigma_1} \eta^{\sigma_1 \sigma_2} \beta^{\sigma_2} + \beta \beta^{\sigma_2} = a_1 a_3 \eta^{\sigma_2} \beta \eta^{\sigma_1 \sigma_2} \beta^{\sigma_2} + \beta \beta^{\sigma_2}$, donc

$$(20) \quad a_2 a_3 = \beta \beta^{\sigma_2} (a_1 a_3 \eta^{\sigma_2} \eta^{\sigma_1 \sigma_2} + 1).$$

Comme $(\eta^{\sigma_2})(\eta^{\sigma_2})^{\sigma_1} \in K(\rho_2)$, $\beta \beta^{\sigma_2} \in K(\rho_1)$, $a_2 a_3 \in K$, la formule (20) entraîne que $\eta^{\sigma_2} \eta^{\sigma_1 \sigma_2}$ et $\beta \beta^{\sigma_2}$ doivent appartenir à K . Du lemme 3, il résulte qu'il existe des éléments η_1, η_3 tels que $\eta^{\sigma_2} = \eta_1 \eta_3^{-1}$, $\eta_1 \in K(\rho_1)$, $\eta_3 \in K(\rho_1 + \rho_2)$ et qu'il existe des éléments η_2, η_3' tels que $\beta = \eta_2^{-1} \eta_3'$, $\eta_2 \in K(\rho_2)$, $\eta_3' \in K(\rho_1 + \rho_2)$. Si l'on applique σ_2 à $\eta^{\sigma_2} = \eta_1 \eta_3^{-1}$, on a $\eta = \eta_1 \eta_3^{-\sigma_2}$. La relation $\eta \beta^{\sigma_1} = \eta^{\sigma_2} \beta$ donne alors $\eta_1 \eta_3^{-\sigma_2} \eta_2^{-\sigma_1} \eta_3'^{\sigma_1} = \eta_1 \eta_3^{-1} \eta_2^{-1} \eta_3'$, $\eta_3^{-\sigma_2} \eta_3'^{\sigma_1} = \eta_3^{-1} \eta_3'$, et

$\eta_3\eta_3^{\sigma_1} = \eta_3'\eta_3^{\sigma_2}$. Lorsqu'on pose $\eta_3 = a(\rho_1 + \rho_2) + b$, $\eta_3' = a'(\rho_1 + \rho_2) + b'$, $a, b, a', b' \in K$, on a $\{a(\rho_1 + \rho_2) + b\} \{a'(\rho_1 + \rho_2) + b' + a'\} = \{a'(\rho_1 + \rho_2) + b'\} \{a(\rho_1 + \rho_2) + b + a\}$, donc $ba' = b'a$. Par suite, on a $a\eta_3' = a\{a'(\rho_1 + \rho_2) + b'\} = aa'(\rho_1 + \rho_2) + ab' = aa'(\rho_1 + \rho_2) + ba' = a'\{a(\rho_1 + \rho_2) + b\} = a'\eta_3$. La relation (20) entraîne donc $a_2a_3 = \eta_2^{-1}\eta_3'\eta_2^{-\sigma_2}\eta_3^{\sigma_2} \{a_1a_3\eta_1\eta_3^{-1}\eta_1^{\sigma_1}\eta_3^{-\sigma_1} + 1\}$, $a^2a_2a_3\eta_2\eta_2^{\sigma_2} = (a\eta_3')(a\eta_3')^{\sigma_2} \{a_1a_3\eta_1\eta_1^{\sigma_1}\eta_3^{-1}\eta_3^{-\sigma_1} + 1\}$, $a^2a_2a_3\eta_2\eta_2^{\sigma_2} = a'^2a_1a_3\eta_1\eta_1^{\sigma_1} + a'^2\eta_3\eta_3^{\sigma_2}$. D'où on a finalement

$$a_1(a'a_3\eta_1)(a'a_3\eta_1)^{\sigma_1} + a_2(aa_3\eta_2)(aa_3\eta_2)^{\sigma_2} + a_3(a'\eta_3)(a'\eta_3)^{\sigma_2} = 0.$$

En prenant $\xi_1' + \rho_1\xi_4' = a'a_3\eta_1$, $\xi_2' + \rho_2\xi_5' = aa_3\eta_2$, $\xi_3' + (\rho_1 + \rho_2)\xi_6' = a'\eta_3$, la forme quadratique Q serait égale à 0 pour un vecteur non nul, contrairement à l'hypothèse de l'indice 0.

On peut donc former l'extension quadratique L_2 de L_1 ayant pour base les éléments 1, ω_2 tels que $a_2a_3 = \omega_2^2$, $\omega_2^{-1}\zeta\omega_2 = \zeta^{\sigma_2}$, $\zeta \in L_1$, (lemme 4). Comme $\theta_2^2(x) = a_2a_3x$, l'espace vectoriel F_1' de dimension 2 sur L_1 peut être considéré comme un espace vectoriel de dimension 1 sur L_2 , avec $\theta_2(x) = x\omega_2$, (lemme 5), autrement dit, l'espace F_1' peut être identifié au corps L_2 . Pour $u = \mu_1t_1^{(2)}$, $\mu_1^{\sigma_1} = \mu_1 \in K(\rho_2)$, les relations $\theta_2^2(x) = a_2a_3x$, $u\theta_2^{\sigma_2} = \theta_2^{\sigma_2}u$ donnent $u = \mu_2t_2^{(2)}$ tel que $\mu_2^{\sigma_2} = \mu_2$, $\mu_1 = \mu_2\beta_2^2$, $t_2\theta_2 = \theta_2t_2$, et donc $\mu_2 = \beta_1^{-2}\beta_2^{-2}\mu \in K$, (lemme 11). Pour un élément $\xi + \omega_2\eta$ de L_2 on a $t_2(\xi + \omega_2\eta) = t_2(1)\xi + t_2\theta_2(1)\eta = t_2(1)\xi + \theta_2t_2(1)\eta = t_2(1)\xi + t_2(1)\omega_2\eta = t_2(1)(\xi + \omega_2\eta)$, cela signifie que t_2 est une homothétie du corps L_2 . Comme à la fin du n°4, on conclut que $GO_6^+(Q) \simeq \frac{K^* \times L_2^*}{\{(\gamma^2, \gamma^{-1})\}}$ où γ parcourt K^* .

9. Cas où le degré de K_1 de K est égal à 4 et où $4(Q)$ n'est pas de la forme $\mathfrak{p}(b)$ dans K . Notons d'abord que la forme Q se transforme sur $K_1 = K(\rho, \rho_3)$ en la forme (16), donc $Q_1(x) = \eta_1\eta_4 + \eta_2\eta_5 + \eta_3\eta_6$ et que la forme $a_1\xi_1^2 + \xi_1\xi_4 + a_4\xi_4^2 + a_2\xi_2^2 + \xi_2\xi_5 + a_5\xi_5^2$ est d'indice 0 sur le corps $K_0 = K(\rho_0)$, $\rho_0 = \rho_3$.

Comme dans les cas précédents, on peut considérer que toute transformation u de $GO_6^+(Q)$ doit permuter avec les transformations $w : (\eta_1, \dots, \eta_6) \rightarrow (a_1\eta_4^\sigma, a_2\eta_5^\sigma, \eta_3^\sigma, a_1^{-1}\eta_1^\sigma, a_2^{-1}\eta_2^\sigma, \eta_6^\sigma)$, $w' : (\eta_1, \dots, \eta_6) \rightarrow (\eta_1^\tau, \eta_2^\tau, a_3\eta_6^\tau, \eta_4^\tau, \eta_5^\tau, a_3^{-1}\eta_3^\tau)$, où σ, τ sont des automorphismes de K_1 sur K , distincts de l'identité, qui laissent invariants $K(\rho_3)$, $K(\rho)$ respectivement. D'après la méthode du n°5, prenons la collinéation θ de F_1 sur lui-même telle que $\theta : (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_4, a_2\varepsilon_3, a_1\varepsilon_2, a_1a_2\varepsilon_1)$ relative à σ et la corrélation φ de F_1 sur F_1^* telle que $\varphi : (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_4^*, a_3\varepsilon_3^*, a_3\varepsilon_2^*, \varepsilon_1^*)$ relative à τ . Alors sur $F_1^{(2)}$, $\theta^{(2)}$ est la collinéation : $(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow (a_2(\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4), a_1(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4), a_1a_2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4), a_1^2a_2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2), a_1a_2^2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3), a_1a_2(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3))$ et $\varphi^{(2)}$ est la corrélation : $(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow (a_3(\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, a_3(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*, a_3(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*,$

$a_3(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, a_3^2(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*$). On en déduit que $w=(a_1a_2)^{-1}\theta^{(2)}$ et $w'=\psi^{-1}a_3^{-1}\varphi^{(2)}$, où ψ est l'application canonique de $F_1^{(2)}$ sur $F_1^{(2)*}$ telle que $(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow ((\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*)$. En considérant $K_1=K_0(\rho)$ et en appliquant le lemme 9 (i) à la forme $a_1\xi_1^2 + \xi_1\xi_4 + a_4\xi_4^2 + a_2\xi_2^2 + \xi_2\xi_5 + a_5\xi_5^2$, on peut montrer que a_1a_2 n'est pas de la forme $\zeta\zeta^\sigma$ dans K_1 . On considère l'extension quadratique K_2 de K_1 ayant 1 et ω comme base telle que $\omega^2=a_1a_2$, $\omega^{-1}\zeta\omega=\zeta^\sigma$, $\zeta \in K_1$. Désignons par τ' l'antiautomorphisme de K_2 prolongeant τ tel que $\omega^{\tau'}=\omega$, (lemme 6). Le corps K_2 est alors un corps des quaternions généralisés sur K_0 , qui correspond au couple (a_1a_4, a_1a_2) tel que $\rho^2+\rho=a_1a_4$, $\omega^2=a_1a_2$, $\omega^{-1}\rho\omega=\rho+1$.

La condition $uw=wu$ donne $u\theta^{(2)}=\theta^{(2)}u$ et comme $\theta^2(x)=a_1a_2x$, pour $u=\mu v^{(2)}$ cette condition entraîne que $u=\mu_0t^{(2)}$, $t\theta=\theta t$, $\mu_0=\mu_0^\sigma \in K_0$, $\mu=\mu_0\beta^2$, $\beta \in K_1$, où $t \in GL_4(F_1)$, (lemme 11). Pour $u=\mu_0t^{(2)}$ la condition $uw'=w'u$ donne $\mu_0t^{(2)}\psi^{-1}\varphi^{(2)}=\psi^{-1}\varphi^{(2)}\mu_0t^{(2)}$, d'où on a $\varphi t=\lambda_0t\varphi$, $|t|=\mu_0^{\tau-1}\lambda_0^2$, (lemme 13). D'autre part, en vertu de la correspondance entre une forme sesquilinéaire g sur F_2 de dimension 2 (l'espace F_1 considéré comme un espace vectoriel sur K_2) et la forme g_1 définie par φ sur F_1 de dimension 4, telle que $g(x, y)=g_1(x, y)+\omega(a_1a_2)^{-1}g_1(\theta(x), y)$, g est une forme hermitienne, comme on a vu aux cas précédents. On a alors $t \in GU_2(F_2, g)$. Comme $\varphi\theta=a_1a_2\varphi$, $\varphi t=\lambda_0t\varphi$ implique $\lambda_0=\lambda_0^\tau \in K(\rho)$, (lemme 12 (i)), et de plus $t\theta=\theta t$ entraîne $\lambda_0=\lambda_0^\sigma \in K$, (lemme 12 (ii)). D'où on établit l'isomorphisme $GO_6^+(Q) \simeq \Gamma / \{(\gamma^2, \gamma^{-1})\}$, où Γ est le sous-groupe de $K_0 \times GU_2(F_2, g)$ formé des couples (μ_0, t) tels que $|t|=\mu_0^{\tau-1}\lambda_0^2$, $\mu_0 \in K_0$, $t \in GU_2(F_2, g)$ et où γ parcourt K^* .

10. Cas où le degré de K_1 sur K est égal à 8. Par le changement de coordonnées : $\eta_1=a_1(\xi_1'+\rho_1\xi_4')$, $\eta_2=a_2(\xi_2'+\rho_2\xi_5')$, $\eta_3=a_3(\xi_3'+\rho_3\xi_6')$, $\eta_4=\xi_1'+(\rho_1+1)\xi_4'$, $\eta_5=\xi_2'+(\rho_2+1)\xi_5'$, $\eta_6=\xi_3'+(\rho_3+1)\xi_6'$, la forme quadratique (17) se réduit sur E_1 à la forme

$$Q_1(x) = \eta_1\eta_4 + \eta_2\eta_5 + \eta_3\eta_6.$$

Soit σ_i , $i=1, 2, 3$, l'automorphisme de K_1 sur K qui laisse invariant ρ_j , ρ_k , $j \neq i$, $k \neq i$, $j, k=1, 2, 3$ et qui transforme ρ_i en ρ_i+1 . Toute transformation de $GO_6^+(Q)$ est la restriction à E d'une transformation u de $GO_6^+(Q_1)$, qui permute avec les transformations semi-linéaires $w_i : (\xi_1', \dots, \xi_6') \rightarrow (\xi_1'^{\sigma_i}, \dots, \xi_6'^{\sigma_i})$, $i=1, 2, 3$. Considérons les trois corrélations involutives φ_i de F_1 and F_1^* , relatives aux automorphismes σ_i , $i=1, 2, 3$, définies par $\varphi_1 : (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_2^*, \varepsilon_1^*, a_1\varepsilon_4^*, a_1\varepsilon_3^*)$, $\varphi_2 : (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_3^*, a_2\varepsilon_4^*, \varepsilon_1^*, a_2\varepsilon_2^*)$, $\varphi_3 : (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4) \rightarrow (\varepsilon_4^*, a_3\varepsilon_3^*, a_3\varepsilon_2^*, \varepsilon_1^*)$. Les corrélations $\varphi_i^{(2)}$ de $F_1^{(2)}$ sur $F_1^{(2)*}$ sont données par

$$\begin{aligned} \varphi_1^{(2)} : (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) &\rightarrow \\ &((\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, a_1(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, a_1(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*, a_1^2(\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, a_1(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, a_1(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*) \\ \varphi_2^{(2)} : (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) &\rightarrow \\ &(a_2(\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, a_2(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*, a_2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, a_2^2(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, a_2(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*) \\ \varphi_3^{(2)} : (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) &\rightarrow \\ &(a_3(\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, a_3(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*, a_3(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, a_3(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, a_3^2(\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*). \end{aligned}$$

On constate alors que $w_i = \psi^{-1} a_i^{-1} \varphi_i^{(2)}$, $i=1, 2, 3$ où ψ est l'application canonique de $F_1^{(2)}$ sur $F_1^{(2)*}$ telle que $(\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3) \rightarrow ((\varepsilon_3 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_4)^*, (\varepsilon_2 \wedge \varepsilon_3)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_2)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_3)^*, (\varepsilon_1 \wedge \varepsilon_4)^*)$. Pour que $w_i u = u w_i$ avec $u = \mu v^{(2)}$, $\mu \in K_1^*$, $v \in GL_4(F_1)$, il faut et il suffit que v permute projectivement avec φ_i , $i=1, 2, 3$, (lemme 13). Si l'on considère les collinéations involutives $\theta_1 = a_3 \varphi_3^{-1} \varphi_2$, $\theta_3 = a_1 \varphi_1^{-1} \varphi_2$, relatives à $\tau_1 = \sigma_2 \sigma_3$ et $\tau_3 = \sigma_1 \sigma_2$, v doit aussi permuer projectivement avec elles. Comme on a vu au $n^\circ 4$, on a $\theta_1^2 = a_2 a_3$, $\theta_3^2 = a_1 a_2$, $\theta_1 \theta_3 = \theta_3 \theta_1$, $\varphi_2 \theta_1 = a_2 a_3 \overset{\vee}{\theta}_1 \varphi_2$, $\varphi_2 \theta_3 = a_1 a_2 \overset{\vee}{\theta}_3 \varphi_2$. Notons que $K_1 = K(\rho_0)(\rho_2, \rho_3) = K_0(\rho_2, \rho_3)$ où $\rho_0 = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3$, que l'automorphisme τ_1 laisse invariant K_0 et que la forme Q est d'indice 0 sur K_0 . Le lemme 9 (ii) montre que $a_2 a_3$ n'est pas de la forme $\zeta \zeta^{\tau_1}$, $\zeta \in K_1 = K_0(\rho_2, \rho_3)$. Formons alors l'extension quadratique L_1 de K_1 ayant pour base les éléments $1, \omega_1$ tels que $\omega_1^2 = a_2 a_3$, $\omega_1^{-1} \zeta \omega_1 = \zeta^{\tau_1}$ pour $\zeta \in K_1$, (lemme 4). En posant $\omega_2^{\tau_2} = \omega_1$ l'automorphisme σ_2 peut être prolongé en un antiautomorphisme σ_2' de L_1 , (lemme 6) et τ_3 en un automorphisme τ_3' de L_1 en posant $\omega_1^{\tau_3'} = \omega_1$. D'une façon générale, l'espace vectoriel F_1 de dimension 4 peut être considéré comme un espace vectoriel F_1' de dimension 2 sur L_1 , (lemme 5). Désignons par φ' la corrélation de F_1' sur $F_1'^*$ correspondant à φ_2 , relative à l'antiautomorphisme σ_2' . Soient g_2, g' les formes sesquilinéaires sur F_1, F_1' définies par φ_2, φ' . D'après le lemme 10, la corrélation φ' correspond à la forme g' telle que $g'(x, y) = g_2(x, y) + \omega_1 (a_2 a_3)^{-1} g_2(\theta_1(x), y)$. Lorsque l'on considère θ_3 comme une collinéation sur F_1' , la condition $\varphi_2 \theta_3 = a_1 a_2 \overset{\vee}{\theta}_3 \varphi_2$ entraîne $\varphi' \theta_3 = a_1 a_2 \overset{\vee}{\theta}_3 \varphi'$. Les conditions $w_2 u = u w_2$, $w_3 u = u w_3$ donnent $\theta_1^{(2)} u = u \theta_1^{(2)}$ et, pour $u = \mu v^{(2)}$, le lemme 11 montre que $t_1 \theta_1 = \theta_1 t_1$ où $u = \mu_1 t_1^{(2)}$, $t_1 \in GL_2(F_1')$. La condition $w_2 u = u w_2$ entraîne $u \psi^{-1} \varphi'^{(2)} = \psi^{-1} \varphi'^{(2)} u$ et pour $u = \mu_1 t_1^{(2)}$ le lemme 13 donne $\varphi' t_1 = \lambda_0 \overset{\vee}{t}_1 \varphi'$. Faisant jouer par K_0 le rôle de K dans le $n^\circ 8$ et considérant $L_1 = K_0(\rho_2, \rho_3, \omega_1)$, on peut montrer que $a_1 a_2$ n'est pas de la forme $\zeta \zeta^{\tau_3}$, $\zeta \in L_1$. On forme encore l'extension quadratique L_2 de L_1 ayant pour base les éléments $1, \omega_2$ tels que $\omega_2^2 = a_1 a_2$, $\omega_2^{-1} \zeta \omega_2 = \zeta^{\tau_3}$ pour $\zeta \in L_1$. Si l'on identifie deux éléments $1, \omega_2$ aux éléments de base de F_1' , on considère L_2 comme l'espace vectoriel F_1' . En posant $\omega_2^{\tau_3'} = \omega_2$, on prolonge τ_3' en un automorphisme de L_2 . D'autre part, la corrélation φ'

correspond à la corrélation φ de l'espace $F_1'' = L_2$ sur $F_1''^*$, qui définit la forme bilinéaire g sur L_2 telle que

$$g(x, y) = g'(x, y) + \omega_2(a_1 a_2)^{-1} g'(\theta_3(x), y) = (a_1 a_2 a_3)^{-1} x_2^{\sigma_2''} \omega_2 \omega_1 y,$$

où σ_2'' est l'antiautomorphisme σ_2' prolongé en posant $\omega_2^{\sigma_2''} = \omega_2$. Comme ${}^t\varphi_2 = \varphi_2$, la forme g_1 sur F_1 est hermitienne, alors g' l'est aussi et donc g est une forme hermitienne. Les conditions $w_1 u = u w_1$, $w_2 u = u w_2$ donnent $\theta_3^{(2)} u = u \theta_3^{(2)}$ et donc, pour $u = \mu_1 t_1^{(2)}$, le lemme 11 prouve que $t_3 \theta_3 = \theta_3 t_3$, $u = \mu_0 t_3^{(2)}$. D'autre part, $w_2 u = u w_2$ implique pour $u = \mu_0 t_3^{(2)}$, $\varphi'' t_3 = \lambda'' t_3 \varphi''$, (lemme 13). Comme $\theta_3^2(x) = a_1 a_2 x$, $\varphi_2 \theta_3 = a_1 a_2 \varphi_2$, d'après le lemme 12 (i) λ'' appartient au centre de L_2 et d'après le lemme 12 (ii) λ'' est un élément de K . Notons que t_3 est une homothétie dans L_2 et posons $t_3(\zeta) = t \zeta$, $t, \zeta \in L_2$, par le même raisonnement qu'à la fin du n° 8. On a alors $t^{\sigma_3} \omega_2 \omega_1 t = \lambda'' \omega_2 \omega_1$. En effet, $\varphi'' t_3 (1 \omega_2 \omega_1) = \varphi'' (1 t_3 \omega_2 \omega_1) = \varphi'' (1) t_3^{\sigma_3} \omega_2^{\sigma_3} \omega_1^{\sigma_3} = \varphi'' (1) t_3^{\sigma_3} \omega_2 \omega_1$ et $\lambda'' t_3 \varphi'' (1 \omega_2 \omega_1) = \lambda'' t_3 (\varphi'' (1) \omega_2^{\sigma_3} \omega_1^{\sigma_3}) = \lambda'' \varphi'' (1) \omega_2 \omega_1 t^{-1}$. Toute transformation u peut alors être écrite $u = \mu_0 t_3^{(2)}$ avec $t_3 \in GU_1(L_2, g)$. Inversement, si t_3 est un élément de $GU_1(L_2, g)$, on a $\varphi'' t_3 = \lambda' t_3 \varphi''$, $\lambda' \in K$, et $\varphi_2 t_3 = \lambda' t_3 \varphi_2$. Les conditions $t_3 \theta_1 = \theta_1 t_3$, $t_3 \theta_3 = \theta_3 t_3$ donnent $\varphi_1 t_3 = \lambda' t_3 \varphi_1$, $\varphi_3 t_3 = \lambda' t_3 \varphi_3$. Appliquons la méthode exposée à la fin du n° 5. La condition que $u = \mu_0 t_3^{(2)}$ appartient à $GO_6^+(Q)$ est équivalente à celle que $\mu_0^{\sigma_i} i^{-1}$ est égal à $|t_3| \lambda'^{-2}$ pour chaque $i = 1, 2, 3$, cette relation est obtenue par le lemme 13 appliqué à chaque $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$. Comme μ_0 est invariant par deux des automorphismes σ_i , $i = 1, 2, 3$, μ_0 est un élément de $K_0 = K(\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)$. On a $|t_3| |t_3|^{\sigma_i} = \lambda'^4$ pour chaque $i = 1, 2, 3$, donc $|t_3| \in K_0$. Si l'on choisit un élément $\beta' \in K_0$ tel que $\beta'^{\sigma_1} \lambda'^2 = |t_3|$, pour un élément arbitraire γ de K , on a de même $|t_3| = \mu_0^{\sigma_1} i^{-1} \lambda'^2 = \beta'^{\sigma_1} \lambda'^2$. En résumant ce qui précède, on constate que $GO_6^+(Q) \simeq \Gamma / \{(\gamma^2, \gamma^{-1})\}$, où Γ est le sous-groupe de $K_0^* \times GU_1(L_2, g)$ formé des couples (μ_0, t_3) tels que $|t_3| = \mu_0^{\sigma_1} i^{-1} \lambda'^2$ et où γ parcourt K^* .

(Reçu le 22 Septembre, 1958)

Références

[1] J. Dieudonné : La géométrie des groupes classiques.
 [2] B. L. van der Waerden : Gruppen von linearen Transformationen.
 [3] J. Dieudonné : Les extensions quadratiques des corps non commutatifs et leurs applications, Acta Math. 87 (1952).