OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	Algebroid function ニ就テ （Ⅱ）
Author(s)	吉田, 耕作
Citation	全国紙上数学談話会. 1934, 10, p. d-e
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/73867
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

30. Algebroid function の就て (II)

吉田耕作 (阪大)

本大号に於ける計算を少しく modify すれば

$$\begin{cases} (q-\nu-\lambda-1)T(r)+W(r) \leqq \sum_{i=1}^{q} N(r, a_i)+S(r) \\ W(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} w(g_1(x),\cdots,g_\rho(x))\,d\theta \end{cases}$$

$x=re^{i\theta}$

が得られることを示す。ここで Cartan の予想に違いないが本大号に述べた Valiron, Cartan, Selberg-Valiron-Ullrich 等の結果を含む。$W(r)$ の計算を今少しくなしうれば Cartan の予想が得られるかもしれない。何れにしても入 effect が左辺に丈け十分大きく表われるであろうと想像する。

証明 [以下 p.* の附した本大号の p.* を引用することにする]

p. 5, 16–20 行により

$$(\alpha)\quad \begin{cases} W(r)+\sum_{i=\rho}^{\lambda-1} Q(i) \leqq \sum_{i=1}^{q} N(r, a_i)+S(r) \\ Q(i)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|f(x, a_{\alpha_i})|\,d\theta \end{cases}$$

$x=re^{i\theta}$

p. 5 の (6) により $Q(i)=T(r)+O(1)$, $i\geq\nu+1$ であるから

$$(\beta)\quad \sum_{i=\rho}^{\lambda-1} Q(i)=\sum_{i=\rho}^{\nu} Q(i)+(q-\nu-1)T(r)+O(1)$$

及び

$$(\gamma)\quad \sum_{i=\nu+1}^{q} Q(i)=(q-\nu)T(r)+O(1).$$

然るに Jensen の公式 により $\sum_{i=1}^{q} Q(i) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sum_{i=1}^{q} \log|f(x,a_i)|\,d\theta$ $(x=re^{i\theta})$ $\in$.

$= \sum_{i=1}^{q} N(r,a_i) + O(1)$. これ (γ) と組合せて

$$\sum_{i=1}^{\nu} Q(i) = \sum_{i=1}^{q} N(r,a_i) - (q-\nu)T(r) + O(1).$$

故 = 第3章 (1) を用いて

(δ) $\quad \sum_{i=1}^{\nu} Q(i) \geqq -\nu T(r) + S(r)$.

所が定義により $Q(1) \leqq Q(2) \leqq \cdots$ だから

$$\sum_{i=\beta}^{\nu} Q(i) \geqq \frac{\nu-(\beta-1)}{\nu} \sum_{i=1}^{\nu} Q(i) = \frac{\lambda}{\nu} \sum_{i=1}^{\nu} Q(i)$$

これと (δ) とから

(ε) $\quad \sum_{i=1}^{\nu} Q(i) \geqq -\lambda T(r) + S(r)$

(β) と (ε) とにより

$$\sum_{i=\beta}^{q-\lambda} Q(i) \geqq (q-\nu-\lambda-1)T(r) + S(r)$$

これと (α) とから

$$W(r) + (q-\nu-\lambda-1)T(r) \leqq \sum_{i=1}^{q} N(r,a_i) + S(r)$$

~~尚ほ最後の注意は本論文にそのまゝ当はまります。~~