OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	箱數方程式　f k(x)＝F(x) ニ就イテ
Author(s)	南雲, 道夫
Citation	全国紙上数学談話会. 1935, 63, p. 11-17
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/74161
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

239. 函數方程式 $f^{k}(x)=F(x)$ ニ就テ

南雲道夫（阪大）

I 福原氏が注意サレタ如ク（紙上談話會61号222）Schröder ノ方程式ト同等ナ〔$F(x)$ヲ既知 χ ヲ未知函數トスル〕方程式

(1) $\chi F \chi^{-1}(x) = cx$

ヲ解ケバ，$\lambda^{k}=c$ ナル λ ニツイテ

(2) $f(x) = \chi^{-1}(\lambda \chi(x))$

ト置ケバ

(3) $f^{k}(x) = F(x)$

トナル。$\left[f^{k}(x) = \underbrace{f(f(\cdots(f}_{k\text{回}}(x))\cdots\cdots)) \right]$

故ニ $F(x)$ ガ増加ノトキハ $c>0$，減少ノ時ハ $c<0$ トシテ(1)ヲ解ケバ，(2)ニヨツテ(3)ノ解ガ與ヘラレル。

今特ニ $F(0)=0$，$x=0$ デ $F(x)$ ガ正則、且ツ

$$F'(0)\neq 0 \qquad |F'(0)|\neq 1$$

ナル場合ニハ (1) ハ正則ナ解 $\chi(x)$〔$\chi(0)=0$〕ヲ持ツ.
〔福原氏常微分方程式論（岩波講座）195頁——197頁参照〕

従ッテふらんす式ノ *en général* ニハ $F(x)$ が増減シ、イヅレノ場合ニモ問題が解ケタト言ヘバ言ヘナイコトハナイ。

2 次ニ問題トナルノハ，"$F(x)$ が $x=0$ ノ近傍デ純単調連続ナルトキ (1) が解ケルカドウカ？ 又 (1) が解ケナクトモ他ノ方法デ (3) が解ケルカドウカ？" デアル。

一体此ノ種ノ問題ノ基本的ナ考ヘノヘーツハ，——既ニ福原君が強調サレタ如ク（59号209）——変換トイフコト，即チ

$$\chi f \chi^{-1} = g$$

トスレバ

$$\chi f^n \chi^{-1} = g^n$$

（或ハ $\chi f_i \chi^{-1} = g_i$ トスレバ，$\chi f_1 f_2 \chi^{-1} = g_1 g_2$ 等）が成立スルコトデアル。ソコデ我々ハ先ヅ "如何ナル場合ニ $f(x)$ ヲバ $g(x)$ ニ変換スルヤウナ χ が存在スルカ？" ヲ論ズベキデアル。

此処デハ常ニ純単調連続函数ノミヲ考ヘル。（ソレハ位相幾何学的寫像トシテ考ヘテレルカラデアル。）

(i) 先ヅ $\chi f \chi^{-1} = g$

ニ於テ
- f が増加ナラバ，g モ増加函数
- f が減少ナラバ，g モ減少函数

ナレコトハ明ラカデアル。（χ ハ増加デモ減少デモカマハナイ）

(ii) 次ニ $f(x)$ ノ不動点〔$f(\xi)=\xi$ ナルヲノコト〕ハ $g(x)$ ノ不動点ニ変換サレル（証明容易）. 従ッテ $f(x)$ ニ於ケル不動点ヲ含マヌ区間ハ，$g(x)$ ニ於ケル不動点ヲ含マヌ区間ニ変換サレル（可逆的ニ）. 不動点ヲ含マヌ区間ヲ假ニ〝自由ナ区間〟ト名付ケル。

(iii) (α,β) ヲ $f(x)$ ガ不動点ヲ含マヌ区間トシ，(γ,δ) ヲ之レニ對スル $g(x)$ ノ不動点ヲ含マナイ区間トスレバ

(α,β) デ $f(x)>x$ ナラバ，(γ,δ) デ $g(x)>x$.

〃 $f(x)<x$ ナラバ，〃 $g(x)<x$.

（証明ニハ χf ト $g\chi$ トノ大小ヲ比較セヨ）

3 $f(x)$ ガ〔従ッテ $g(x)$ モ〕純増加ノ場合：

$f(x)$ ノ不動点ノ分布ハ任意ニ複雑ニナリ得ル（勿論閉集合）.

$f(x)$ ガ $g(x)$ ニ変換サレ得ルタメニハ先ヅ $f(x)$ ノ不動点ノ分布ト $g(x)$ ノ不動点ノ分布トガ *topologisch* ニ同型ナルヲ要スル。

次ニ $f(x)$ ト $g(x)$ トノ相對應スル自由ナ区間ニ於テハ

$f(x)>x$ ナラバ $g(x)>x$,

$f(x)<x$ ナラバ $g(x)<x$.

デナケレバナラヌ。

以上ノ二ツノ性質（不動点ト自由區間ニ関スル條件）ガ満タサレテヰルトキニハ，$f(x)$ ヲ $g(x)$ ニ変換スルヤウナ χ〔純單調連続函数〕ガ存在スル。

何トナレバ $f(x)$ ノ不動点ヲ $g(x)$ ノ不動点ニ對應セシメ〔topologisch ＝同型ナ分布ヲナスニヨリ〕ソレニ從ッテ自然ニ對應スル自由區間ニ於イテハ，夫々 Abel ノ方程式

$$\varphi(t+1)=f\varphi(t)$$
$$\psi(t+1)=g\psi(t)$$

ヲ解イテ $\chi=\psi\varphi^{-1}$ トスレバヨイ。〔純増加連続函数ニ就テハ，Abel ノ方程式ハ自由區間ニ於テ常ニ容易ニ解ケル！（57号197参照）〕

4 $f(x)$ ガ〔從ッテ $g(x)$ モ〕純減少ノ場合：

$f(x)$ ノ不動点ハ只一ツ存在スル。今便宜上ソノ不動点ヲ $x=0$ ト假定スル。$g(x)$ ノ不動点モ $x=0$ ト假定スル。

$x'=f(x)$ ナル寫像ハ $x<0$，$x>0$ ナル二ツノ部分ヲ交換スル！ ソコデ $x\leqq 0$ ノ時ハ

$$f(x)=f_1(-x),\quad g(x)=g_1(-x),\quad \chi(x)=-\chi_1(-x)$$

トシ，$x\geqq 0$ ノ時ハ

$$f(x)=-f_2(x),\quad g(x)=-g_2(x),\quad \chi(x)=\chi_2(x)$$

ト置ケバ $f_i(x)$，$g_i(x)$，$\chi_i(x)$ ハイヅレモ $x\geqq 0$ デ定義サレタ純増加函数トナル〔$\chi(x)$ ハ純増加ト假定ス〕。

之ニヨリ

$$\chi f \chi^{-1} = g$$

ノ代リニ $x \geqq 0$ ニ於ケル聯立方程式

$$\begin{cases} \chi_2 f_1 \chi_1^{-1} = g_1, & (\text{元ノ } x \leqq 0 \text{ ニ於テ}) \\ \chi_1 f_2 \chi_2^{-1} = g_2 & (\text{元ノ } x \geqq 0 \text{ ニ於テ}) \end{cases}$$

ヲ得ル。之ハ次ノ聯立方程式ト同等デアル。

$$\begin{cases} \chi_1 f_2 f_1 \chi_1^{-1} = g_2 g_1, \\ \chi_2 = g_1 \chi_1 f_1^{-1}. \end{cases}$$

第一ノ式ヲヘ解ケバ（χ_1 ノミノ方程式），第二ハ自然ニ解ケル。從ッテ問題ハ既ニ論ゼラレタ純増加ノ場合ニ帰着シタ。

5 以上ノ一般論ヲ特ニ Schröder ノ方程式(1)ニ適用スレバ

(a) $F(x)$ ガ純増加ノ時，$C > 0$.

(a_1) $C > 1$ ノ時ハ

$$x > 0 \text{ デ } F(x) > x, \quad x < 0 \text{ デ } F(x) < x.$$

(a_2) $C < 1$ ノ時ハ

$$x > 0 \text{ デ } F(x) < x, \quad x < 0 \text{ デ } F(x) > x.$$

(a_3) $C = 1$ ノ時

$$F(x) \equiv x \qquad [\chi(x) \text{ ハ任意}].$$

(b) $F(x)$ ガ純減少ノ時，$C < 0$.

(b_1) $C > -1$ ノ時ハ

$$-x < F^2(x) < x.$$

(b_2) $C<-1$ ノ時ハ

$$x<0 \text{ デ } F^2(x)<x,\quad x>0 \text{ デ } F^2(x)>x.$$

(b_3) $C=-1$ ノ時ハ

$$F^2(x)\equiv x.$$

以上ノ條件が滿タサレテヰルコトが Schröder ノ方程式 (1) が解ケルタメノ必充條件デアル!

6 尚 (1) が解ケナイ時デモ

(3) $f^k(x)=F(x)$

ハ次ノ如クニシテ $F(x)$ が純減少ノ場合ニモ〔純增加ノ場合ハ既ニ論ゼラレタ〕解キ得ル。(k ハ奇数デナケレバナラヌ)

前述ノ 4 ニ於テ

$$\begin{cases} \chi_2 f_1 \chi_1^{-1}=g_1, \\ \chi_1 f_2 \chi_2^{-1}=g_2. \end{cases}$$

トアル $g_1 g_2$ テバ今特ニ $g_1=g_2$ ナルヤウニ選ブ。

即チ $g_1=g_2=g$ トオケバ, (3) ノ代リニ (k が奇数ノトキハ)

$$\left.\begin{aligned} \chi_2^{-1} g^k \chi_1 &= F_1 \\ \chi_1^{-1} g^k \chi_2 &= F_2 \end{aligned}\right\}$$

從ッテ之ト同等ナ

$$\begin{cases} \chi_1^{-1} g^{2k} \chi_1 = F_2 F_1 \\ \chi_2 = g^k \chi_1 F_1^{-1} \end{cases}$$

ヲ解クコトニ帰着スル。之ハ純増加ノ場合ノ

$$g^{2k}(x) = \chi_1 F_2 F_1 \chi_1^{-1}$$

ヲ解クコトデアルカラ，57号 19Tデ論ジタ場合ニヨッテ常ニ解カレルコトガワカッタ。（χ_1 ハ任意デヨイ）

以上デ<u>純単調</u>ナ場合ニ於ケル函数方程式

$$f^{k}(x) = F(x)$$

ハ全部解決シタト思フ。純単調ナル假定ヲ除イタラバドウナルカ？　之ガ次ニ来ル難問題デアル。