OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	Markoff 過程ニ関スルニ三ノ結果, I
Author(s)	角谷, 靜夫
Citation	全国紙上数学談話会. 1939, 185, p. 414-432
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/74735
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

804. Markoff 過程ニ関スル二三ノ結果，I

角谷　静夫（阪大）

Markoff 過程ハ本紙上談話會ニテ屢々論ジラレ、特ニ吉田氏ハ本号169号746及ビ177号780ニ

於テ Doeblin ノ結果ヲ Kryloff-Bogolioùboff ノ條件ノ下デ証明サレタ。吉田氏ノ方法ハ Banach 空間ノ linear operation ノ理論ヲ使フモノデ Doeblin ノ集合論的方法ニ比シテ、理論的ニ整頓サレヲキル点ガ優レテヰル。本号ニ於テハ、コノ吉田氏ノ方法ヲ更ニ発展セシメレバ種々ノ興味アル結果ガ得ラレルコトヲ示サウ。

Ω ヲ抽象空間トシ、コゝニ Lebesgue 型ノ measure ガ定義サレテヰルモノトスル。今 Ω ノ内部デ simple, homogeneous ナ Markoff 過程ヲ考ヘル。Ω ノ点 t ガ単位時間後ニ Ω 内ノ Borel 集合 E ニハイル確率ヲ $P(t, E)$ ニテ表ハシ、$P(t, E)$ ガ t ヲ固定スレバ Borel 集合 E ニ関スル completely-additive ナ集合函数、E ヲ固定スレバ t ニ関スル Borel measurable ナ函数デアルト假定スル。然ルトキハ Ω ノ点 t ガ n 単位時間後ニ Ω ノ Borel 集合 E ニハイツテ来ル確率 $P^{(n)}(t; E)$ ハ

$$(1)\quad P^{(n)}(t,E)=\int_{\Omega} P^{(n-1)}(t,dS)P(S,E),\quad n=2,3,\cdots\cdots,$$

$$P^{(1)}(t,E)=P(t,E)$$

ニヨツテ与ヘラレ且ツコレハ

$$(2)\quad P^{(n)}(t,E)\geqq 0,\quad P^{(n)}(t,\Omega)\equiv 1$$

ヲ満足スル。吾々ノ目的ハ $P^{(n)}(t; E)$ 及ビソノ算術平均 $Q^{(n)}(t,E)=\frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} P^{(m)}(t,E)$ ノ $n\to\infty$ ニオケ

キノ狀態ヲ調ベルコトデアル。

勿論コノ問題ハ $P(t,E)$ = 對シテ全然條件ノナイトキハ非常ニ困難デアル。W. Doeblin[1] ハ次ノ條件

(D) { positive integer d 及ビ positive number b, η ガ存在シテ $mes(E) < \eta$ ナル任意ノ Borel 集合 E 及ビ任意ノ $t \in \mathfrak{S}$ = 對シテ $P^{(d)}(t,E) < 1-b$ トナル。

ノ下デ、コノ問題ヲ精シク論ジテヰル。Doeblin ノ方法ハ直接ニ集合論的ナ考ヘヲ使フモノデアル。

本談話デハコノ問題ヲ他ノ方法デ論ジル。コレハ Kryloff Bogoliouboff 及ビ吉田氏[2] ニヨツテ用ヒラレタモノデ Banach 空間ニ於ケル linear operation ノ考ヘヲ使フモノデアル。

コレヲ説明スルタメニ、二ツノ Banach 空間 (M), (M^*) ヲ考ヘル。先ヅ (M) ハ $\mathfrak{S}$ ノアラユル Borel 集合 E ニ對シテ定義サレタ (real 又ハ complex valued ナ) completely additive ナ集合函數 $\chi(E)$ 全体ノ作ル Banach 空間デ χ ノ norm $\|\chi\|$ ハ $\|\chi\|$ = total variation of $|\chi(E)|$ on $\mathfrak{S}$ ニヨツテ定義サレル。次ニ (M^*) ハ $\mathfrak{S}$ デ定義サレタアラユル有界且ツ Borel measurable ナ函數ノ作ル Banach 空間デ

---

(1) 本誌談話会 166, 167, 168 ニ於ケル紹介記事参照。

(2) 吉田氏本誌 談話会 169 号 177 号。

$\|x\| = \underset{t\in\Omega}{l.u.b.}\,|x(t)|$ ニヨッテソノ norm ガ定義サレル。

然ルトキハ $P(t,E)$ ハコレラノ Banach 空間ニ於ケル bounded linear + integral operator ヲ定メル。即チ

$$(3)\quad x\to T(x)=y:\ y(E)=\int_{\Omega}x(dt)P(t,E)$$

ハ $(\mathfrak{M})$ ヲ $(\mathfrak{m})$ 自身ノ中ヘウツス bounded linear operation デアリ

$$(4)\quad x\to \overline{T}(x)=y:\ y(t)=\int_{\Omega}P(t;dS)y(S)$$

ハ (M^*) ヲ (M^*) 自身ノ中ヘウツス bounded linear operation デアル。且ツ T 及ビ $\overline{T}$ ノ iteration T^n 及ビ $\overline{T}^n$ ハ夫々 Kernel $P^{(n)}(t,E)$ ニヨッテ與ヘラレルコトハ容易ニワカル。

Kryloff-Bogolioùboff ハ

(K) { positive integer m 及ビ completely continuous + linear operation V ガ存在シテ $\|T^m-V\|$ ク小トナル

ト云フ條件ノ下デ $P^{(n)}(t,E)$ ノ asymptotic behaviour ヲ調ベタ。吉田氏ハ Doeblin ノ條件 (D) カラ Kryloff-Bogolioùboff ノ條件 (K) ガ出ルコトヲ示シ且ツコノ條件 (K) ノ下デ Doeblin ノ得タ殆ドスベテノ結果ガ、ヨリ精シイ形デ得ラレルコトヲ示サ

レタ。

吉田氏ノ方法ハ uniform ergodic theorem[3] ヲ用ヒルノデアル。本談話ニ於テハ、更ニコノ吉田氏ノ考ヘヲ進メテ行ケバ、色々面白イ結果ガ得ラレルコトヲ示サウ。

Lemma I (Uniform ergodic theorem) bounded linear operation T ガ條件(K)ヲ満足スレバ T ハ絶対値1ノ固有値ヲ有限個シカ持タナイ。コレラヲ $\lambda_1, \lambda_2, \cdots\cdots, \lambda_k$ トスレバ T ハ次ノ形ニ分解サレル：

$$(5)\qquad T=\sum_{i=1}^{k}\lambda_i T_{\lambda_i}+S$$

コヽニ T_{λ_i} $(i=1,2,\cdots\cdots,k)$ ハ completely continuous + linear operator デ

$$(6)\quad \begin{cases} T_{\lambda_i}\cdot T_{\lambda_j}=0\ (i\neq j),\quad T_{\lambda_i}^2=T_{\lambda_i}, \\ T\,T_{\lambda_i}=T_{\lambda_i}T=\lambda_i T_{\lambda_i},\quad T_{\lambda_i}S=ST_{\lambda_i}=0 \end{cases}$$

$$(7)\qquad \|S^n\|\leqq\frac{M}{(1+\varepsilon)^n},\quad n=1,2,\cdots\cdots,\ (M,\varepsilon\text{ ハ正ノ常数})$$

デアル。シタガッテ $n=1,2,\cdots\cdots$ ニ對シテ

---

(3) 吉田氏及ビ筆者ノ紙上談話會162号ノ談話710，711參照。コヽニ於テハ uniform ergodic theorem トイフ名ハ mean ergodic theorem ニ對シテコウイフ風ニ呼ブノガ通常デアロウ。

$$(8)\quad \mathbb{T}^n = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i^n \mathbb{T}_{\lambda_i} + \mathbb{S}^n$$

トナリ，且ツ

$$(9)\quad \left\| \frac{1}{n} \sum_{m=1}^{n} \mathbb{T}^m / \lambda_i^m - \mathbb{T}_{\lambda_i} \right\| \leqq \frac{M}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots\cdots$$

トナル如キ constant M ガ存在スル。

定理1　條件（K）ノ下デ $\mathbb{P}^{(n)}(t, E)$ ハ次ノ形ニ分解サレル：

$$(10)\quad \mathbb{P}^{(n)}(t,E) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i^n \mathbb{P}_{\lambda_i}(t,E) + \mathbb{S}^{(n)}(t,E),$$

$$n = 1, 2, \cdots\cdots$$

コヽニ $\{\lambda_i\}$ $(i = 1, 2, \cdots\cdots, k)$ ハ絶對値1ノ $\mathbb{T}$ ノ固有値デ且ツ

$$(11)\quad \underset{t \in \mathcal{B},\, E \subset \mathcal{B}}{l.u.b.} \left| \frac{1}{n} \sum_{m=1}^{n} \frac{\mathbb{P}^{(m)}(t,E)}{\lambda_i^m} - \mathbb{P}_{\lambda_i}(t,E) \right| \leqq \frac{M}{n},$$

$$(12)\quad \int_{\mathcal{B}} \mathbb{P}^{(n)}(t, dS)\, \mathbb{P}_{\lambda_i}(S,E) = \int_{\mathcal{B}} \mathbb{P}_{\lambda_i}(t, dS)\, \mathbb{P}^{(n)}(S,E) = \lambda_i^n \mathbb{P}_{\lambda_i}(t,E)$$

$$(13)\quad \int_{\mathcal{B}} \mathbb{P}_{\lambda_i}(t, dS)\, \mathbb{P}_{\lambda_j}(S,E) = \mathbb{P}_{\lambda_i}(t,E) \quad if \quad i = j$$
$$= 0 \quad if \quad i \neq j$$

$$(14)\quad \int_{\mathcal{B}} \mathbb{P}_{\lambda_i}(t, dS)\, \mathbb{S}(S,E) = \int_{\mathcal{B}} \mathbb{S}(t, dS)\, \mathbb{P}_{\lambda_i}(S,E) = 0$$

$$(15)\quad \underset{t \in \mathcal{B},\, E \subset \Omega}{l.u.b.} \left| \mathbb{S}^{(n)}(t,E) \right| \leqq \frac{M}{(1+\varepsilon)^n},$$

$i=1,2,\cdots\cdots,k$;　$n=1,2,\cdots\cdots$, M, ε ハ正ノ常数

証明　コノ定理ハ Uniform ergodic theorem ヨリ直チニ得ラレル．唯コゝニ注意スベキハ Uniform ergodic theorem ニ於テハ operator ノ分解ガ得ラレタダケデ kernel ノ分解ハ未ダ得ラレテ居ナイコトデアル。シカシ

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n}T^m/\lambda_i^m = T_{\lambda_i}$$

ガ uniform ニ存在スルコトヨリ kernel ノ分解モ同時ニ得ラレル。（証明終）

特ニ $\lambda=1$ ハ T ノ固有値デ、コレニ對應スル kernel $P_1(t,E)$ ハ

$$(16)\quad \text{l.u.b.}_{t\in\mathfrak{B},E\subset\mathfrak{B}}\left|\frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n}P^{(m)}(t,E)-P_1(t,E)\right|\leqq\frac{M}{n},\qquad n=1,2,\cdots\cdots$$

ヲ満足スル。シタガッテ

$$(17)\quad P_1(t,E)\geqq 0,\qquad P_1(t,\Omega)\equiv 1$$

トナルコトモ明ケデアル。

次ニ (m) ニ於ケル方程式

$$(18)\quad T(x)=x:\ x(E)=\int_{\mathfrak{B}}x(dt)\,P(t,E)$$

ヲ考ヘレバ，コレハ 1 ガ T ノ固有値デアル故、少クトモ一ツノ固有函数ヲモツ．實際 $P_1(t,E)$ ハ identically zero デナイカラ通常ニ $t=t_0$ ヲトレバ $P_1(t_0,E)$ ハ

identically zero デナク且ツ (12) ヨリ

$$(19)\quad P_1(t_0, E) = \int_{\Omega} P_1(t_0, ds) P(s, E)$$

デアルカラ $X(E) = P_1(t_0, E)$ ハ (18) ノ non-trivial solution デアル. 以下ニ於テハ コノ事実ヲ使ッテ $P_1(t, E)$ ノ構造ヲシラベルコトニスル。

以下ノ議論ヲワカリ易クスルタメ, semi-order ノツイタ Banach 空間ノ理論ヲ使フコトニスル. 先ヅ $(\mathfrak{M})$ ニ属スル real-valued completely additive ナ集合函数 $X(E)$ ハ任意ノ Borel 集合 E ニ対シテ $X(E) \geqq 0$ デアルトキ positive デアルト呼ビ $X \geqq 0$ ニテコレヲ表ハス. 一般ニ $X, Y \in (\mathfrak{M})$ ニ對シテ $X - Y \geqq 0$ ナルトキ $X \geqq Y$ デアルト定義スレバコレニヨッテ real $(\mathfrak{M})$ ニ対シテハ semi-ordering ガ與ヘラレル。コノ semi-order ニ對シテ $X \vee Y$, $X \wedge Y$, $X_+ = X \vee 0$, $X_- = X \wedge 0$ 等ガ定義出来ル. 然ルトキハ

Lemma 2 $X(E)$, $Y(E)$ ガ (18) ノ real valued solution デアレバ X_+, X_-, $X \vee Y$, $X \wedge Y$ 等ハ又 (18) ノ solution デアル。

証明 X_+ ニ對シテ証明ヲスレバ十分デアル.

$$X(E) = \int_{\Omega} X(dt) P(t, E)$$

ヨリ $P(t, E) \geqq 0$ ナルコトヲ使ヘバ

$$X_+(E) \leqq \int_{\Omega} X_+(dt)\, P(t, E) \qquad (4)$$

然ルニ $P(t, \Omega) \equiv 1$ デアルカラ、コノ等号ガ成立シナケレバナラナイ。

Lemma 3

(20) $T(X_\alpha) = X_\alpha$, $X_\alpha \geqq 0$, $X_\alpha(\Omega) = 1$,

$$X_\alpha \wedge X_\beta = 0 \quad (\alpha \neq \beta)$$

ヲ満足スル $(\mathfrak{M})$ ノ element ノ system $\{X_\alpha(E)\}$ $(\alpha = 1, 2, \cdots\cdots, l)$ ガ存在シテ、任意ノ

(21) $T(X) = X$, $X \geqq 0$, $X(\Omega) = 1$

ヲ満足スル $X(E) \in (\mathfrak{M})$ ハ

$$(22) \quad X(E) = \sum_{\alpha=1}^{l} C_\alpha X_\alpha(E), \quad C_\alpha \geqq 0, \quad \sum_{\alpha=1}^{l} C_\alpha = 1$$

ナル形ニ表ハサレル。

(注意) Lemma 3 ハ $T(X) = X$ ノ solution 全体が finite-dimension デアリ、且ツコレニ (20) ノ條件ヲ満足スル如キ特殊ノ base ガ存在スルコトヲ主張スル。単ニ finite base ガ存在スルコトダケナラバ、コレハ T ガ條件 (K) ヲ満足スルコトカラ直チニ得ラレル。以下ノ証明デハ T ガ positive operation ($X \geqq 0 \longrightarrow T(X) \geqq 0$) デアルコトガ essential デアル。

証明 (20) ヲ満足スル如キ $(\mathfrak{M})$ ノ element X_1,

---

(4) $T(X) = X$ ヨリ $T(X_+) \leqq T(X) = X$. 他方 $T(X_+) \geqq 0$ ハ明カ。ヨッテ $T(X_+) \leqq X \vee 0 = X_+$.

$x_2, \cdots\cdots, x_\ell$ ノ<u>カズ</u>ノ最大値ヲ l トセヨ。（カヽル l が存在スルコトハ上記ノ注意ヨリ明カ）。コノ $x_1, x_2, \cdots\cdots, x_l$ ガ求ムル base デアルコトヲ証明シヨウ。

コレヲ示スタメ先ヅ $x(E)$ ヲ (21) ヲ満足スル任意ノ(或ノ element トセヨ。$x(E)$ ガ $x_1, x_2, \cdots\cdots, x_l$ ノ linear combination デアルコトヲ証明シヨウ。コノタメニ $x'_\alpha = x \wedge x_\alpha$ $(\alpha = 1, 2, \cdots\cdots, l)$ トオケ。Lemma 2 ヨリ x'_2 ハ又 (18) ノ solution デアル。最初ニ各々ノ $\alpha = 1, 2, \cdots\cdots, l$ ニ對シテ $x'_\alpha = c_\alpha x_\alpha$ トナル如キ常数 c_α ガ存在スルコトヲ示サウ。実際モシコレガアル α ニ對シテ成立シナカッタトスレバ x_α ト $\alpha''_\alpha \equiv x'_\alpha / \| x'_\alpha \|$ トハ等シクナク，シタガッテ $(x_\alpha - x''_\alpha)_+$, $(x''_\alpha - x_\alpha)_+$ ハ共ニ 0 デナイ。且ツ再ビ Lemma 2 ニヨッテコレラハ又 (18) ヲ満足スル。ヨッテ $x_{\alpha 1} = (x_\alpha - x''_\alpha)_+ / \| (x_\alpha - x''_\alpha)_+ \|$, $x_{\alpha 2} = (x''_\alpha - x_\alpha)_+ / \| (x''_\alpha - x_\alpha)_+ \|$ トオケバ $l+1$ 個ノ(或ル) element $x_1, x_2, \cdots\cdots, x_{\alpha-1}, x_{\alpha 1}, x_{\alpha 2}, x_{\alpha+1}, \cdots\cdots, \cdots\cdots, x_\ell$ ハ (20) ヲ明カニ満足シテヰル。コレハ l ノ定義ニ矛盾スルカラ各ノ α ニ對シテ $x'_\alpha = x \wedge x_\alpha = c_\alpha x_\alpha$ トナル如キ常数 c_α $(0 \leqq c_\alpha \leqq 1)$ ガ存在スル。

此ノ如クシテ各ノ α ニ對シテ $x'_\alpha = c_\alpha x_\alpha$ トナル如キ常数 c_α ガ存在スルコトガワカッタ。次ニコノ c_α ニ對シテ $x = \sum_{\alpha=1}^{l} x'_\alpha \equiv \sum_{\alpha=1}^{l} c_\alpha x_\alpha$ トナルコトヲ証明シヨウ。

コノタメニ $X' = X - \sum_{\alpha=1}^{l} X'_\alpha$ トオケバ $X' \wedge X_\alpha = 0$,

$\alpha = 1, 2, \cdots\cdots, l$ トナルコトヲ証明シヨウ。コレヲ示スニハ $X' \leqq X - X'_\alpha$ デアルカラ $(X - X'_\alpha) \wedge X_\alpha = 0$ ($\alpha = 1, 2, \cdots\cdots, l$) ヲ示セバヨイ。

然ルニコレハ $C_\alpha = 1$ ノトキハ $X = X'_\alpha = X_\alpha$ トナルコトヨリ明カデアリ、$C_\alpha < 1$ ナルトキハ

$(1 - C_\alpha)((x - X'_\alpha) \wedge X_\alpha) \leqq (X - X'_\alpha) \wedge (1 - C_\alpha) X_\alpha$
$= (X - X'_\alpha) \wedge (X_\alpha - X'_\alpha) = (x - (X \wedge X_\alpha)) \wedge (X_\alpha - (X \wedge X_\alpha)) = 0$ トナルコトヨリ明カデアル。ヨッテ $X' \wedge X_\alpha = 0$, $\alpha = 1, 2, \cdots\cdots, l$, ガ証明サレタ。コレヨリ $X' = 0$ デナケレバナラヌコトガワカル。何トナレバモシ $X' \neq 0$ デアレバ（勿論 $X' \geqq 0$） $l+1$ 個ノ ($\mathfrak{M}$) ノ element $X'/\|X'\|, X_1, X_2, \cdots\cdots, X_l$ ハ再ビ (20) ヲ満足スル。コレハ l ノ定義ニ矛盾スルカラ $X' = 0$ デナケレバナラナイ。此ノ如クシテ $X' = 0$ ガ示サレタ。従ッテ

$X = \sum_{\alpha=1}^{l} C_\alpha X_\alpha$ トナル。$\sum_{\alpha=1}^{l} C_\alpha = 1$ トナルコトハ明カデアルカラ、コレデ Lemma 2 ノ証明ハ終ル。

定理2 条件 (K) ノ下デ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{m=1}^{n} P^{(m)}(t, E) = P_1(t, E)$ ハ uniformly ニ存在シ、コノ limit ノ kernel $P_1(t, E)$ ハ次ノ形ニ分解サレル：

$$(23) \quad P_1(t, E) = \sum_{\alpha=1}^{l} y_\alpha(t) X_\alpha(E)$$

コノ $\{x_\alpha(E)\}$ $(\alpha=1,2,\cdots\cdots,l)$ ハ Lemma 3 ニ於テ定メラレタ system デアリ $\{y_\alpha(t)\}$ $(\alpha=1,2,\cdots\cdots,l)$ ハ

$$(24)\quad \overline{T}(y_\alpha)=y_\alpha,\quad y_\alpha(t)\geqq 0,\quad \sum_{\alpha=1}^{l} y_\alpha(t)\equiv 1$$

$$(25)\quad \int_\Omega x_\alpha(\alpha t)\,y_\beta(t)=1\ (\alpha=\beta),\ =0\ (\alpha\neq\beta)$$

ヲ満足スル (M^*) ノ element ノ system デアリ、且ツ

$$(26)\quad \overline{T}(y)=y:\ y(t)=\int_\Omega P(t,ds)\,y(s),$$

ヲ満足スル任意ノ $y(t)\in(M^*)$ ハ

$$(27)\quad y(t)=\sum_{\alpha=1}^{l} c_\alpha\cdot y_\alpha(t)$$

ナル如ク $y_\alpha(t)$ ノ linear combination トシテ unique ニ表ハサレル.

証明 $P_1(t,E)$ ガ各ノ t ニ對シテ (12) ノ solution デアルコトヲ考ヘレバ (23) ノ分解ハ Lemma 4.5. ヨリ直チニ得ラレル。Lemma 4.5 ニ於テ定メラレタ $\{x_\alpha(E)\}$ $(\alpha=1,2,\cdots\cdots,l)$ ノ性質ヨリ $x_\alpha(E'_\alpha)=1$, $x_\beta(E'_\alpha)=0$ $(\beta\neq\alpha)$ ナル如キ Borel 集合 E'_α ハ明カニ存在スルカラ、コノ E'_α ヲトッテ (23) ニテ $E=E'_\alpha$ トオケバ直チニ $y_\alpha(t)$ $(\alpha=1,2,\cdots\cdots,l)$ ガ bounded Borel measurable ナルコトガ知ラレル. 次ニ (24)

ヲ示スノデアルガ、後ノ二ツハ明カデアルカラ初メノ

$\overline{T}(y_\alpha) = y_\alpha$ ナル関係ヲ示セバヨイ。コレヲ示スタメニ

ハ定理1ノ関係(12)（$n=1$, $\lambda_i=1$）

$$\int_\Omega P(t,ds)P_1(s,E) = P_1(t,E)$$

ヲ用フレバヨイ。(23)ヨリコレハ

$$\sum_{\alpha=1}^{l}\left(\int_\Omega P(t,ds)\,y_\alpha(s)\right)x_\alpha(E) = \sum_{\alpha=1}^{l} y_\alpha(t)\,x_\alpha(E)$$

トナリコンデ $E = E'_\alpha$ トオケバ

$$\int_\Omega P(t,ds)\,y_\alpha(t) = y_\alpha(t)$$

即チ $\overline{T}(y_\alpha) = y_\alpha$ ガ得ラレタ。(25)ヲ示スタメニハ関係 $T(x_\alpha) = x_\alpha$ ヨリ出発スル。$T(x) = x$ ト $T_1(x) = x$ トハ equivalent デアルカラ $T_1(x_\alpha) = x_\alpha$ 即チ

$$\int_\Omega \lambda_\alpha(dt)P_1(t,E) = x_\alpha(E)$$

ヲ得ル。コレハ(23)ニヨリ

$$\sum_{\beta=1}^{l}\left(\int_\Omega x_\alpha(dt)\,y_\beta(t)\right)x_\beta(E) = x_\alpha(E)$$

トナルガコンデ $E = E'_\beta$ トオケバ(25)ガ得ラレル。

此ノ如クシテ定理ノ最初ノ半分ハ証明サレタ。後ノ半分ヲ証明スルニハ次ノ様ニスレバヨイ。先ヅ $\overline{T}(y) = y$ ナル仮定ヨリ $\overline{T}_1(y) = y$ 又ハ

$$y(t) = \int_\Omega P_1(t,ds)\,y(s)$$

コノ=テ再ビ(23)ヲ使ヘバ

$$y(t)=\sum_{\alpha=1}^{l} y_\alpha(t)\left(\int_\Omega \chi_\alpha(dS)\, y_\alpha(S)\right)=\sum_{\alpha=1}^{l} c_\alpha y_\alpha(t)$$

但シ $c_\alpha=\int_\Omega \chi_\alpha(dS)\, y(S)$

以上デ定理2ノ証明ガ終ル。

定理2ノ分解(23)ハ重要ナ結果デコレヨリ種々ノコトガラガ結論サレル。特ニコレニヨツテ $\mathfrak{S}$ ヲ ergodic part, ergodic kernel, dissipative part 等ニ分割スルコトガ出来ル。以下ニソレヲ示サウ。

各ノ α ニ対シテ $y_\alpha(t)=1$ トナル如キ t 全体ノ集合ヲ $\bar{E}_\alpha$ ニテ表ハシコレヲ <u>ergodic part</u> ト呼ブ。$y_\alpha(t)$ ハ何レモ Borel measurable デアルカラ $\bar{E}_\alpha$ ハスベテ Borel 集合デアル。

定理3

(28) $\chi_\alpha(\bar{E}_\beta)=1 \quad (\alpha=\beta),\ =0 \quad (\alpha\neq\beta)$

(29) $P(t,\bar{E}_\alpha)=1, \quad t\in\bar{E}_\alpha$

(30) $$\underset{t\in\bar{E}_\alpha,\,E\subset\mathfrak{S}}{\text{l.u.b.}}\left|\frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n}P^{(m)}(t,E)-\chi_\alpha(E)\right|\leqq\frac{M}{n},$$

$n=1,2,\cdots\cdots$

コノ=M, εハ正ノ常数デアル。

(注意) (29)ハ一度 $\bar{E}_\alpha$ ニハイツタ点ハ決シテ $\bar{E}_\alpha$ ノ外ヘ出ルコトナク $\bar{E}_\alpha$ ノ中デ遷移サレルコトヲ示シ、(30)ハ uniform + limit $\frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n}P^{(m)}(t,E)=P_1(t,E)$ ガ

$t \in \bar{E}_\alpha$ ナル initial point ニハ無関係デアルコトヲ示シテヰル。コレデ $\bar{E}_\alpha$ ヲ ergodic part トヨブノガヨク意味ガハッキリスル。

証明 定理3ヲ証明スルタメニハ次ノ Lemma 4ヲ証明スレバ十分デアル。(実際 (28), (29) ハ夫々 (25), (26) ヨリ Lemma 4ヲ使ヘバ直チニ得ラレル。又 (30) ハ $t \in \bar{E}_\alpha$ ナルトキ $\gamma_\alpha(t)=1$, $\gamma_\beta(t)=0$, $(\beta \neq \alpha)$ デ $P_1(t,E)=\chi_\alpha(E)$ トナルコトヲ考ヘレバ殆ド明カデアル)

Lemma 4 $\chi(E)$ ヲ $(\mathfrak{M})$ ニ属スル completely additive ナ集合函数 $\in(\mathfrak{M})$ デ $\chi(\Omega)=1$, $\chi(E)\geqq 0$ for any Borel set $\subset \Omega$ トスル。又 $\gamma(t)$ ヲ (M^*) ニ属スル bounded Borel measurable function デ $0 \leqq \gamma(t) \leqq 1$ for any $t \in \Omega$ ナルモノトスル。今若シ

$$\int_\Omega \chi(dt)\,\gamma(t)=1$$

デアレバ $\gamma(t)=1$ トナル如キ t 全体ノ集合 E_0 ハ $\chi(E_0)=1$ ヲ満足スル。

証明 $1-\frac{1}{n} \leqq \gamma(t) < 1-\frac{1}{n}$ トナル如キ t 全体ノ集合ヲ E_n トセヨ。E_n ハ互ニ共通点ノナイ Borel 集合デ且ツ

$$\Omega = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} E_n$$

ヨッテ

$$1=\int_{\Omega} x(dt)\,y(t)=\int_{E_0} x(dt)\,y(t)+\sum_{n=1}^{\infty}\int_{E_n} x(dt)\,y(t)$$

$$\leqq x(E_0)+\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)x(E_n)$$

$$\leqq x(E_0)+\sum_{n=1}^{\infty}x(E_n)=x(\Omega)=1$$

然ルニコンデ等号ノ成立スルノハ $x(E_n)=0,\ n=1,2,\cdots\cdots$ トナルトキニ限ルカラ、$x(E_0)=1$ デナケレバナラナイ。（証明終）

此ノ如クシテ定理3ノ証明が終ッタ。容易ニワカル如ク $\bar{E}_\alpha$ ハ $x_\alpha(\bar{E}_\alpha)=1$ ヲ満足スル最小ノ（measure ノ一バン小サイ）Borel集合デハナイ。實際 $E(\bar{E}_\alpha,\ mes(E)<mes(\bar{E}_\alpha)$ デ且ツ $x_\alpha(E)=1$ トナル如キ Borel 集合ハ存在スルカモ知レナイノデアル。ヨッテ今 $x_\alpha(E)=1$ ヲ満足スル $\bar{E}_\alpha$ ノ部分 Borel 集合ノウチ measure ノ最小ノモノ（コレハ必ず存在スル！）ヲ E_α ニテ表ハセバ E_α ハ measure 0 ノ集合ヲ除イテ一意的ニ定マリ且ツ $E\subset E_\alpha$ $mes(E)>0$ トナル如キ任意ノ Borel 集合ニ對シテ $x_\alpha(E)>0$ ガ成立スル。各々ノ α ニ対シテ E_α ヲ適當ニ（measure 0 ノ集合ヲ適當ニ加減シテ）定義スレバ次ノ定理ガ成立スル。

定理4　$E_\alpha\ (\alpha=1,2,\cdots\cdots,l)$ 及ビ $\Delta=\Omega-\sum_{\alpha=1}^{l}E_\alpha$

ハ次ノ條件ヲ滿足スル。

(31) $P_1(t, E_\alpha) = 1, \quad t \in \bar{E}_\alpha$

(32) $P(t, \bar{E}_\alpha) = 1, \quad t \in E_\alpha$

(33) $t \in \bar{E}_\alpha$, $E \subset E_\alpha$, $mes(E) > 0$ ナラバ

$$P_1(t, E) > 0.$$

(ヨッテ $n = n(t, E)$ ガ存在シテ $P^{(n)}(t, E) > 0$)

(34) $$\underset{t \in \Omega}{l.u.b.} \frac{1}{n} \sum_{m=1}^{n} P^{(m)}(t, \Delta) \leqq \frac{M}{n},$$

$n = 1, 2, \cdots\cdots$ (M ハ常數)

(注意) (31)ハ $\bar{E}_\alpha$ 中ノ点 t ハ $n \to \infty$ ナルトキ算術平均ノイミデ(コレハ後ニナッテカラ算術平均ヲ取ル必要ノナイコトガワカル) E_α 内 還移サレルコトヲ示シ(32)ハ一旦 E_α 内ヘハイッタ点ハモハヤ決シテ E_α ノ外ヘハ出ナイコトヲ示シテヰル。更ニ(33)ニヨリ E_α ハコノヤウナ性質(特ニ(32))ヲモッタ二ツノ集合ニ分割出来ナイコトヲ示シテヰル。最後ニ(34)ノ性質ハ後ニナッテカラモット強イ結果。

$$\underset{t \in \Omega}{l.u.b.} P^{(n)}(t, \Delta) \leqq \frac{M}{(1+\varepsilon)^n}, \quad n = 1, 2, \cdots\cdots,$$

(M, ε ハ正ノ常數)

ニヨッテオキカヘラレルコトガワカル。コノ様ナ性質ヲモッコトヨリ E_α 及ビ Δ ハ夫々 <u>ergodic kernel</u> 及ビ <u>dissipative part</u> ト呼ベル。ergodic kernel ハ Doeblin ガ ensemble final ト呼ンダ

モノト同じデアル。(ergodic part ノ方ハ新シク導入サレタ概念デアル)コゝニ注意スベキハ ergodic kernel が measure zero ノ集合ヲ除イテ定マルノデアルガ ergodic part ハ一点ノ ambiguity モナク定義サレテヰルコトデアル。コレハ ergodic kernel E_α が $(\mathfrak{M})$ ニ属スル函数 $\chi_\alpha(E)$ ニヨツテ定義セラレルニ反シ ergodic part $\bar{E}_\alpha$ が $(\mathfrak{M}^*)$ ニ属スル函数 $\gamma_\alpha(t)$ ニヨツテ定義サレルコトガ原因デアル。

定理4ノ証明 E_α^0 ヲ $\bar{E}_\alpha$ ノ部分集合 E デ $\chi_\alpha(E)=1$ ヲ満足スルモノノウチ measure ノ最小ノモノトセヨ。コノ E_α^0 ニ対シテ (31), (33) ハ明カニ満足サレテヰルガ (32) ハ必ズシモ満足サレテヰナイ。(32) ヲモ満足スル如キ Borel 集合ヲ求メルタメ $E_\alpha^0 \supset E_\alpha^1 \supset \cdots\cdots \supset E_\alpha^n \supset \cdots\cdots$ ナル如キ Borel 集合ノ系列ヲ mathematical induction ニヨツテ定義スル。先ツ E_α^0 ハ既ニ定義サレテ $\chi_\alpha(E_\alpha^0)=1$ ヲ満足シテヰル。

次ニ E_α^n ガ既ニ定義サレテ $\chi_\alpha(E_\alpha^n)=1$ ヲ満足シテヰルモノトセヨ。E_α^{n+1} ハ $P(t, E_\alpha^n)=1$ ヲ満足スル如キ E_α^n ノ点 t 全体ノ集合トシテ定義スル。然ルトキハ明カニ E_α^{n+1} ハ E_α^n ノ部分 Borel 集合デ且ツ

$$\int_{E_\alpha^n} \chi_\alpha(dt) P(t, E_\alpha^n) = \int_{\Omega} \chi_\alpha(dt) P(t, E_\alpha^n) = \chi_\alpha(E_\alpha^n) = 1$$

トナル故 Lemma 4 ニヨツテ $\chi_\alpha(E_\alpha^{n+1})=1$ トナル。此

ノ如クシテ $\{E_\alpha^n\}$, $n=1,2,\cdots\cdots$ ヲ作ッタ上デ

$E_\alpha^\infty = \prod_{n=1}^{\infty} E_\alpha^n$ トオク.

E_α^∞ ハ明カニ E_α° ノ部分 Borel 集合デ且ツ $X_\alpha(E_\alpha^\infty)=1$ ヲ満足シテヰル。

$$\left(X_\alpha(E_\alpha^\infty) = \lim_{n\to\infty} X_\alpha(E_\alpha^n)\right)$$

更ニ $t \in E_\alpha^\infty$ トルトキ $P(t, E_\alpha^\infty)=1$ ガ成立スル. 何トナレバ $E_\alpha^\infty \subset E_\alpha^{n+1}$ ナルコトヨリ $t \in E_\alpha^\infty$ ナルトキハ $P(t, E_\alpha^n)=1$. ヨッテ $P(t, E_\alpha^\infty) = \lim_{n\to\infty} P(t, E_\alpha^n) = 1$.

此ノ如クシテ $E_\alpha = E_\alpha^\infty$ ガ (31), (32), (33) ノ性質ヲモッテヰルコトガワカッタ。(34) ハ $X_\alpha(\Delta)=0$ ($\alpha=1,2,\cdots\cdots,l$) ナルコトヨリ殆ド明カデアロウ

——— (未完) ———