



Title	Vector-lattice ノ表現ニ就テ
Author(s)	中野, 秀五郎
Citation	全国紙上数学談話会. 1941, 213, p. 120-140
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/74847
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

917. Vector-lattice / 表現 = 就テ

中野 春五郎 (東大)

此、前、紙上談話會ヲ吉田氏が「單位ヲ有スル Vector-lattice = 就イテ」ナル表題ニテ、或ル種ノ Vector-lattice / contin functions = テノ表現ヲ與ヘタ。其ノ際吉田氏ハ Boolean algebra / 表現ト同ジヤウノ方法ト述べテレタガ實際 = Wallman / Boolean algebra / 表現ト Riesz / linear functional / Spectralization / 方法ヲ用フレバ、マハリ同様ノ結果ガ得ラレル。

吉田氏ハ "unit" / 存在ヲ假定セラレタガ、此ノ場合ハ私が吉田氏ニ手紙ヲ注意致シマシタ様ニ私ノ dilatator (學士院 XVI. 1940) ヲ用ヒマスト直チ = Gelfand / normed ring ヲ得ラレルノデアリマス。從ツテ此処デハモット一般ニ unit / 十イ 場合ヲ考ヘマス。

Vector-lattice M トシテハ、次ノ性質ヲ有スル實數体ヲ operator トスル。semi-ordered modul トシマス。

$$(1) \quad a > b \ \& \ b > c \longrightarrow a > c$$

$$(2) \quad a \not> a$$

$$(3) \quad a \wedge b, \ a \vee b / \text{存在}$$

$$(4) \quad a > b \longrightarrow a + c > b + c$$

$$(5) \quad a > 0 \text{ \& } \alpha > 0 \text{ (\alpha \text{ハ實數})} \rightarrow \alpha a > 0$$

$$(6) \quad a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq 0 \rightarrow \text{g. l. b. } a_n \text{ 存在.}$$

此処 = (6) 番目ハ非常 = 強イ條件ノヤウ = 思ハレマスガ(6)ノ
カハリ =

$$\text{Archimedes 公理 } a > 0 \rightarrow \text{g. l. b. } \frac{1}{n} a = 0$$

ヲ置ケル (6) ナル性質ヲ有スル Vector-lattice \overline{M} ナテ
 \overline{M} ヲ拡張シ、然ルニ $x \in \overline{M}$ = 對シ、 $a_1 > a_2 > \dots$, g.

l. b. $a_n = x$, $a_n \in M$ ナラシメ得ルヲ以テ、最初カラ

(6) ガ存在スルモノトス。吉田氏ノ場合 = \pm Archimedes
= 相當スル假定、例ハバ unit I ノ存在スルトキハ

g. l. b. $\frac{1}{n} I = 0$ ヲ假定シテケルバ恐ラク間違ヒノヤウ =
思ハレル。

\overline{M} = ツイテ (1) - (6) ヨリ得ラレル elementary
+ 性質 = ツイテハ省略スルモノトス。此処ヲハ特ニ \overline{M} = 於
ケル Projection (私ノ學士院 XVI. 1940, Teilweise
geordnete Algebra) ヲ用フル。

\overline{M} ヲ a = 對シテ \overline{M} = 於ケル positive linear
operator トシテ Projection が存在シ次ノ性質ヲ
有スル。

$$[a][b] = [b][a] = [a]b = [b]a = [|a| \wedge |b|];$$

$$([a]b \pm) = ([a]b) \pm; \quad [a][a] = [a];$$

$$[a] = [|a|]; \quad [a] = [\alpha a] \quad (\alpha \neq 0 \text{ ナル實數});$$

$$[a] = 0 \Leftrightarrow a = 0; \quad [a][b] = 0 \Leftrightarrow |a| \wedge |b| = 0;$$

$$[a][b] = [a] \Leftrightarrow [b] \geq [a];$$

$$[a][b] = 0 \rightarrow [a+b] = [a] + [b].$$

$$[a] \geq [b] \rightarrow [a] - [b] \in \text{Projection} = \text{シテ、}$$

$$\{[a] - [b]\}[b] = 0 \quad \& \quad [a] - [b] = [a - [b]a];$$

$$|a_1| \leq |a_2| \leq \dots \quad \& \quad \text{l.u.b. } |a_n| = |a| \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} [a_n]$$

$$= [a] \quad \& \quad [|a_1|] \leq [|a_2|] \leq \dots$$

然シ Identity operator I ハ $\neq 0$ シ \in Projection

ナラズ。故ニ

$$\text{Projections } \wedge [a] \wedge [b] = [a][b], [a] \vee [b] = [|a| \vee |b|]$$

= 對シテ distributive lattice ナラスガ complemented

即チ Boolean Algebra ナラス。此ノ度、

Annals \neq Bochner ト Phillips ガ定義シテ Projection

ハ此ノ Projections = I ナラズト作ツタ

Boolean Algebra, Operators トナリ此処ノ Pro-

jections \neq principal Projections ト云ツテキルガ

此処ナラズニ principal Projections ノミヲ考ヘ

ル。

I. Maximal Ideal of Projections.

Wallman ト同様ニシテ Projection, Ideal \neq

次ノ如クニ定義ス。 Projection, 集合 \mathcal{P} ガ次ノ如ク性質

備フ有スル時 Ideal ト云フ。

$$1^\circ \quad \mathcal{P} \neq \emptyset$$

$$2^\circ \quad \mathcal{P} \ni [a] \quad \& \quad [a] \leq [b] \rightarrow \mathcal{P} \ni [b]$$

$$3^\circ \quad \mathcal{P} \ni [a], [b] \rightarrow \mathcal{P} \ni [a][b]$$

特ニ Maximal Ideal (即チ $\mathcal{P} \ni [a]$ ナラズバ $\mathcal{P} \ni [b]$,

$[a][b] = 0$ +ル $[b]$ が存在スル) , ミヲ考ヘルヲモツテ
 今後、Maximal Ideal ヲ M.I ト記スコトヲスル。

定理 I 任意、Ideal $\alpha = \text{對シ}$ 、 $\alpha \subset \mathfrak{P}$ +ル
 M.I. \mathfrak{P} が存在スル。

(証明) ハ Wallman ト同様 transfinite in-
 ductions = \exists !! $\alpha = 0$ +ラザル Projections ヲ順
 次ツケ加ヘテ Ideal ヲ作り maximal = スレバ可ナリ。

定理 2 M.I. $\mathfrak{P} = \text{對シテ}$ $[a] \in \mathfrak{P}$ 、 $[a] = [a_1]$
 + $[a_2]$ 、 $[a_1][a_2] = 0$ +ラバ $[a_1]$ 、 $[a_2]$ 1 何レカ一方
 が $\mathfrak{P} = \text{屬シ}$ 。他方が屬ナス。

(証明) $\mathfrak{P} \ni 0 = \exists$!! $[a_1]$ 、 $[a_2]$ ハ共ニ $\mathfrak{P} = \text{屬ナス}$ 。若
 シ $[a_1] \in \mathfrak{P}$ トスレバ $[a_1][p] = 0$ 、 $[p] \in \mathfrak{P}$ +ル p が存在
 ス。故ニ $[a][p] \in \mathfrak{P}$ 。然ルニ $[a_2]\{[a][p]\} = ([a] - [a_1])[p]$
 $= [a][p]$ 。即チ $[a_2] \ni [a][p]$ 。故ニ $[a_2] \in \mathfrak{P}$ 。

次ニ M.I. 全体ノ集合ニ次ノ如ク Topology ヲ入レル。
 (此処ヲハ Wallman ト反對ニ Umgebung ヲ與ヘ
 ル)。

M.I. $\mathfrak{P} = \text{對シ}$ 、 $[a] \in \mathfrak{P}$ +ル $[a] = \text{對シテ}$ $[a] \in \mathfrak{P}$
 +ル M.I. \mathfrak{P} ノ全体 (コレヲ $[a]$ ガ表ハスコトヲスル) ヲ \mathfrak{P}
 ノ Umgebung ト定義シ、 \mathfrak{P} ノ空間ヲ \mathcal{K} ガ表ハスコトヲ
 スル。(\mathfrak{P} ノニツキ Umgebung $[a]$ 、 $[b] = \text{對シテ}$ 丁度
 $[a][b]$ が其ノ Durchschnitt +ルコトハ Ideal ノ
 def. \exists !! 明カデアール)

定理 3 \mathfrak{P} ハ Hausdorff space = シテ、且ツ

$\mathcal{F} \in \mathcal{R}$, 又 $a \in \mathcal{M}$ トス。若シ

1°. $[a] \in \mathcal{F}$ 十ラバ、 $a, \mathcal{F} =$ 於ケル Characteristic value ハ 0 十リト云フ。 $(a, \mathcal{F}) = 0$ ト記スコトス。

2°. $[a] \in \mathcal{F}$ 十ルトキハ $a = a_+ - a_- =$ 對シ

$[a_+][a_-] = 0, [a_+] + [a_-] = [a]$ 十ラテ以テ定理 2 =

ヨリ

$$[a_+] \in \mathcal{F}, [a_-] \in \mathcal{F}$$

カ $[a_+] \in \mathcal{F}, [a_-] \in \mathcal{F}$

十リ。上ノ時ハ $a, \mathcal{F} =$ 於ケル Characteristic value

ハ $+\infty$ 十リト云ヒ

$$(a, \mathcal{F}) = +\infty$$

下ノ時ハ $-\infty$ 十リト云ヒ

$$(a, \mathcal{F}) = -\infty$$

ト記スコトス。

$\pm\infty$, / 計算 = ヲイテハ次ノ如ク定義ス。

$\alpha > 0$ ノ實數トシタトキ

$$(\pm\alpha)(\pm\infty) = +\infty, \quad (\mp\alpha)(\pm\infty) = -\infty,$$

$$0(\pm\infty) = 0, \quad +\infty \pm \alpha = +\infty, \quad -\infty \pm \alpha = -\infty,$$

$$(\pm\infty) + (\pm\infty) = \pm\infty \quad (\pm\infty)(\pm\infty) = \infty,$$

$$(\mp\infty)(\pm\infty) = -\infty, \quad 0 \pm \infty = \pm\infty + 0 = \pm\infty$$

定理 4 $a, b \in \mathcal{M}$, α, β ノ實數トスレバ

$$(\alpha a + \beta b, \mathcal{F}) = \alpha(a, \mathcal{F}) + \beta(b, \mathcal{F})$$

但シ右辺ガ意味ガアルニトス。

(証明) $(a, \mathcal{F}) = 0$ & $(b, \mathcal{F}) = 0 \rightarrow [a] \in \mathcal{F}, [b] \in \mathcal{F}$

$$\rightarrow [a][b] \in \mathcal{P} \wedge [a] - [a][b] \in \mathcal{P}$$

$$\rightarrow [b] + \{[a] - [a][b]\} \in \mathcal{P} \rightarrow [|a| + |b|] \in \mathcal{P}$$

$$\rightarrow [|a+b|] \in \mathcal{P} \rightarrow (a+b, \mathcal{P}) = 0$$

$$(a, \mathcal{P}) = +\infty \wedge (b, \mathcal{P}) = +\infty \rightarrow [a_+] \in \mathcal{P}, [b_+] \in \mathcal{P}$$

$$\rightarrow [a_+][b_+] \in \mathcal{P} \rightarrow [a_+][b_+] \leq [(a+b)_+] \in \mathcal{P}$$

$$\rightarrow (a+b, \mathcal{P}) = +\infty, (a, \mathcal{P}) = 0 \wedge (b, \mathcal{P}) = +\infty$$

$$\rightarrow [a] \in \mathcal{P} \wedge [b_+] \in \mathcal{P} \rightarrow [b_+ - [a]b_+] \in \mathcal{P}$$

$$\rightarrow [(a+b)_+] \in \mathcal{P} \rightarrow (a+b, \mathcal{P}) = +\infty$$

$$(0, \mathcal{P}) = 0 \text{ 八明カ. } \alpha > 0 \text{ トスレバ}$$

$$(a, \mathcal{P}) = +\infty \rightarrow [a_+] \in \mathcal{P} \rightarrow [\alpha a_+] \in \mathcal{P}$$

$$\rightarrow [(\alpha a)_+] \in \mathcal{P} \rightarrow (\alpha a, \mathcal{P}) = +\infty$$

$$(a, \mathcal{P}) = 0 \rightarrow [a] \in \mathcal{P} \rightarrow [\alpha a] \in \mathcal{P} \rightarrow (\alpha a, \mathcal{P}) = 0.$$

$$\alpha < 0 \text{ トスレバ}$$

$$(a, \mathcal{P}) = +\infty \rightarrow [a_+] \in \mathcal{P} \rightarrow [\alpha a_+] \in \mathcal{P}$$

$$\rightarrow [(\alpha a)_-] \in \mathcal{P} \rightarrow (\alpha a, \mathcal{P}) = -\infty$$

故 = 証明 # レタリ。

今 $(a, \mathcal{P}) = +\infty$ トス。実数 $\lambda, \mu = \text{對シ}$

$$(b - \lambda a, \mathcal{P}) < (b - \mu a, \mathcal{P})$$

トスレバ

$$(b - \mu a, \mathcal{P}) - (b - \lambda a, \mathcal{P}) = +\infty$$

$$((\lambda - \mu)a, \mathcal{P}) = +\infty$$

$$(\lambda - \mu)(a, \mathcal{P}) = +\infty$$

故 = $\lambda > \mu + 1$ 。

$$\text{又 } (b - \lambda a, \mathcal{P}) = (b - \mu a, \mathcal{P}) = 0$$

トスルバ

$$((\mu - \lambda) a, \mathcal{P}) = 0 \quad (\mu - \lambda)(a, \mathcal{P}) = 0$$

従フテ $\mu = \lambda + \nu$.

$$\text{故ニ } (b - \lambda a, \mathcal{P}) \text{ ハ}$$

$$1^\circ. \text{ 常ニ } (b - \lambda a, \mathcal{P}) = +\infty$$

$$2^\circ. \text{ 常ニ } (b - \lambda a, \mathcal{P}) = -\infty$$

$$3^\circ. \text{ 適省 } + \lambda_0 = \text{對シ}$$

$$(b - \lambda a, \mathcal{P}) = \begin{cases} +\infty & \lambda < \lambda_0 \\ -\infty & \lambda > \lambda_0 \end{cases}$$

$(a, \mathcal{P}) = -\infty$ / 場合ニ同様トス。

3^o / 場合ニハ、 λ_0 ハ b / a = 閉スル relative spectrum ト呼ビ

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = \lambda_0$$

ト記ス。

又 1^o / 場合ニ

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = +\infty$$

2^o / 場合ニ

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = -\infty$$

ト記ス。又 $(b - \lambda_0 a, \mathcal{P}) = 0$ トルトキハ λ_0 7 relative point spectrum ト云フ。

以上ニヨリ次ノ Lemma 7 得ル。

Lemma 1. $(a, \mathcal{P}) = +\infty + \nu$ 時 $(b - \lambda a, \mathcal{P})$

λ は ν の *monoton decreasing function* である。

又明かす

Lemma 2. $(a, \mathcal{P}) = +\infty + \nu$

$$\left(\frac{\alpha a}{a}, \mathcal{P}\right) = \alpha$$

定理 5 $(a, \mathcal{P}) \neq 0 + \nu$ とき

$$\left(\frac{\alpha b + \beta c}{a}, \mathcal{P}\right) = \alpha \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) + \beta \left(\frac{c}{a}, \mathcal{P}\right)$$

α, β は 實数。又右辺が意味を持つようにする。

(証明) $(a, \mathcal{P}) = +\infty$ 1 場合を証明すれば充分

である。

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = \lambda_0, \quad \left(\frac{c}{a}, \mathcal{P}\right) = \mu_0$$

とする。 $\lambda < \lambda_0 + \mu_0 + \nu$ ならば $\lambda' < \lambda_0, \mu' < \mu_0$

$\lambda < \lambda'_0 + \mu'_0$ であるから Lemma 1 による。

$$\begin{aligned} ((b+c) - \lambda a, \mathcal{P}) &\geq ((b+c) - (\lambda'_0 + \mu'_0) a, \mathcal{P}) \\ &= (b - \lambda'_0 a, \mathcal{P}) + (c - \mu'_0 a, \mathcal{P}) = +\infty \end{aligned}$$

同様にして $\lambda > \mu_0 + \lambda_0 + \nu$ ならば $((b+c) - \lambda a, \mathcal{P}) = -\infty$

$$\text{故に} \quad \left(\frac{b+c}{a}, \mathcal{P}\right) = \lambda_0 + \mu_0$$

他の場合は同様である。又

$$(\alpha b - \lambda a, \mathcal{P}) = \alpha \left(b - \frac{\lambda}{\alpha} a, \mathcal{P}\right)$$

$$\text{よって} \quad \left(\frac{\alpha b}{a}, \mathcal{P}\right) = \alpha \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) \text{ である。}$$

定理6 $(a, \mathcal{F}) = +\infty$ かつ $b \geq c$ かつ \mathcal{F}

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{F}\right) \geq \left(\frac{c}{a}, \mathcal{F}\right)$$

(証明) 定理5より $b \geq 0$ かつ $\left(\frac{b}{a}, \mathcal{F}\right) \geq 0$ であることが示される。若し $\left(\frac{b}{a}, \mathcal{F}\right) < 0$ となれば $\lambda < 0$, $(b - \lambda a, \mathcal{F}) = -\infty$ かつ λ が存在する。故に $[(b - \lambda a)_-] \in \mathcal{F}$. 然し $[a_+] \in \mathcal{F}$. 故に

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \ni [[a_+] (b - \lambda a)_-] &= [([a_+] b - \lambda a_+)_-] \\ &= [0] = 0 \end{aligned}$$

となり矛盾する。

Lemma 3. $[p] \in \mathcal{F}$ かつ \mathcal{F}

$$(a, \mathcal{F}) = ([p]a, \mathcal{F})$$

(証明) $[a_+] \in \mathcal{F} \rightarrow [p][a_+] \in \mathcal{F} \rightarrow [([p]a)_+] \in \mathcal{F}$

同様 =

$$[a_-] \in \mathcal{F} \rightarrow [([p]a)_-] \in \mathcal{F}$$

$$[a] \in \mathcal{F} \rightarrow [[p]a] = [p][a] \in \mathcal{F}$$

Lemma 4. $(a, \mathcal{F}) \neq 0$, $[p] \in \mathcal{F}$ かつ \mathcal{F}

$$\left(\frac{[p]b}{[p]a}, \mathcal{F}\right) = \left(\frac{b}{a}, \mathcal{F}\right)$$

(証明)

$$([p]b - \lambda [p]a, \mathcal{F}) = (b - \lambda a, \mathcal{F})$$

より明らかである。

定理7 $\left(\frac{b}{a}, \mathcal{F}\right)$ の Umgebung $[a]$ 間 = $\tau \mathcal{F}$

1. *contin function* +11.

(証明) 先ヅ $(\frac{b}{a}, \mathcal{P}_0) = \lambda_0$ が finite トスル。

$([a] \in \mathcal{P}_0)$ 、又 $(a, \mathcal{P}_0) = +\infty$ トスル。

然ルトキハ $[a_+] \in \mathcal{P}_0$ 、故 = *Umgebung* $[a_+]$ 間

= τ

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = \left(\frac{[a_+]b}{a_+}, \mathcal{P}\right)$$

+11. 故 = $a > 0$ +11 場合 = $\mathcal{P}_0 = \tau$ *contin* +11 トヲ

証明スレバ 充分 +11. 任意ノ正数 $\varepsilon > 0$ = 對シテ *Lemma*

1 = 311

$$[(b - (\lambda_0 + \varepsilon)a)_-] \in \mathcal{P}_0$$

$$[(b - (\lambda_0 - \varepsilon)a)_+] \in \mathcal{P}_0$$

故 =

$$[p] = [(b - (\lambda_0 + \varepsilon)a)_-][b - (\lambda_0 - \varepsilon)a_+]$$

ト置ケバ $[p] \in \mathcal{P}_0$ 即チ $[p]$ ハ \mathcal{P}_0 ノ *Umgebung*

+11.

然カニ $[p] \in \mathcal{P}$ +11 任意ノ β = 對シ

$$[\beta](b - (\lambda_0 + \varepsilon)a) = -[p](b - (\lambda_0 + \varepsilon)a)_- \leq 0$$

$$\text{即チ } [p]b \leq (\lambda_0 + \varepsilon)[p]a$$

又

$$[p](b - (\lambda_0 - \varepsilon)a) = [p](b - (\lambda_0 - \varepsilon)a)_+ \geq 0$$

即チ

$$[p]b \geq (\lambda_0 - \varepsilon)[p]a$$

+11 = 311

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = \left(\frac{[p]b}{[p]a}, \mathcal{P}\right) \leq \left(\frac{(\lambda_0 + \varepsilon)[p]a}{[p]a}, \mathcal{P}\right) = \lambda_0 + \varepsilon$$

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) \geq \left(\frac{(\lambda_0 - \varepsilon)[p]a}{[p]a}, \mathcal{P}\right) \geq \lambda_0 - \varepsilon$$

即ち

$$\left| \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) - \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}_0\right) \right| \leq \varepsilon$$

+11. 故 = $\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right)$ は \mathcal{P}_0 へ τ contin +11.

又 = $\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}_0\right) = +\infty$ / \vdots τ 考へル。任意 λ_0

= 對 \forall

$$[(b - \lambda_0 a)_+] \in \mathcal{P}_0$$

故 = $[p] = [(b - \lambda_0 a)_+]$ \vdots 置 \times $[p]$ \wedge \mathcal{P}_0 , Um-
gebung = $\forall \tau [p] \in \mathcal{P}$ \vdots 任意, \mathcal{P} = 對 \forall

$$[p](b - \lambda_0 a) = (b - \lambda_0 a)_+ \geq 0$$

即ち $[p]b \geq \lambda_0 [p]a$

\vdots τ \times τ

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = \left(\frac{[p]b}{[p]a}, \mathcal{P}\right) \geq \left(\frac{\lambda_0 [p]a}{[p]a}, \mathcal{P}\right) \geq \lambda_0$$

又 $\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}_0\right) = -\infty$ / 場合 τ 同様 +11.

定理 8 $\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = \pm\infty$ \vdots \mathcal{P} \wedge $[a]$ 間 = τ

nirgends dicht +11. 然 $\exists \varepsilon |b| \leq M|a|$ \vdots τ \vdots τ

\wedge 端 = finite +11.

即ち $\left| \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) \right| \leq M$

(証明) 先ず $|b| \leq M|a|$ トスル。然ルトキハ

$$-Ma_+ \leq [a_+]b \leq Ma_+,$$

$$-Ma_- \leq [a_-]b \leq Ma_-.$$

$$[a] = [a_+] + [a_-], \quad [a_+][a_-] = 0 \text{ トルヲ以テ},$$

$$[a] \in \mathcal{P} + \nu, \text{ トルハ } [a_+] \in \mathcal{P} \text{ カ或ハ } [a_-] \in \mathcal{P} + \nu. \quad [a_+] \in \mathcal{P}$$

トスルハ

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = \left(\frac{[a_+]b}{a_+}, \mathcal{P}\right) \leq \left(\frac{Ma_+}{a_+}, \mathcal{P}\right) = M,$$

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = \left(\frac{[a_+]b}{a_+}, \mathcal{P}\right) \geq \left(\frac{-Ma_+}{a_+}, \mathcal{P}\right) = -M.$$

同様ニ $[a_-] \in \mathcal{P} + \nu$ トスルハ $\left|\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right)\right| \leq M$

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}_0\right) = +\infty \text{ トスルハ, 任意ノ } \lambda > 0 = \text{對シ}$$

$$[(b - \lambda a)_+] \in \mathcal{P}_0$$

+ ν . 今 $(a, \mathcal{P}_0) = +\infty$ トスルハ $[a_+] \in \mathcal{P}_0$ トルニヨリ

$$[a_+][(b - \lambda a)_+] \in \mathcal{P}_0$$

即チ

$$[([a_+]b - \lambda a_+)_+] \in \mathcal{P}_0$$

$\mathcal{P}_0 \ni [q]$ + ν 任意ノ Umgebung $[q] = \text{對シ}$

$$[p_\lambda] = [q][([a_+]b - \lambda a_+)_-]$$

$$= [q][\left(a_+ - \frac{1}{\lambda}[a_+]b\right)_+]$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \left(a_+ - \frac{1}{\lambda}[a_+]b\right) = a_+ \text{ monoton increasing}$$

+ ν トルヲ以テ

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} [p_\lambda] = [q][a_+]$$

故 = 充分大ナル λ = 對シテハ

$$[p_\lambda] \neq 0 \quad [p_\lambda] \leq [q][a_+]$$

然ルニ

$$[p_\lambda]([a_+]b - \lambda a_+) = -[p_\lambda]([a_+]b - \lambda a_+)_- \leq 0$$

即チ

$$[p_\lambda][a_+]b \leq \lambda [p_\lambda]a_+$$

故 = $\exists [p_\lambda] =$ 對シテハ

$$\left(\frac{b}{a}, p\right) = \left(\frac{[p_\lambda][a_+]b}{[p_\lambda]a_+}, p\right) \leq \lambda$$

然ルニ又 $\left(\frac{b}{a}, p\right)$ ハ $p_0 = \tau$ contin + ルヲ以テ Umgebung

$[q]$ ヲ最初 = 適當 = 定ムルニ、 $[q]$ 間 = テハ $\left(\frac{b}{a}, p\right) \geq 0$

ヲ得ル。故 = $[p_\lambda]$ 間 = テハ $\left(\frac{b}{a}, p\right)$ ハ finite

ナリ。

$$\boxed{\text{定理 9}} \quad \left(\frac{b}{a}, p\right) = \left(\frac{b'}{a}, p\right) \text{ in } [a] + \nu \neq \text{ハ}$$

$$[a]b = [a]b' + \nu.$$

(証明) 定理 5, 8, 9 = ヲリ $\left(\frac{b}{a}, p\right) = 0$ in $[a] +$
ルトキ $[a]b = 0$ ヲ 証明スルニ可ナリ。

$[a_+]$ 間 = テハ

$$\left(\frac{b}{a}, p\right) = \left(\frac{[a_+]b}{a_+}, p\right) = 0$$

故 = 常 = $\varepsilon > 0$ ナルトキハ

$$[(a_+]b - \varepsilon a_+)_- \in p,$$

$$[(a_+]b + \varepsilon a_+)_+ \in p.$$

$\mathcal{P} \ni [a_+] + \text{ル任意} / \mathcal{P} = \tau$ 成立スルヲ以テ

$$[a_+] \leq [([a_+]b - \varepsilon a_+)_-],$$

$$[a_+] \leq [([a_+]b + \varepsilon a_+)_+].$$

故 =

$$\begin{aligned} [a_+]([a_+]b - \varepsilon a_+) &= -[a_+]([a_+]b - \varepsilon a_+)_- \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

即チ

$$[a_+]b \leq \varepsilon a_+$$

同様 =

$$[a_+]b \geq -\varepsilon a_+$$

故 = $[a_+]b = 0$

又 $[a_-]$ 間 = τ 同様 + 1。故 = $[a]b = 0$

定理 10 $\alpha > 0$ + ル實數 = 對シ $(\frac{b}{a}, \mathcal{P})$ が
finite + ヲハ

$$\left(\frac{\pm \alpha b}{\pm \alpha a}, \mathcal{P}\right) = \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right)$$

又 $(\frac{b}{a}, \mathcal{P}) = \pm \infty$ + ルトキハ

$$\left(\frac{\pm \alpha b}{\pm \alpha a}, \mathcal{P}\right) = \pm \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right)$$

$$\left(\frac{c}{b}, \mathcal{P}\right) \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = \left(\frac{c}{a}, \mathcal{P}\right)$$

(証明) 上, 式ハ定義ヨリ明カトシ。最後ノ式ハ

$$(c - \lambda b, \mathcal{P}) + \lambda (b - \mu a, \mathcal{P}) = (c - \lambda \mu a, \mathcal{P})$$

ヨリ 簡單 = 証明サレル。

III. 環の表現

transfinite Induction = $\exists \Pi \exists \mathcal{R}$
 次、如き Projections System $\{[P_\alpha]\}$ が得
 られる。即ち

$$1^\circ. [P_\alpha][P_\beta] = 0 \quad (\alpha \neq \beta)$$

$$2^\circ. [q][P_\alpha] = 0 \text{ がすべて } \alpha \text{ に対して成立すれば}$$

$$[q] = 0 \text{ 即ち } q = 0$$

此、如き $\{[P_\alpha]\} =$ 對してハ \mathcal{R} 、M.I. $\mathcal{P} =$ して

$\{[P_\alpha]\}$ 、何レカ = 含マレルモノノ 集合ヲ \mathcal{R}_0 トスレバ \mathcal{R}_0

ハ \times ハ Π Hausdorff space = して locally compact

ナリ。 $a \in \mathcal{R} =$ 對シ、 $\mathcal{P} \ni [P_\alpha]$ ナラバ

$$\left(\frac{a}{P_\alpha}, \mathcal{P} \right) = a(\mathcal{P})$$

ナラバ $\mathcal{R}_0 =$ 於ケル function $a(\mathcal{P})$ ヲ 對應セシメレバ

$\Pi = \exists \Pi$ $a(\mathcal{P})$ ハ contin ナリ。

又 $a(\mathcal{P}) = b(\mathcal{P})$ in \mathcal{R}_0 ナルトキハ

$$[P_\alpha]a = [P_\alpha]b, \text{ 即ち } [P_\alpha](a-b) = 0$$

故ニ $a = b$ ナリ。又 $\Pi = \exists \Pi$ $a(\mathcal{P})$ ト a ハ lattice - iso-
 morph ナリ。

環の表現 = Maximal Ideal ト Maximal normal
Submodul トノ 關係 = ツイテ 注意スル。

吉田氏ハ Birkhoff、Maximal normal sub-
 modul ヲ 用ヒタ。コノデハ此レト M.I. トノ 關係ヲ述ベ

ル。

\mathcal{P} は M の I である。

$$(a, \mathcal{P}) = 0$$

また a の全体が N である。定理 5 = より N の Modul である。然るに $[a] \in \mathcal{P}$ である $|b| \leq |a| + \epsilon$ である。対して $[|b|] \subseteq [a]$ であるから $[b] \in \mathcal{P}$ 。

即ち $(b, \mathcal{P}) = 0$ である。故に N は normal である。然るに、 N の Maximal であることが証明出来る。逆は任意の $\text{Maximal normal submodul } N$ である $a \in N$, $[a]$ の何れも等しいから Projection の集合として \mathcal{P} が定まる。

次に M が Ring であるとき N の Maximal Ideal である。これ等、又何れ書くこととする。

又 $[e]$ が Identity であるが如き e が存在する場合 は 必ず $[e] = \text{含まれる}$ 故に bicomact である。

次に定理 8 の補として

$$\boxed{\text{定理 11}} \quad [a] \text{ 内では } \left| \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P} \right) \right| \leq M \text{ である, 又}$$

$$[a] \text{ 内では } |b| \leq M|a| \text{ である。}$$

(証明) 定理 8 と同様 $[a_+]$ 内と $[a_-]$ = のことを考へれば充分である。 $[a_+]$ である

$$\left| \left(\frac{b}{a}, \mathcal{P} \right) \right| = \left| \left(\frac{[a_+]b}{a_+}, \mathcal{P} \right) \right| \leq M$$

故に

$$\left(\frac{-Ma_+}{a_+}, \mathcal{P}\right) \leq \left(\frac{[a_+]b}{a_+}, \mathcal{P}\right) \leq \left(\frac{Ma_+}{a_+}, \mathcal{P}\right)$$

従って

$$\left(\frac{[a_+]b}{a_+}, \mathcal{P}\right) \geq 0 \rightarrow [a_+]b \geq 0$$

ヲ証明スレバヨイ。任意ノ正数 $\varepsilon > 0$ = 對シ

$$([a_+]b + \varepsilon a_+, \mathcal{P}) = +\infty$$

即チ

$$([a_+]b + \varepsilon a_+)_+ \in \mathcal{P}$$

ガ $[a_+]$ ノ 總テノ $\mathcal{P} = \tau$ 成立ス。故ニ

$$([a_+]b + \varepsilon a_+)_+ \geq [a_+]$$

従って

$$[a_+]([a_+]b + \varepsilon a_+) = +[a_+]([a_+]b - \varepsilon a_+)_+ \geq 0$$

即チ $[a_+]b \geq -\varepsilon a_+$

故ニ $[a_+]b \geq 0 + \eta$ 。

又定理ノ補トシテ

定理12 $[a] = \tau$ finite contin + function

$f(\mathcal{P}) = \text{對シ}$

$$\left(\frac{b}{a}, \mathcal{P}\right) = f(\mathcal{P})$$

ナル b が存在シ、然カニ $|[a]b| \leq M|a|$ ナル M ガアル。

(証明) $[a]$ ハ bicomact ナルニヨリ $f(\mathcal{P})$ ハ

$[a] = \tau$ bounded ナリ。即チ $|f(\mathcal{P})| \leq M + \text{ナル } M$ ガアル。

任意, $\varepsilon = \text{對} \nu$, 又 $p_0 \in [a]$ とす p_0 , Umgebung

$[p_0] \subseteq [a]$ を適當に定めて $[p_0] = \tau$

$$|f(p) - f(p_0)| < \varepsilon$$

とす ν を得る。 $[a]$ は *bicomact* とす \Rightarrow 此の如き

$[p_0], \text{finite } [p_1], \dots, [p_n] = \tau$ cover とす。

此處 = 閉カとす如く $[p_i][p_j] = \emptyset$ ($i \neq j$) とす ν を得る。 今

$$b_\varepsilon = \sum f(p_i) [p_i] a, \quad (p_i \in [p_i])$$

トす $\varepsilon \rightarrow 0 = \text{對} \nu \lim b$ が存在ス、如何トす ν 也、

也、 $\varepsilon' = \text{對} \nu$

$$|b_\varepsilon - b_{\varepsilon'}| \leq \left| \sum_{i,j} (f(p_i) - f(p_j)) [p_i][p_j] a \right|$$

$$\leq \text{Max}(\varepsilon, \varepsilon') \cdot |a|$$

とす ν 以て ν とす。 此、 $b = \text{對} \nu \tau$ 也

$$\left(\frac{b}{a}, p \right) = f(p)$$

トす。 如何トす ν 也

$$|b_\varepsilon - b| \leq \varepsilon |a|$$

とす \Rightarrow 也

$$\left| \left(\frac{b_\varepsilon}{a}, p \right) - \left(\frac{b}{a}, p \right) \right| \leq \varepsilon$$

然カ ε , $p \in [p_1], \dots, [p_n]$ の何カカ = 含まれる \Rightarrow

\Rightarrow 也 $p \in [p_1]$ とす ν 也

$$\left(\frac{b_\varepsilon}{a}, p \right) = \left(\frac{[p_1] b_\varepsilon}{[p_1] a}, p \right) = f(p_1)$$

横ッテ

$$\left| f(p) - \left(\frac{b}{a}, p \right) \right| \leq \varepsilon$$

又

$$\left| f(p) - f(p) \right| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

$$\left| f(p) - \left(\frac{b}{a}, p \right) \right| \leq 2\varepsilon$$

縦ッテ

$$f(p) = \left(\frac{b}{a}, p \right)$$

此、定理 = ヨッテ、若シ $\mathcal{M} = \text{unit } e$ が存在スレバ、 $\left(\frac{a}{e}, p \right)$ トシテ *bicompact Hausdorff space* \mathcal{K} = 於ケル *finite function*、然テ = ヨッテ \mathcal{M} が *lattice isomorph* = 表現セラル、而カ ε *uniform topologie* テ *homeomorph* テアル。即チ

$$|a| \leq \alpha \varepsilon + \alpha \varepsilon, \text{ g. l. b. } \forall \|a\| \text{ トスレバ}$$

$$\|a\| \text{ Max}_{p \in \mathcal{K}} \left(\frac{a}{e}, p \right)$$

トナル。

又 \mathcal{M} が (6) ナル性質ヲ有セズ。單 = *Archimedes*、公理ヲ満足スレバ \mathcal{M} ヲ拡張シテ $\overline{\mathcal{M}}$ トシ、而カ $\overline{a} < \overline{b} + \varepsilon$ $\overline{\mathcal{M}}$ 、elements = 對シ $\overline{a} < a < \overline{b} + \varepsilon$ $a \in \mathcal{M}$ が存在セシテアル。カ $\overline{\mathcal{M}}$ 、表現 $\left(\frac{\overline{a}}{e}, p \right)$ = 對シ $\left(\frac{a}{e}, p \right)$ 、 $\text{Max}_{p \in \mathcal{K}} \left(\frac{a}{e}, p \right)$ = 對シ \forall *überall dicht* ナリ。

訂正 「Teilweise geordnete Module, 連続性 = 減テ」 —— 前話 —— , 定理 2 とシテ $(A_1, B_1) > (A_2, B_2)$ ナラ $(A_1, B_1) > a > (A_2, B_2)$ ナル a が存在スレトセルハ誤リ = 付キ取消シマス。之がナクトE 他 = 影響ハアリマセン。又 X_0 -Schnitt ノオハマ^ママ^マテハ具合が悪イカラ取消シマス。コノ所ハ何レ改メテ著ク續リマス。