OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	Automorphic Function ニツイテ（Ｉ）
Author(s)	有馬, 喜八郎
Citation	全国紙上数学談話会. 1943, 255, p. 325-346
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/75061
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

1128. Automorphic Function ニツイテ（I）

有馬喜八郎（阪大）

Automorphic function ノ性質，limit-point ノ集合，解析函数（代数曲線ヲ含メテ），uniformisation 等ニツキノベテ見タイト思ヒマス。マトマッタ順ニ述ベマスノデ系統的ニ重複，前後スルコトト思ヒマス。

フックス群，フックソイド群ヲマトメテフックソイド群ト呼ブコトニシマス。

第一章

コノ章ニハフックソイド群ニツイテノ Poincare，Johanson 等ノヨク知ラレタ定理ヲ後述ヘノ準備トシテ述ベテミマス。

(1) 原点ヘ固定点ヲナイト假定シ，原点ヲ内部ニ含ム基本領域ヲ D_0 トシマス。

次ノ二数列ヲ定義ス。

$$0<r_1<r_2\cdots\cdots<r_i\cdots\cdots<1 \qquad \lim_{n\to\infty} r_n=1$$

原点ヲ中心トシ D_0 内ニ含マレル任意ノ円 K_0 ノ半径ヲ R_0 トシ固定シテ考フ。

$$R_0>R_1>R_2\cdots\cdots>R_n\cdots\cdots \qquad \lim_{n\to\infty} R_n=0$$

原点ヲ中心トシ r_i ヲ半径トスル円ヲ C_i，K_n ノ半径トスル円ヲ K_n トス。

フックソイド群 Γ ノ要素ヲ S_ρ デ表ハシ $K_n = S_\rho$ ヲ施シテ出来タ円ヲ K_n^ρ デ表ハシ，C_i ト交ハルカ又ハ C_i ノ全ク内部ニアル K_n^ρ ト単位円トデ境界サレタ領域ヲ D_n^i トス。

(2) D_n^i 内ノ任意ノ点 z_0 ヲ Pole ニ有スル Green 函数ヲ $u_n^i(z, z_0)$ トスレバ Harnack ノ定理ニヨリ容易ニ $i \to \infty$ ノトキ $u_n^i(z, z_0)$ ハ z_0 ヲ Pole ニモツ調和函数 $u_n(z, z_0)$ ニ一様収斂スルコトヲ知ル。

Green - Gauss ノ定理ニヨリ

$$\sum_{D_n^i,\ K_n^\rho = \text{ツイテ}} \int_{K_n^\rho} \frac{\partial u_n^i(z, z_0)}{\partial n} ds < 2\pi$$

$u_n^i(z, z_0) > u_n(z, z_0)$ 且ツ両函数ハ K_n^ρ ノ周上デ 0

$$\therefore \sum_{D_n^i,\ K_n^\rho = \text{ツイテ}} \int_{K_n^\rho} \frac{\partial u_n(z, z_0)}{\partial n} ds < \sum_{D_n^i,\ K_n^\rho = \text{ツイテ}} \int_{K_n^\rho} \frac{\partial u_n^i(z, z_0)}{\partial n} < 2\pi$$

K_n^ρ ハ $S_{-\rho}$ ($S_{-\rho} \cdot S_\rho = S_\rho S_{-\rho} = 1$) ニテ K_n ニ移ル故

$$\sum_{D_n^i,\ K_n^\rho = \text{ツイテ}} \int_{K_n^\rho} \frac{\partial u_n(z, z_0)}{\partial n} = \sum_{D_n^i,\ K_n^\rho,\ \rho = \text{ツイテ}} \int_{K_n} \frac{\partial u_n(z S_{-\rho}(z_0))}{\partial n} ds$$

$$\therefore \sum_{D_n^i,\ K_n^\rho,\ \rho = \text{ツイテ}} \int_{K_n} \frac{\partial u_n(z, S_{-\rho}(z_0))}{\partial n} ds < 2\pi$$

D_n^i ノ境界，K_n^ρ ノ ρ ニツイテ

$$\sum_\rho u_n(z, S_{-\rho}(z_0)) = W_n^i(z, z_0)$$ トオケバ

上式ヨリ

$$\int_{K_n} \frac{\partial W_n^i(z, z_0)}{\partial n} ds < 2\pi \quad \cdots\cdots (1)$$

且ツ

$$W_n^{i+1}(z, z_0) \geqq W_n^i(z \cdot z_0) \quad \cdots\cdots (2)$$

K_0 ノ周上デ 0，K_n ノ周上デ 1 ヲトル調和函数ヲ $v(z)$ トスレバ

$$\int_{K_0} W_n^i(z, z_0) \frac{\partial v(z)}{\partial n} ds = \int_{K_n} \frac{\partial W_n^i(z, z_0)}{\partial n} ds$$

(1) ト上式ヨリ

$$\int_{K_0} W_n^i(z, z_0) \frac{\partial v(z)}{\partial n} ds < 2\pi$$

K_0 ノ長サ L ノ周上デ $\frac{\partial v(z)}{\partial n} > q > 0$ (q ハ任意ニ固定セル常数)，$W_n^i(z, z_0)$ ノ K_0 上デノ最小値ヲ m トスレバ

$$L \cdot q\, m < 2\pi$$

Harnack ノ定理ヨリ $0 < k < 1$ ナル常数 k ガ定マリ

K_0 ノ周上デ $km < W_n^i(z, z_0) < \frac{1}{k} m$

$$\therefore \quad W_n^i(z, z_0) < \frac{2\pi}{k L_{\rho}}$$

上ノコトト (2) ヨリ Harnack ノ定理ヨリ $W_n^i(z, z_0)$ ハ $S_{-\rho}(z_0)$ ナル pole ヲ除キ調和ナ函数 $W_n(z, z_0)$ ニ一様収斂ス。

$$\therefore \quad W_n(z, z_0) = \sum_{\rho}^{\infty} u_n(z, S_{-\rho}(z_0))$$

S_ρ ハ群 Γ ヲ作ル故 $= \sum_{\rho} u_n(z, S_\rho(z_0))$

Γ ノ任意ノ要素 S トスレバ

$$W_n(z, S(z_0)) = \sum u_n(z, S_\rho S(z_0))$$

$$= \sum u_n(z, S_\rho(z_0)) = W(z, z_0)$$

故ニ $W_n(z, z_0)$ ハ z_0 ヲ変数ト考フレバ automorphic, 同様ニシテ z ニツイテモ然ルコトヲ知ル。

又 (1) ヨリ

$$\int_{K_n} \frac{\partial W_n(z, z_0)}{\partial n} ds \leqq 2\pi$$

定義

$$\int_{K_n} \frac{\partial W_n(z, z_0)}{\partial n} = 2\pi \text{ ノトキ第一型 (F)}$$

$< 2\pi$ ノトキ第二型 (S) ト定義ス。

(3) D_n^i ノ一ツノ境界 K_n^ρ ノ周上デ 1, 他ノ境界デ 0 トナル調和函数ヲ $W_{n,\rho}^i(z)$ トスレバ

$$W_{n,\rho}^i(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{K_n^\rho} \frac{\partial u_n^i(\zeta, z)}{\partial n} ds$$

（ζ ハ K_n^ρ 上ノ点デ ds ハソコデノ線要素ヲ示ス）

D_n^i ノ豊位円周上デ 0 他ノ境界上デ 1 トナル調和函数ヲ $W_n^i(z)$ トスレバ, 上式ヨリ

$$W_n^i(z) = \sum_{D_n^i,\ K_n^\rho = \text{ツイテ}} W_{n,\rho}^i(z) = \sum_{D_n^i,\ K_n^\rho = \text{ツイテ}} \frac{1}{2\pi}\int_{K_n^\rho} \frac{\partial u_n^i(\zeta, z)}{\partial n} ds$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{K_n} \frac{\partial W_n^i(\zeta, z)}{\partial n} ds$$

$0 \leqq W_n^i(z) \leqq W_n^{i+1}(z) \leqq 1$ トナル故 $i \to \infty$ トキ $W_n^i(z)$ ハ恒等的ニ 1 トナルカ或ニハ調和函数 $W_n(z)$ ニ一様収斂ス.

第一型ノトキハ

$$W_n(z) \equiv 1$$

第二型ノトキハ $0 \leqq W_n(z) \leqq 1$ トナルコトヲ知ル. 且ツ

$$W_n(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{K_n} \frac{\partial W_n(\zeta, z)}{\partial n} ds$$

$W_n(\zeta, z)$ ハ z ニツイテ Automorphic ナル故 $W_n(z)$ モ亦然リ

(4) $V_n^i(z) = 1 - W_n^i(z)$ トシ D_n^i ニ於テ

Green - Gauss ノ公式ヨリ

$$\sum_{D_n^i,\ K_n^p\text{ニツキ}} \int_{K_n^p} \log\frac{1}{|z|}\frac{\partial V_n^i(z)}{\partial n}\,ds$$

$$=\int_{|z|=1}\frac{\partial \log\frac{1}{|z|}}{\partial n}\,ds = 2\pi$$

原点ヨリ K_n^p ヘノ最大，最短距離ヲ M_p, m_p トスレバ，上式ヨリ

$$\sum_{D_n^i,\ P\text{ニツキ}} \log\frac{1}{m_p}\int_{K_n^p}\frac{\partial V_n^i(z)}{\partial n}\,ds > 2\pi$$

$$> \sum_{D_n^i,\ P\text{ニツキ}} \log\frac{1}{M_p}\int_{K_n^p}\frac{\partial V_n^i(z)}{\partial n}\,ds \quad \cdots\cdots (3)$$

第二型ノトキ

$V_n(z) = 1 - W_n(z)$ トスレバ $V_n^i(z) \geqq V_n(z)$，且ツ K_n^p 上デ0

$$\therefore \int_{K_n^p}\frac{\partial V_n^i(z)}{\partial n}\,ds > \int_{K_n^p}\frac{\partial V_n(z)}{\partial n}\,ds$$

$$=\int_{K_n}\frac{\partial V_n(z)}{\partial n}\,ds$$

故ニ (3) ヨリ

$$\sum_{D_n^i,\ K_n^p,\ P\text{ツイテ}} \log\frac{1}{M_p} \leqq \frac{2\pi}{\int_{K_n}\frac{\partial V_n(z)}{\partial n}\,ds} = \text{常数}\begin{pmatrix} n\text{ノミ従属シテ} \\ i\text{ニ従属シナイ}\end{pmatrix}$$

故ニ $i\longrightarrow\infty$ ノトキ已ア千

$\sum_{p=0}^{\infty} \log \frac{1}{M_p}$ ハ収斂ス.

第一型ノトキ $\sum_{p=0}^{\infty} \log \frac{1}{m_p}$ ハ発散ス.

今 $\sum_{p=0}^{\infty} \log \frac{1}{m_p}$ ガ収斂シテソノ値ヲAトス。

ε ヲ π ヨリ小ナル任意ノ正数トス. $\nabla(z)$ ヲ K_n ノ周上デノ単位円周上デノ調和函数トス. 然ルトキ $\nabla(S_{-p}(zr)$ ハ K_n^p ノ周上デノ単位円周上デノニナル。

$$\therefore \int_{K_n^p} \frac{\partial \nabla(S_{-p}(z))}{\partial n} ds = \int_{K_n} \frac{\partial \nabla(z)}{\partial n} ds$$

K_n ト単位円トニ囲マレタ領域ニテ Green-Gauss ノ公式ヲ用ヒ

$$\int_{K_n} \log \frac{1}{|z|} \frac{\partial \nabla(z)}{\partial n} ds = \int_{|z|=1} \frac{\partial \log \frac{1}{|z|}}{\partial n} ds = 2\pi$$

K_n ノ半径ハ R_n ナル故上ノ二式ヨリ

$$\int_{K_n^p} \frac{\partial \nabla(S_{-p}(z))}{\partial n} ds = \frac{2\pi}{\log \frac{1}{R_n}} = \varepsilon$$

K_n^p ガ D_n^i ノ境界ナラバ

$$\int_{K_n^p} \frac{\partial \nabla_n^p(z)}{\partial n} ds < \int_{K_n^p} \frac{\partial \nabla(S_{-p}(z))}{\partial n} ds = \varepsilon$$

N ヲ充分大キクトリ

$$\sum_{\rho=N}^{\infty} \log\frac{1}{m_\rho} < \frac{\varepsilon}{C}$$ トス.

i ヲ充分大キクトリ D_n^i ノ境界 $= K_n^\rho$ ($\rho = 0, 1, 2 \cdots\cdots N^i$, 但シ $N^i \geqq N$) ガ属スルモノトス.

$\rho = 0. 1 \cdots\cdots N$ ニ対シテ $\lim_{i\to\infty} \nabla_n^i(z) \equiv 0$ ヨリ

$$\int_{K_n^\rho} \frac{\partial \nabla_n^i(z)}{\partial n}\, ds < \frac{\varepsilon}{A}$$

トオキテヨイコトガ容易ニ分ル.

以上ト (3) 式ヨリ

$$\frac{\varepsilon}{A}\sum_{\rho=0}^{\rho=N} \log\frac{1}{m_\rho} + C\sum_{\rho=N+1}^{N^i} \log\frac{1}{m_\rho} > 2\pi$$

然ルニ $\sum_{\rho=0}^{\rho=N} \log\frac{1}{m_\rho} < A$,

$$\sum_{\rho=N+1}^{N^i} \log\frac{1}{m_\rho} < \sum_{\rho=N+1}^{\infty} \log\frac{1}{m_\rho} < \frac{\varepsilon}{C}$$

以上ヨリ

$$\frac{\varepsilon}{A}\cdot A + C\cdot\frac{\varepsilon}{C} > 2\pi \qquad \therefore\ \varepsilon > \pi$$

コレハ不都合ナリ、故ニ $\sum \log\frac{1}{m_\rho}$ ハ発散ス.

(6) $\log\frac{1}{M_\rho}$, $\log\frac{1}{m_\rho}$ ハ $\log\frac{1}{|S_\rho(z)|}$ ノ K_n 上ニ於ケ

ル最小，最大値デ依存ハ $\rho \neq 0$ ノトキ K_n ノ内部デ調和函数ナル故，ρ ニ無関係ナ常数 δ（$0 < \delta < 1$）ガ存在シ

$$\frac{1}{\delta} \log \frac{1}{|S_\rho(0)|} > \log \frac{1}{m_\rho} > \log \frac{1}{M_\rho} > \delta \log \frac{1}{S_\rho(0)}$$

故ニ第一型ノトキハ $\sum_{\rho=1}^{\infty} \log \frac{1}{S_\rho(0)}$ ハ発散ス．

第二型ノトキハ　　収斂ス．

第一型ノトキ $\int \frac{\partial W_n(z, z_0)}{\partial n} ds = 2\pi$ ヨリ

$$\frac{1}{2\pi R_0} \int_{K_0} W_n(z, z_0)\, ds = \log \frac{R_0}{R_n}$$

以上ノコトヨリ Harnack ノ定理ニヨリ $n \to \infty$ ノトキ $W_n(z, z_0)$ ハ恒等的ニ ∞ トナル。

第二型ノトキ $u(z, z_0)$ ヲ z_0 ヲ Pole ニモツ単位円ノ Green 函数トス．

$$u(z, z_0) > u_n(z, z_0)$$

$$\therefore \quad u(z, S_\rho(z_0)) > u_n(z\ S_\rho(z_0))$$

$$\log \frac{1}{|S_\rho(z_0)|} = u(0, S_\rho(z_0)) > \frac{1}{2\pi R_0} \int_{K_0} u_n(z, S_\rho(z_0))\, ds$$

$S_\rho(z_0) \neq 0$ トナル z_0 ニ対シテハ $\sum \log \frac{1}{|S_0(0)|}$ ノ収斂ヨリ Harnack ノ定理ニヨリ $\sum \log \frac{1}{|S_\rho(z_0)|}$ ノ収斂スル事

ヲ知ル。

$$\therefore \quad \sum \log \frac{1}{|S_p(z_0)|} > \frac{1}{2\pi R_0} \sum \int_{K_0} u_n(z, S_p(z_0))\, ds$$

$$= \frac{1}{2\pi K_0} \int_K W_n(z, z_0)\, ds$$

上式ヨリ Harnack ノ定理ニヨリ $n \to \infty$ ノトキ $W_n(z, z_0)$ ガ調和函数 $W(z, z_0)$ ニ一様収斂スルコトヲ知ル。

$S_p(z_0) \neq 0$ ノトキ $\sum u(0, S_p(z_0)) = \sum \log \frac{1}{|S_p(z_0)|}$ ハ収斂ス。

故ニ Harnack ノ定理ニヨリ $\sum_{p=0}^{\infty} u(z, S_p(z_0))$ ハ存在ス。

$$u(z, S_p(z_0)) > u_n(z, S_p(z_0))$$

$$\therefore \quad \sum_{p=0}^{\infty} u(z, S_p(z_0)) > \sum_{p} u_n(z, S_p(z_0)) = W_n(z, z_0)$$

$$\therefore \quad \sum u(z, S_p(z_0)) \geqq W(z, z_0) \cdots\cdots (4)$$

他方 $\lim_{n\to\infty} u_n(z, S_p(z_0)) = u(z, S_p(z_0))$ ナルコトヲ容易ニ知ル。

故ニ $n \geqq n_0$ ノトキ N ヲ充分大キナ正ノ整数，ε ヲ任意ノ正数トスレバ

$$u(z, S_p(z_0)) - u_n(z, S_p(z_0)) < \frac{\varepsilon}{N}$$

$$(\rho = 0, 1, 2, \cdots\cdots N)$$

$$\therefore \quad \sum_{\rho=0}^{N} u_n(z, S_\rho(z_0)) > \sum_{\rho=0}^{\rho=N} u(z, S_\rho(z_0)) - \varepsilon$$

一方 $$W(z, z_0) \geqq \sum_{\rho=0}^{\rho=N} u_n(z, S_\rho(z_0))$$

$$\therefore \quad W(z, z_0) \geqq \sum_{\rho=0}^{\rho=N} u(z, S_\rho(z_0)) - \varepsilon$$

$$\therefore \quad W(z, z_0) \geqq \sum_{\rho=0}^{\infty} u(z, S_\rho(z_0))$$

(4) ト上式ヨリ

$$W(z, z_0) = \sum_{\rho=0}^{\infty} u(z, S_\rho(z_0)) = \sum \log \frac{|1 - z S_\rho(z_0)|}{|z - S_\rho(z_0)|}$$

第 二 章

第一章ノ第一型，第二型ハフックソイド群ニ依ラズモノデ K_n ノトリカタニハ無関係デアルコトガ分リマス。

コノ第一章ノ結果ヲ利用シ，先ヅ Nevanlinna[1] ノ Beschränktartig Gebiet ノ理論ヲ平面上ニ限ラズ hyperbolische Riemann Mnanifaltigkeit[2]

---

(1) Nevanlinna Eindentige Analytische Frinktionein P. 201 — 206

(2) Koebe Acta Math 1926 — 1927

ニ擴張致シマス。然シ以下ニテハ Fundamental group ハ楕円的変換ヲモ含ム一般ノ型ニテ論ジテ見タイト思ヒマス。

Riemann 面デノ Hauptuniformisierende ニ関スル群Γニツイテ第一型，第二型トイフノハ言ヒ換ヘレバ，ソノ Riemann 面上ニ Green 函数ガ存在セザルカ又ハ存在スルコトニナル譯デス。

更ニコノ章ニテハ混雑ノ恐ナキ限リ前章ノ記号及ビ假定ヲ使用スルコトニ致シマス。

(1) 補助定理

フクシイド群ガ第一型ノトキ，有界ナ調和函数 $u(z)$（但シ必ズシモ $u(z)$ ハ Γ ニ関シテ Automorphic トハ限ラズ）ガ存在シ

K_n^p 上デ　$u(z) \geqq 0$　ナラバ

単位円内ノ D_n 内ガ常ニ　$u(z) \geqq 0$ ナリ。

コヽニ D_n ハ K_n^p ($p=0, 1, 2, \cdots\cdots$) ト単位円デ境界サレタ領域ヲ表ハス。

証明

$|u(z)| \leqq M$ トス　但シ M ハ有界ナ常数

前章ノ $w_n^i(z)$ ヲ用ヒテ D_n^i デ次ノ調和函数ヲ考ヘル。

$$U(z) = \frac{u(z)+M}{M} - w_n^i(z)$$

D_n^i ノ境界ニテ $U(z) \geqq 0$ ナルコトヲ知ル。

故ニ D_n^i 内ニテ

$$\frac{u(z)+M}{M} \geqq w_n^i(z)$$

上式ハ i ノ如何ニ関セズ成立スル故 $i \longrightarrow +\infty$ トスレバ

Γ ガ第一型ナルコトヨリ $\lim_{i\to\infty} w_n^i(z) \equiv 1$

$$\therefore \quad \frac{u(z)+M}{M} \geqq 1$$

$$\therefore \quad u(z) \geqq 0$$

定理1.

Γ ガ第一型ノ群ナルトキハ Γ ノ有界ナ常数ナラザル automorphic ナ調和函数ハ存在シ得ナイ。

証明

假定ニ反スル $u(z)$ ガ存在スルモノトス。

$|u(z)| \leqq M$ トス。

$u(z)$ ニ常数ヲ加減シテ m ヲ充分小ナル正数トスルトキ $u(z)$ ハ $(-m, m)$ ノ間ノ値ヲスベテトルモノト假定シテモ一般性ヲ失ハズ、且ツ $m \leqq M$ トス。

$u(z)$ ガ σ_0 内ノ一点 z_0 ニテ $u(z_0)=0$ トス。

z_0 ノ近クニ充分小サイ円 K ヲトリソノ周上ニテ $u(z) \geqq 0$ ナル如クナラシメ得。

円 K ノ中心ガ原点ナラザルトキハ適當ナ單位円ヲ自分自身ニ移ス一次変換ヲ施シ原点ニ移ス、然ルトキ第一型、

第二型ノ型ハ不変ナル K_n ヲ K_n ト考ヘテ論ジテヨロシイ。

故ニ補助定理ヨリ D_n 内デ $u(z) \geqq 0$ トナル。

$u(z)$ ハ $K_n(K)$ 周上デ $u(z) \geqq 0$ 中ニテ調和ナル故内部ニテモ $u(z) \geqq 0$

故ニ K_n^{ρ} ノ内部周上デ常ニ $u(z) \geqq 0$

然ルニ $u(z)$ ハ $(-m, 0)$ ノ値ヲトル故コレハ明ラカニ不合理ナリ。

故ニ Γ ノ有界ナ常数ナラザル automorphic ナ調和函数ハ存在セズ。

次ノ系ヲ得。

系1. Hyperbolische Riemannsche Mannigfaltigkeit ノ上ニ Green 函数が存在セザレバソノ上デ有界ナ調和函数ハ存在セズ。

故ニ

系2. 開ケタ Riemann 面上ニテ有界ナ調和函数ハ存在セズ。

連結度ガ3又ハ3ヨリ大ナレバ Hyperbolish Riemann Mannifaltigkeit ナル故 Nevanlinna ノ定理.

系3. Nicht Beschränktartig Gebiet ノ上ニハ有界ナ調和函数ハ存在セズ。

系4. Hyperbolish Riemann Mannifaltigkeit ノ上ニテ有界ナ調和函数ガ存在スレバ Green 函

数が存在ス。

定理2. $v(z)$ ヲフックソイド群 Γ ニ属スル Automorphic function トス。$T(r, v) = O(1)$ ナラバ Γ ガ第二型ナリ。

証 $T(r, v) = O(1)$ 故ニ $N(r, a) = O(1)$

$v(z)$ ノ a 点ノ内一ツノ基本領域内ニ存在スル任意ノ一ツヲ z_0 トス。

然ルトキ $v[S_p(z_0)] = v(z_0) = a$

故ニ $S_p(z_0)$ モ亦 a 点ナリ。

$N(r, a) = O(1)$ ナル故 $v(z)$ ノ a 点ノ全体ヲ $z_0, z_1, \cdots\cdots, z_n \cdots\cdots$ トスレバ

$$\sum \log \frac{|1-\bar{z}_n z|}{|z-z_n|}$$ ハ (z_n) ヲ除キ収斂ス

然ルニ $$\sum \log \frac{|1-\bar{S}_p(z_0) z|}{|z-S_p(z_0)|} < \sum \log \frac{|1-\bar{z}_n z|}{|z-z_n|}$$

故ニ $W_n(z)$ ガ存在シ第二型ナリ。

定理3.

$v(z)$ ハ Γ ノ Automorphic function デ次数（基本領域デ $v(z)$ ガ或ル値ヲトル回数）ガ有限ナラバ，

Γ ガ第一型ナルカ，第二型ナルカニ従ヒ $T(r, v)$ ハ $r \to 1$ ノトキ ∞ ナルカ $O(1)$ ナリ。

証．定理2ヲ用ヒテ容易ニ証明シ得ル故省略ス、次数ガ1ノトキ Nevanlinna ノ定理ヲ含ム訳デス。

定理4.

T が第一種ナラバ Automorphic function $v(z)$ ノ Picard 意味ノ除外値ハ Capacity 0 ナリ。

証 高々可回トラレル a ノ集合ヲ E_n トスレバ E_n ノ内 Capacity が正ナルモノガ少クトモ一ツ存在ス. コノ E_n ニ関スル Robin ノ問題ニ對スル Mass 分布函數ヲ μ トスレバ

$$T(r,v)=\int_{E_n} N(r,a)\,d\mu+O(1) \qquad 但シ \int_E d\mu=1$$

a ガ E_n ニ属スレバ $N(r,a)$ ハ一様有界ナル。

故ニ $T(r,v)=O(1)$

故ニ定理2ヨリ T ハ第二型ナリ假定ニ反ス。

定理5ヲ証明スルタメ次ノ補助定理ヲ Privaloff ノ方法ニヨリ証明シマス。

補助定理

$|z|<1$ デ $f(z)$ ハ有理型函數トス。

Winkel grenzwert

$$\lim_{z\to e^{i\varphi}} f(z)=f(e^{i\varphi})=0$$

ナル φ ノ集合ヲ E トスルトキ $m(E)>0$ ナラバ

$$f(z)\equiv 0$$

証明 $f(z)\not\equiv 0$ トス。

E上ノ点 $Z_0 = e^{i\varphi_0}$ ニ於テ単位円ト 45° ヲナス二ツノ弦ヲヒキ，次ニ Z_0 中心トシ $\frac{1}{n}$ ヲ半径トスル円ヲ作リ出来タ扇形内ニテ

$$f_n(Z_0) = Max\,|f(z)|$$

然ルトキ $f_1(Z_0)$, $f_2(Z_0)$, ····· $f_n(Z_0)$ ····· ハE上デ0ニ収斂スル故 Egoroff ノ定理ニヨリE ノ部分集合 $\overline{E}$ ニテ一様収斂ナラシメ得，且ツ $m(\overline{E}) > 0$

$\overline{E}$ ノ点ヲ頂点トシ単位円ト 45° ヲナス一弦ヲヒキ出来タ領域ヲDトス。

D内ニハ $f(z)$ ノ Pole ノ数ハ有限個ナリ。ナントナレバ Pole ノ数ガ無限個ナラバ集合 $\overline{E}$ ノ外ハDノ境界ハ単位円内ニ在ル故 $\overline{E}$ ノミー集積点ヲ持チ得ル。然ルニ $\overline{E}$ ノ点デ Grenzwert 0 ナル故コレヲ不可能ナリ。故ニD内ノ Pole ノ数ハ有限個ナリ。

故ニ適当ナ整式ヲカケテ Pole ヲ除去スル、ソノトキ $\overline{E}$ ニ於ケル Grenzwert ハヤハリ0ニナル、コノ函数ヲアラタメテ $f(z)$ トス。

Dヲ単位円 ($|Z| < 1$) ノ内部ニ一対一ニ等角ニ移ス $f(z)$ ハ $F(Z_1)$ ニ，$\overline{E}$ ハ E' ニ移ルモノトス。

$m(\overline{E}) > 0$ ナル故 Riesz ノ定理ニヨリ

$$m(E') > 0.$$

$f(z)$ ハDノ境界ヲ含メテ連続ナル故 $F(Z)$ ハ $|Z| \leqq 1$ ニテ連続ナリ

故ニ $|Z|\leqq 1$ デ $|F(Z)|<1$ ト假定シ得.

(1) $F(Z)$ が0点ヲ有セザルトキ

$\log|F(Z_1)| = U(r,\theta)$ トス. 但シ $Z = re^{i\theta}$

$$U(r,\theta) = U_\rho(r,\theta)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} U(\rho,\alpha)\frac{\rho^2-r^2}{\rho^2+r^2-2\rho r\cos(\theta-\alpha)}\,d\alpha$$

但シ $\rho > r$

$U(\rho,\alpha)<0$ $\quad \dfrac{\rho^2-r^2}{\rho^2+r^2-2\rho r\cos(\theta-\alpha)} > \dfrac{\rho-r}{\rho+r}$

故ニ $\rho \to 1$ ノトキ E' 上ノ α ニ対シテハ一様ニ $U(\rho,\alpha)$ $\longrightarrow -\infty$

$\therefore\quad U(r,\theta) = -\infty$

トナリ不合理ナリ。

(2) $F(Z)$ が零点ヲ有スルトキ

ρ ヲ適當ニトリ原点ヲ中心トシ ρ ヲ半径トスル円周 C_ρ 上ニハ零点ガナイ様ニスル。

$$U(r,\theta) = U_\rho(r,\theta) + V_\rho(r,\theta) \qquad \rho > r$$

V_ρ ハ C_ρ 上デ0, C_ρ ノ内部ニテ $F(Z)=0$ トナル点ノミニテ $-\infty$ トナル。

ρ ノ上ノ條件ノモトニ於ケルト(1)ノトキ同様 $-\infty$ トナル、コレモ不合理ナリ。

故ニ $\quad F(Z)\equiv 0 \qquad \therefore\ f(Z)\equiv 0$

定理5. Γ ガ第一種ナラバ Γ ノ automorphic

function ヲ $v(z)$ トスレバ Winkelgrenz-wert

$$\lim_{z \to e^{i\varphi}} v(z) = v(e^{i\varphi})$$

ガ存在スル φ ノ集合ヲ E トスレバ $m(E) = 0$ ナリ。

(注意) Iversenlinna ノ p. 204 ノ証明ト殆ンド平行ニ行ヘマス。便利上二段ニ分ッテヤリマス。

証.

(一段) $0 < m(E) < 2\pi$ ナラバ

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_E \frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos(\vartheta-\varphi)} d\vartheta \quad (z = re^{i\varphi})$$

ヲ考ヘルト

$u(z)$ ハ $0 \leqq u(z) \leqq 1$ ナル常数ナラザル調和函数ニナル。

Γ ノ要素 S ヲ E ニ施セバ $v(z)$ ガ Automorphic function ナル故 $S(E)$ ニテモ Winkelgrenz-wert ガ存在ス.

然ルニ E ハ Winkel grenzwert ノ存在スル全体ノ集合ナル故 $E = S(E)$ ナリ。

被積分函数モ S ヲ施セバ同様ノ函数ニナル故 $u(z)$ ハ Automorphic ナ調和函数トナル。Γ ガ第一種ナラバ定理 (1) ニ依リ有界ナ調和函数ハ存在セズ、コレハ不合理ナリ。故ニ $m(E) = 0$ カ又ハ $m(E) = 2\pi$ ナリ。

(二段) Γ ニヨリ不変ナ集合 E ガ単位円周ニ存在シ、

$0 < m(E) < 2\pi$ ナラバ一段ノ証明ニ帰スルコトガ出来ル故 $m(E) = 2\pi$ ナルトキ，カヽル集合ノ存在ヲ証明スレバ証明ハ完了スル訳デス。

$m(E) = 2\pi$ トス。

$v(z) = \sigma + it$ トス。

$$\frac{m}{p} \leqq \sigma < \frac{m+1}{p}, \qquad \frac{n}{p} \leqq t < \frac{n+1}{p}$$

$(m, n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots\cdots)$

ナル正方形ヲ $Q(m, n, p)$ トス。

$v(z)$ ノ Winkel grenzwert ガ $Q(m, n, p)$ ノ中ニ入ル φ ノ集合ヲ $\varphi_{m,n,p}$ トス。

$p = 1, 2, \cdots\cdots$ ト変ヘルトキ $\varphi_{m,n,p}$ ノ集合ノ測度ガ 0 ト 2π ノ間ニ在ルモノガ存在ス。

然ラズトスレバ p ノ人ベテニ対シ $\varphi_{m,n,p}$ ノ集合ノ測度ハ 2π デ $Q(m, n, p)$ ハ順次ニ含マレテ共通点ヲ有スルコトニナル。

然ルトキ $v(z)$ ハ $|z| = 1$ 上デ測度 2π ノ集合上デ Winkel-grenzwert v_0 ヲ有スルコトニナル。

然ラバ Painlevé 定理ヨリ $v(z) \equiv v_0$ トナル。

コレ仮定ニ反ス。

依ッテ $\varphi_{m,n,p}$ ノ測度ヘ 0 ト 2π ノ間ニアリ、問題ノ E ナルコトヲ容易ニ知ル。故ニ $m(E) + 2\pi$

$\therefore \quad m(E) = 0$

定理6

$\psi(z)$ が Γ ノ Automorphic function デ次数が有限ナラバ Γ ガ第一型，第二型ナルニ従ッテ Winkel-Grenzwert ノ存在スル集合ハ測度 0 又ハ 2π ナリ．

証．　定理3，定理5 ヨリ簡単ニ証明シ得．次数が1ナルトキハ Nevanlinna ノ定理ヲ含ムモノトナル。

前後シマスガ次ノ系ヲノベテオキマス。

定理4ヨリ

系5．　Green 函数ノ存在セザル Riemann 面上ノ有理函数ハ Capacity 0 ノ値ヲ除イテスベテトル．

全平面ノ有理型函数ノ Picard ノ定理ノ或ル方面ヘノ拡張カト思ヒマス。

定理6ノ系トシテ

系6．　Geschlecht p ガ有限ナル開ケタ Riemann 面ニ含マレル Riemann 面ヲRトス。

Rノ境界ガ存在スルモノトシ，ソレソレトスレバEハRノ Hauptuniformisierende ニヨリ

Green 函数ガ存在スルカ，然ラザルカニ依リ単位円周上ノ測度 2π 又ハ 0 ナル集合ニ写像サレル。

一般ノ境界ニツイテ定義ソノ他ノ事項ヲ要シマスノデモウ少シ考ヘテカラ発表シタイト思ヒマス。

ソノ内ノ一部分トシテ次ノ事ハ言ヘマス。

系7．　Riemann 面Rガ他ノ Riemann 面Rニ

(Geschlecht p ハ有限ト限ラズ) 合マレ R ノ境界ガ R' ノ内点デアルトス。

然ルトキ R' ニ関スル Green 函数ガ存在セザレバ Hauptuniformisierende ニヨリソノ境界ハ単位円周上ノ測度0ナル集合ニ寫像サレル。

Orthosymmetrische Riemann Fläche R ノ Symmetrische ナ半分ヲ R' トシ，Rデ Green 函数ガ存在シナイトキハ，モット正確ニ次ノ如ク言ヘマス。Hauptuniformisierende ノ群ノ limit Point ノ集合ハ Capacity 0 ナリ．擴張サレタ Schottky Type ノ問題ニツイテモ同様ナコトガ言ヘマス。

証明ハ後ノ発表（第二報カ又ハ第三報）ニノセタイト思ヒマス。

誤リ訂正

代数曲線ノ Uniformisation ニツイテ（其ノ三）ニ於テ $p=1$ ノトキツイヲナシテ Riemann 面上ノスベテノ値ヲトルト云フノハ誤リデーッヲ除イテスベテノ値ヲトルト訂正シマス。