OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	或ル種ノ函數方程式ニ就イテ
Author(s)	春木, 博
Citation	全国紙上数学談話会. 1943, 259, p. 585-596
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/75088
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

1155 或ル種ノ函數方程式ニ就イテ

春木 亨（神戸高等商船學校）

先ヶ本誌257号1144ニ於ケル拙文「或ル種ノ函數方程式及ビ函數不等式ニ就イテ」ニ於ケル訂正ヲサセテ戴キマス。

486頁下カラ11行目〝次ニf(x)ガ原点ノ近傍ニ於テ〟ヲ〝次ニf(x)ガx=1ノ近傍ニ於テ〟ト訂正シ，487頁上カラ7行目〝原点ノ適當ナ近傍ニ於テ〟ヲ〝x=1ノ適當ナ近傍ニ於テ〟ト訂正シマス。又495頁下カラ5行目〝f(x,0)=x^α〟ヲ〝f(x,0)=x^α，又ハf(x)=sign(x)x^α〟ト訂正シマス。之ハ以下ノ結果ニハ影響シマセン。

以下、断片的デハアルガ、種々ノ函數方程式ニツイテ述ベサセテ頂キマス。

§1. f(z)ガ有限平面上、|z|<+∞ニ於テ定義サレタ一價複素數値函數ニシテ、原点ニ於テ連續ナリトスルトキ次ノ函數方程式ニ適スルモノヲ求メヨウ。但シaハ|a|<1ナル任意ノ複素常數ナリトスル。

(1)　$f(z)=(1+az)f(az)$

(1)ヨリ任意ノ自然數nニ對シテ

$$f(z)=f(a^n z)\prod_{k=1}^{n}(1+a^k z)$$

n→∞ナラシムレバ、f(0)ハ原点ニ於テ連續デ|a|<1ナル故

$$f(a^n z) \longrightarrow f(0) = C$$

又右辺ノ無限乗積ハ $|z|<+\infty$ ニテ絶對收斂セル故

$$f(z)=C\prod_{k=1}^{\infty}(1+a^k z)=C\left\{1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^{\frac{n(n+1)}{2}}}{(1-a)(1-a^2)\cdots\cdots(1-a^n)}z^n\right\}$$

茲ニ C ハ任意ノ複素常數ナリトスル。

コノ函數ハ Euler ニ依ッテ論ゼラレタ函數デアル。

§2. $f(z)$ テ ガウス平面上、$|z|<1$ ニテ定義サレタル一價複素數値函數ニシテ、原点ニ於テ連續ナリトスルトキ、次ノ函數方程式ニ適スルモノヲ求メヨウ。

(2) $f(z)=(1+z)f(z^2)$

(2) ヨリ任意ノ自然數 n ニ對シテ

$$f(z)=f(z^{2^n})\prod_{k=1}^{n}(1+z^{2^{k-1}})$$

コノ兩辺ニ於テ、$n\longrightarrow+\infty$ トラシムレバ $f(z)$ ハ原点ニ於テ連續ニシテ $|z|<1$ ナル故、$f(z^{2^n})\longrightarrow f(0)=C$

又 $\prod_{k=1}^{n}(1+z^{2^{k-1}})\longrightarrow\frac{1}{1-z}$ ナル故(Euler ニ依ッテ知ラレタ式)

$$f(z)=\frac{C}{1-z}$$

茲ニ C ハ任意ノ複素常數ナリトスル。

§3. $f(x)$ ハ $-\infty<x<+\infty$ ニテ定義サレタル一價實數値函數ニシテ、$f(0)=0$ デ、$f(x)$ ハ原点デ、微分可能ナリトスルトキ、次ノ函數方程式ニ適スルモノヲ求メテ見ヨ.

但シ $\varphi(x)$ ハ既知函数デ、$-\infty < x < +\infty$ ニテ定義サレタ一価実数値函数ニシテ、無限乗積 $\prod_{n=1}^{\infty} \varphi\left(\frac{x}{2^n}\right)$ ハ $-\infty < x < +\infty$ ニテ収斂スルモノトスル。

(3) $\quad f(2x) = 2f(x)\varphi(x)$

(3)ニ於テ、x ノ代リニ $\frac{x}{2}$ トオケバ $\quad f(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right)\varphi\left(\frac{x}{2}\right)$

之レヨリ任意ノ自然数 n ニ対シテ

$$f(x) = 2^n f\left(\frac{x}{2^n}\right)\prod_{k=1}^{n}\varphi\left(\frac{x}{2^k}\right)$$

故ニ $x \neq 0$ トスレバ

$$f(x) = \frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\frac{x}{2^n}} x \prod_{k=1}^{n}\varphi\left(\frac{x}{2^k}\right)$$

コノ両辺ニ於テ $n \to +\infty$ トラシムレバ $f(0) = 0$ ニシテ $f(x)$ ハ原点ニ於テ微分可能ナル故

$$\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\frac{x}{2^n}} \to C$$

故ニ $\quad f(x) = Cx\prod_{n=1}^{\infty}\varphi\left(\frac{x}{2^n}\right)$

C ハ任意ノ実常数トシテヨイ。

以上ハ $x \neq 0$ トシタガ、之ガ $x = 0$ ニテモ成立スルコトハ明カデアル。逆ニ、之ガ(3)ヲ満足セシトルコトハ容易ニ証明サレル。

$\varphi(x) = \cos x$ トスレバ、ヨク知ラレタ Euler ノ

関係式カヲ

$$f(x)=c\sin x$$

トナル。

§4. $f(x)$ が $-\infty<x<+\infty$ ニテ定義サレタ一様可測實函數ナリトスルトキ、次ノ函數方程式ヲ滿足セシメルモノハ、$f(x)\equiv 0$, $f(x)=\cos\lambda x$, $f(x)=\cosh\lambda x$ ニ限ルコトヘヨク知ラレテヰル。茲ニ λ ハ任意ノ實數トスル。

$$(4)\quad f(x)+f(y)=2f\left(\frac{x+y}{2}\right)f\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

次ニ (4) ニ幾何學的意味ヲ附ケテ見ヨウ。



今球面 O 上ニ、球面三角形 ABC ヲ考ヘ、辺 BC ノ中点ヲ D トスレバ

$$\cos b+\cos C=2\cos\tfrac{1}{2}a\cos AD$$

ナルコトハヨク知ラレテ居ル。茲ニ勿論 a, b, C ハ夫々三辺ノ張ル中心角デ AD トハ大円弧 AD ノ張ル中心角 $\angle AOD$ ヲ意味スル。コノ定理ハ平面幾何學ニ於ケル Pappus ノ定理ニ當ルモノデアル。

今球面 O 上ノ一点 A ヨリ、ヴエクトル $\overrightarrow{AB}$ (y デアラハス) ヴエクトル $\overrightarrow{AC}$ (xy デアラハス) ヲ引キ、球面トノ交点ヲ夫々 BC トスル。



球ノ弦BCノ中点ヲMトシOMノ延長ガ球面ト交ヘル点ヲDトスレバ、Dハ大円弧BCノ中点トナル。ヴェクトル$\overrightarrow{AM}$ハ$\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}$デ表ハサレ、ヴェクトル$\overrightarrow{MB}$ハ$\frac{\vec{b}-\vec{c}}{2}$デ表ハサレル。

今、ヴェクトルヲ変数トスル実数値函数$f(\vec{b})$ヲ考ヘ、ヴェクトル$\vec{b}$ノOニ於テ張ル中心角ヲθトシ$f(\vec{b})=\cos\theta$トオケバ、上記球面三角法ノ定理ニヨリ、$f(\vec{b})=\cos\theta$ハ(4)ヲ満足セシメルコトガ判ル。

§5. 二次元 Euclid 平面上ノ任意ノ三角形ヲABCトシ、BCノ中点ヲDトスレバ

$$AB^2+AC^2=2AD^2+2BD^2$$

ガ成リ立ツ。之レハ Pappus ノ定理ト呼バレ、有名ナモノデアル。

之ヲ複素数ヲ用ヰテ書ケバ

$$|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2|z_1|^2+2|z_2|^2$$

ト書ケル。以下点ヲアラハス=、複素数ヲ用ヰルコトニスル。

今一点A(複素数$Z=x+iy$デアラハス)ノ Norm ノ平方根(原点トノ距離)ヲ$\rho(z)$ニテ表ハシ、二点P(複

素數Z_1デ表ス），Q（複素數Z_2デ表ス）ノ距離ヲ$\varphi(Z_1-Z_2)$デ定義シタ場合、Pappus ノ定理ヲ満足スル距離函數$\varphi(Z)^{Z_2}$ハ如何ナルモノカヲ考ヘヨウ。但シ$\varphi(Z)$ハx, yニツイテ夫々可測ナリトスル。

之ハ結局$\varphi(Z)$ガ、ガウス平面上，$|Z|<+\infty$デ定義サレタ一價可測實函數トシタトキ、次ノ函數方程式ニ適スル（距離函數）$\varphi(Z)$ヲ求ムルコトトナル。

(5) $\varphi^2(Z_1+Z_2)+\varphi^2(Z_1-Z_2)=2\varphi^2(Z_1)+2\varphi^2(Z_2)$

之ハ本誌257号1144デ論ジタコトニヨリ

$$\varphi(Z)=\sqrt{ax^2+bxy+cy^2}$$

トナル。但シ$\varphi(Z)$ハ距離函數ナル故$a>0$, $b^2-4ac<0$ナルコト勿論デ之ガアレバ、距離函數ノ條件ヲ満足サセルコトガ判ル。

更ニPhythagoras ノ定理ヲ満足スルコトヲ假定スレバ 結局ニ$\varphi(Z)=\sqrt{ax^2+bxy+ay^2}$ $(a>0, b^2-4a^2<0)$トナルコトガ判ル。

更ニ、第三番目ノ條件トシテ線分ABノ垂直二等分線上ノ点ハA,Bヨリ等距離ニアルコトヲ假定スレバ$\varphi(z)=\sqrt{a(x^2+y^2)}$（$a>0$）トナル。

§6. 本誌第257号1144ニテ

(6) $\varphi(xZ-yu, xu+yZ)=\varphi(x,y)\varphi(Z,u)$

ノ連續解トシテ

$$\varphi(x,y)=(x^2+y^2)^{\alpha} \quad (\alpha\geqq 0)$$

ヲ得ルコトヲ論ジタ。

次ニ、平面上ノ点ヲ複素数 $Z=x+iy$ ニテ表ハシタ場合。

$\varphi(Z)=\varphi(x,y)$ ヲ距離函数トシテ眺メヨウ。(6)ナル関係。（即チ複素数ノ絶対値ニ関スル性質 $|Z_1Z_2|=|Z_1||Z_2|$ ヲ云ヒ換ヘタ関係）ヲ充セバ、常数ナラザル距離函数ハ $\varphi(Z)=(x^2+y^2)^\alpha=|Z|^{2\alpha}$ $(\alpha>0)$ デアルコトハ所論ニヨリ明ラカデアル。コンデ距離ノ三公理ヲ充ス條件トシテノ $\geqq\alpha>0$ ナルコトヲ注意シナケレバナラナイ。

サテ、コノ距離付ケニヨッテモ、平面幾何學ニ於ケル次ノ定理ガ成立スル。

(定理) 平面上ノ任意ノ四点ヲ A, B, C, D トシタトキ

$$\overline{AB}\cdot\overline{CD}+\overline{AD}\cdot\overline{BC}\geqq\overline{AC}\cdot\overline{BD}$$

(証明) A, B, C, D ヲ夫々複素数 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 デ表ハセバ次ノ恒等式ガ成立スル。

$$(Z_1-Z_2)(Z_3-Z_4)+(Z_2-Z_3)(Z_1-Z_4)=(Z_1-Z_3)(Z_2-Z_4)$$

コノ両辺ノ（φ ニヨル）距離ヲトリ $\varphi(Z_1Z_2)=\varphi(Z_1)\varphi(Z_2)$, $\varphi(Z_1+Z_2)\leqq\varphi(Z_1)+\varphi(Z_2)$ ナル性質ヲ用キレバ、定理ハ証明サレル。

サテ、次ニコノ距離付ケ $\varphi(Z)$ ガ普通ノ Euclid ノ距離付ケトナルタメニハ、即チ $\alpha=\frac{1}{2}$ トナルタメニハ、次ノ四條件ノ中、ドレカーツヲ附加スレバヨイ。條件 (A) ニツイテハ、本誌257号1144ニ於テ論ジタ。証明ハ イヅレモ、計算ニヨリ $\alpha=\frac{1}{2}$ トナルコトガ容易ニ云ヘル。

(條件A)　$\varphi(1+i)=\sqrt{2}$

(條件B)　一直線上ノ三点ヲ順次ニA,B,Cトシタトキ

$$\overline{AB}+\overline{BC}=\overline{AC}$$　(Chasles ノ関係)

(條件C)　一直線上ノ四点ヲ順次ニA,B,C,Dトシタトキ

$$\overline{AB}\cdot\overline{CD}+\overline{AD}\cdot\overline{BC}=\overline{AC}\cdot\overline{BD}$$

(Euler ノ定理)

(條件D)　一ツノ円ニ内接スル四辺形ヲABCDトシタトキ　$\overline{AB}\cdot\overline{CD}+\overline{AD}\cdot\overline{BC}=\overline{AC}\cdot\overline{BD}$

(Ptolemy ノ定理)

(條件D)ハ前述ノ定理ニ於テ等号ノ成立スル場合デアル。

§17.　一直線上ノ任意ノ三点ヲA,B,Cトシタトキ、A,B,Cノ重心ヲGトスレバ

$$\overline{AB}^2+\overline{BC}^2+\overline{AC}^2=3(\overline{AG}^2+\overline{BG}^2+\overline{CG}^2)$$

トナルコトハヨク知ラレヲリル。

今$f(x)$ヲ$-\infty<x<+\infty$ニテ定義サレタ一價連續函數ナリトスルトキ、上記定理ヲ函數方程式ニテ表ハシタ次ノ(ロ)ナル式ヲ滿足スル函數$f(x)$ヲ求メテ見ヨウ。

(ロ)　$$f(x-y)+f(y-z)+f(x-z)=3\left\{f\left(\frac{x+y+z}{3}-x\right)+f\left(\frac{x+y+z}{3}-y\right)+f\left(\frac{x+y+z}{3}-z\right)\right\}$$

(ロ)ニ於テ$x=0,\ y=0,\ z=0$トオケバ　$f(0)=0$

(ロ)ニ於テxノ代リニ$x-y$、yノ代リニ$y-z$、zノ代リニ$z-x$トオケバ

$$f(x-2y+z)+f(y+x-2z)+f(2x-y-z)$$
$$=3f(-x+y)+3f(z-y)+3f(x-z)$$

上式ニ於テ $z=0$ トオケバ

(A) $$f(x-2y)+f(x+y)+f(2x-y)$$
$$=3f(-x+y)+3f(-y)+3f(x)$$

(A) ニ於テ $y=0$, $y=x$ トオケバ $f(0)=0$ ナル故、夫々

$$f(2x)=f(x)+3f(-x)$$
$$f(2x)=2f(x)+2f(-x)$$

ヲ得ル。

之レヨリ

$$f(x)=f(-x),\quad f(2x)=4f(x)$$

ヲ得ル。

コノ二ツノ式ト (A) トヲ基ニシテ数学的帰納法ヲ用キレバ任意ノ有理数 $\frac{m}{n}$ ニ対シ

$$f\left(\frac{m}{n}\right)=\left(\frac{m}{n}\right)^2 f(1)$$

之ヨリ $f(x)$ ノ連続性ヨリ　$f(x)=ax^2$

並ニ a ハ任意ノ実数デ丁度 $f(1)$ ニ等シ。

§8. 次ニ $f(x)=\int_0^{\pi}\log(x^2-2x\cos\theta+1)\,d\theta$ ナル函数ヲ考察シヨウ。此ノ積分ハ他ノ色々ナ方法デ、以下ニ述ベルヨリモ、モット簡単ナ方法ガ計算出来ルガ、函数方程式ノ一ツノ応用トシテ、以下藤原松三郎先生微積分學第

一巻437P ノ「ヒント」ニ従ッテ述ベル。

先ヅ $f(x)$ ハ $-\infty < x < +\infty$ ニテ定義サレタ x ノ連続函数ナルコトハ容易ニ証サレル。

次ニ $f(-x) = f(x)$ デアル。何者 與ヘラレタ式ニ於テ $\pi - \theta = t$ トオケバ

$$f(x) = \int_{\pi}^{0} \log(x^2 + 2x\cos t + 1)(-dt)$$

$$= \int_{0}^{\pi} \log(x^2 + 2x\cos\theta + 1)\, d\theta = f(-x)$$

又、$f(x^2) = 2f(x)$ デアル。

何者 $2f(x) = f(x) + f(-x)$

$$= \int_{0}^{\pi} \log(x^2 - 2x\cos\theta + 1)\, d\theta + \int_{0}^{\pi} \log(x^2 + 2x\cos\theta + 1)\, d\theta$$

$$= \int_{0}^{\pi} \log(x^4 - 2x^2\cos 2\theta + 1)\, d\theta$$

茲デ、$2\theta = \varphi$ トオケバ

$$2f(x) = \frac{1}{2}\int_{0}^{2\pi} \log(x^4 - 2x^2\cos\varphi + 1)\, d\varphi$$

$$= \frac{1}{2}\left[\int_{0}^{\pi} \log(x^4 - 2x^2\cos\varphi + 1)\, d\varphi + \int_{\pi}^{2\pi} \log(x^4 - 2x^2\cos\varphi + 1)\, d\varphi\right]$$

右ニ1積分ニ於テ、$2\pi - \varphi = t$ トオケバ

$$\int_{\pi}^{2\pi} \log(x^4 - 2x^2\cos\varphi + 1)\, d\varphi$$

$$= \int_{\pi}^{0} \log(x^4 - 2x^2\cos t + 1)(-dt)$$

$$=\int_0^{\pi} \log(x^4-2x^2\cos t+1)\,dt$$

$$\therefore\quad 2f(x)=\int_0^{\pi} \log(x^4-2x^2\cos\theta+1)\,d\theta=f(x^2)$$

故ニ $f(-x)=f(x)$, $f(x^2)=2f(x)$ トルニ式ガ証サレタ。

又 $f(x^2)=2f(x)$ ニ於テ、$x=1$ トオケバ $f(1)=0$

次ニ先ヅ $x>1$ トル場合カラ始メル。$f(x^2)=2f(x)$ ニ於テ $x=e^t$ トル変換ヲシ、且ツ $g(t)=f(e^t)$ トオケバ、$g(t)$ ハ $0<t<+\infty$ ニヲ定義サレタ t ノ一価連続函数デ $g(2t)=2g(t)$, $g(0)=0$ ヲ満足スル。

更ニ $\varphi(t)=\dfrac{g(t)}{t}$ トオケバ $\varphi(2t)=\varphi(t)$ デ $\lim\limits_{t\to+0}\varphi(t)$ $=a$（有限確定値）トルコトモ云ヘル。

$\varphi(2t)=\varphi(t)$ 即チ $\varphi(t)=\varphi\left(\dfrac{t}{2}\right)$ ヨリ任意ノ自然数 n ニ対シ

$$\varphi(t)=\varphi\left(\frac{t}{2}\right)$$

$n\to+\infty$ トスルトキハ $\varphi(t)\equiv a$

$$\therefore\quad g(t)=at$$

$$\therefore\quad f(x)=a\log x$$

故ニ $x>1$ デ

$$\int_0^{\pi} \log(x^2-2x\cos\theta+1)\,d\theta=a\log x$$

両辺ヲ x ニツイテ微分シテ $x=2$ トオケバ $a=2\pi$.

故ニ $x>1$ デ $f(x)=2\pi\log x=\pi\log x^2$

又前項ノ通リ $x=1$ ナラバ $f(x)=0$ ナルコトガ云ヘル。

結局 $x\geqq 1$ デハ $f(x)=\pi\log x^2$

次ニ $0<x<1$ デ $f(x)\equiv 0$ ナルコトヲ証シヨウ。

先ヅ $f(x^2)=2f(x)$ ニ於テ $x=0$ トオケバ $f(0)=0$ ナルコトガ判ル。

又 $f(x)=\frac{1}{2}f(x^2)$ ヨリ任意ノ自然数 n ニ対シ

$$f(x)=\frac{1}{2^n}f(x^{2^n})$$

$n\to\infty$ ナラシムレバ $f(0)=0$ ナルニヨリ $f(x)\equiv 0$

$f(-x)=f(x)$ ヲ使ヘバ結局

$|x|<1$ デハ $f(x)\equiv 0$

$|x|\geqq 1$ デハ $f(x)=\pi\log x^2$

トナル。

——— (完) ———