OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	有理型函數ノ Normal family
Author(s)	井草, 準一
Citation	全国紙上数学談話会. 1944, 263, p. 129-133
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/75111
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

1178　有理型函數ノ Normal family.

東大　井草　準一

1°　領域Dデ定義サレタ有理型函數全体Ω(D)ニ次ノ Metric ヲ導入シマス。

$$\rho(t,g)=\sum_{\nu=1}^{\infty}\frac{1}{2^{\nu}}\frac{\{t,g\}_{\nu}}{1+\{t,g\}_{\nu}}$$

$$\left(\begin{array}{l}\{t,g\}_{\nu}=\sup_{z\in\bar{\Delta}_{\nu}}\{t(z),g(z)\}\\[2ex]\{t,g\}=\dfrac{|t-g|}{\sqrt{(1+|t|^2)(1+|g|^2)}}\\[2ex]\bar{\Delta}_1\subset\bar{\Delta}_2\subset\cdots\subset\bar{\Delta}_{\nu}\subset\cdots\longrightarrow D\end{array}\right)$$

サウスルト Ω(D) ハ complete[1] metric space ニナリマス。並デ Ω(D) ⊃ f(D) デ Ω(D) ニ於テ compact ナ subspace f(D) ヲ normal family ト云フノデアリマス。又 $\zeta\in D$ デ normal family ト云フノデアリマス。又 $\zeta\in D$ デ normal デアルトハ、或ル $U_{f(\zeta)}\subset D$ デ $f(U_{f(\zeta)})$ ガ normal デアル事デアリマス。

次ニ f(D) ノ各函數ハ Riemannsphere ノ上ノ coveringsurface ヲ generate 致シマス。今此ノ coveringsurface ノ class ヲ $\mathfrak{C}_f(D)$ デ表ハス事ニ致シマス。

本論文ノ目的ハ f(D) ガ normal デアル為ンド決定

---

[1] 藤原：幾何函數論（岩波講座）（218頁）

的ナ十分條件ヲ $\mathfrak{R}f(D)$ ノ性質ニ依ツテ characterize スル事ニアリマス。

2° Normal family ニ関スル基礎的ナ性質ハ仮定致シマス。

豫備定理 $f(K)$ $(K=\{z;|z|<R\})$,

$t \notin f(K)$ ニ對シ。

$$A_t(r) \leq h\, L_t(r) \qquad (0 \leq r < R)$$

ナル t ニ無関係ナ常数 h ガ存在スルナラバ、$f(K)$ ハ中心デ normal デアル。

茲ニ $A_t(r)=t$ ヲヨル $|z|\leq r$ ノ像ノ全面積。

$L_t(r)=t$ ヲヨル $|z|=r$ ノ像ノ全長

証明； 仮定ヨリ

$$A_t(r) \leq \frac{2\pi h^2}{\log \frac{R}{r}} \quad (2)$$

従ツテアラユル十分小ニスレバ

$$A_t(r) \leq \delta < \frac{\pi}{6} \qquad (r \leq \rho)$$

依ツテ Riemannsphere 上ニ disjoint ナ面積 $\pi/6$ ヲ持ツ Jordandomain 5箇ヲ選ベバ $\mathfrak{R}f(k)$ ハ其ノ何レノ上ニモ単葉ナ island ヲ持タナイ $(k=\{z;|z|<\rho\})$.

依ツテ Bloch ノ定理[3]ニ依リ $f(k)$ ハ normal デアル。（証明終）

---

(2) R. Nevanlinna: Eindeutige analytische funktionen (1936) (S. 343)

(3) G. Valiron: familles normales et quasinormales de fonctions méromorphes. (1929).

(Bloch ノ定理ヲ用キナイ方法ガ望マシイ) (S. 46)

基本定理 $f(D)$ $\mathfrak{F}f(D)$ ノ意味ハ前ノ通リトスル。今 Riemann sphere 上ニ或ル q 個ノ disjoint ナ Jordan domain D_i $(i=1,2,\cdots\cdots,q)$ ガ存在シ、D_i 上ノ $\mathfrak{F}f(D)$ ノ island ハ少クトモ μ_i 葉 (island 無キ場合ハ $\mu_i=\infty$) ニシテ

$$\sum_{i=1}^{q}\left(1-\frac{1}{\mu_i}\right)>2 \qquad (\#)$$

ガ成立スルナラバ、$f(D)$ ハ D デ normal family ヲ形成スル。

証明: $\sum_{1}^{q}\left(1-\frac{1}{\mu_i}\right)=p\ (>2)$ ト置ク。今任意ニ $\xi\in D$ ヲ採リ $U_R(\xi)\subset D$ ニ補助定理ヲ適用シマス。先ヅ $\mathfrak{F}f(D)$ デ (#) ガ成立スレバ勿論 $\mathfrak{F}f(U_R(\xi))$ デ成立シ、又各 $t\in f(U_R(\xi))$ デ成立シマス。従ツテ

$$\sum_{1}^{q}\left(1-\frac{1}{\mu_i}\right)\leq 2+h(D_i)\ \frac{L_f(r)}{A_f(r)} \qquad (4)$$

ニ依リ $$A_f(r)\leq \frac{h(D_i)}{p-2}\ \frac{L_f(r)}{A_f(r)}$$


茲ニ $h(D_i)$ ハ各 $t\in f(U_R(\xi))$ ニ depend 致シマセン。依ツテ豫備定理ニヨリ、$f(D)$ ハ ξ デ normal デアリマス。$\xi\in D$ ハ任意デアリマシタカラ、結局 $f(D)$ ハ D デ normal デアリマス。

(証明終)

---

(4) R.N (S.336)

3° 2°デ述ベタ事ハ云ハバ $R_f(D)$ ガ regular auss-chöpffon" デナイト云フ様ナ性質ガ normality ノ十分條件トナルト云フ事デアリマス。以下今迄知ラレタ此ノ方面ノ主ナ結果ヲ參考迄ニ擧ゲテ見マス。



茲ニ Carathéodory-Bloch ノ定理トハ或ル g 箇ノ点ニ對シ(井)ガ成立スレバ normal デアルト云フ事。Montel (A), (B) ハ $R_f(D)$ ガ夫々三点, $\{w,a\}<\delta$ ヲ覆ハナケレバ normal デアルト云フ事。Bloch (A) トハ或ル五箇ノ disjoint ナ Jordan domain ノ上ニ $R_f(D)$ ガ單葉ナ island ヲ持タナケレバ normal デアルト云フ事。Bloch (B) トハ $R_f(D)$ ニ含マレル單葉円板ノ半径ガ有界ナラバ normal デアルト云フ事デアリマス(f ハ正則函数ノミヨリ成ル)。

4° 最後ニ基本定理ヲ用ヰテ孤立眞正特異点ノ近傍ノ性質ヲ調ベテ見マス。Rieman sphere ヲ廻転シテ考ヘレバ一般性ヲ失ナフ事ナク ∞ ガ孤立眞性特異点デ $t(z)$ ハ

$R<|z|<\infty$ デ有理型ト仮定シテ差支ヘナイ。然ラバ所謂 Julia ノ Method ヲ用ヰ次ノ定理ガ得ラレマス。

定理 $f(z)$ ヲ $R<|z|<\infty$ デ有理型、∞ ヲ真性特異点、又其ノ Riemannian image ハ少クトモ一ツノ超越特異点ヲ持ツモノトスル。然ラバ $a_1, a_2, \cdots a_q$ $(q \geq 3)$ ナル特定ノ方向ガ少クトモ一本存在シ $|a_p - a_q| < \delta$ ナル如何程デモ少サイ開キヲ持ツ角領域ニ於イテ

„Scheibensatz"

$$\sum_{i=1}^{q} \left(1 - \frac{1}{\mu_i}\right) \leq 2$$

ガ成立スル。

此ノ定理ハ勿論、更ニ一般ナ形ニ述ベル事ガ出来マスガ、此ノ形ニ於テ最モ興味ガアルト思ハレマス。

(1944, 5, 20)