

Title	Complex Banach space ニ於ケルワ級数ニ就テ
Author(s)	霜田, 伊左衛
Citation	全国紙上数学談話会. 1946, 2(1), p. 17-20
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/75140
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

5. Complex-Banach Space = 於ケル \cap 級数 = 就テ

霜田伊左衛 (阪大)
(10月11日受付)

Complex-Banach Space E 上テ定義セラレ Complex-Banach Space E' 値ヲトル函数 $p(x)$ ($x \in E$) が (i) $x, y \in E$ ナルトキ $p(x+\alpha y) = \sum_0^n \alpha^n p_n(x, y)$ (ii) アル $x, y =$ 対シテ $p_n(x, y) \neq 0$ (iii) E 各点テ定義セラレ且連続, (iv) $p(\alpha x) = \alpha^n p(x)$ ナルトキ p ヲ n 次ノ齊次多項式ト云フ。

今 $h_n(x)$ ヲ n 次ノ齊次多項式トシタトキ $\sum_{n=0}^{\infty} h_n(x)$ ヲ抽象ノ級数ト云フ。

定義1. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} h_n(x)$ = 於テアル実数 λ が存在シテ $\lambda < \lambda$ ナルトキ $\|x\| \leq r =$ 於テ $\|f(x)\| \leq M_r$, 又 $r > \lambda$ ナルトキ $\|x\| \leq r =$ 於テ $f(x)$ ハ正則且有界トハナラナイ。コノトキ λ ヲ $f(x)$ 有界半径ト名付ケル。

定義2. アル実数 τ が存在シ $\|x\| < \tau$ ナルトキ $f(x)$ ハ正則テ $\tau > \tau$ ナルトキ $\|x\| < \tau$ テ $f(x)$ ハ正則トナラナイ。

[定理]
$$\overline{\lim_{\|x\|=1} \sqrt[n]{\sup \|h_n(x)\|}} = \frac{1}{\lambda}$$

$\|x\| \leq 1$ = 含マレル元ユル Compact set G 、集合ヲ包トスルトキ

$$\sup_{G \in \mathcal{C}} \overline{\lim_{x \in G} \sqrt[n]{\sup \|h_n(x)\|}} = \frac{1}{\tau} \quad \text{一般} = \tau \geq \lambda \text{ト}$$

ナル。

[註] $\tau > \lambda$ ナル例ハ後ニ述マル。

[証明] 殆ンド同様ニ証明サレル故ニツイテノミ行フ。

(i) $\|y\| < \tau$ = 於テ $f(y)$ ハ正則トナルコトノ証明
 ε ヲ任意ノ正数トスルトキ $\|y\| \leq \tau - 2\varepsilon$ = 含マレル注意ノ Compact set $G' =$ 於テ $G' \ni y$ ナルトキ $x = y / (\tau - 2\varepsilon)$ トオケバ x 、集合 $\|x\| \leq 1$ = 於ケル Compact set G トナル。

$$\sup_{G \in \mathcal{C}} \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sup_{x \in G} \|h_n(x)\|}} = \frac{1}{\tau} \text{ ナル故}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sup_{x \in G} \|h_n(x)\|} \leq \frac{1}{\tau}$$

$$\sqrt[n]{\sup_{x \in G} \|h_n(x)\|} \leq \frac{1}{\tau - \varepsilon}, \quad n \geq n_0(\varepsilon)$$

$$\|h_n(x)\| \leq \frac{1}{(\tau - \varepsilon)^n}, \quad n \geq n_0(\varepsilon), \quad x \in G$$

$$\therefore \|h_n(y)\| = \|h_n(x)\| (\tau - 2\varepsilon)^n \leq \left(\frac{\tau - 2\varepsilon}{\tau - \varepsilon}\right)^n \quad y \in G'$$

故ニ $\sum h_n(y)$ ハ G' 上ニ一様収斂スル。 ε 及ビ G' ハ任意ナル故ニ A.E. Taylor 氏ノ定理⁽¹⁾ = \exists リ $f(y)$ ハ $\|y\| < \tau$ 上ニ正則トナル。

⁽¹⁾ Analytic function in general analysis, Annali And R. Scuola Normale Superiore di Pisa, II. Vol. V, 11.

(ii) $r > \tau$ ナルトキハ $\|y\| < r$ テ正則トスレバ不合理ナルコトノ証明。

$0 < \varepsilon < \frac{r-\tau}{4} = \delta > \ni f(x)$ ハ $\|x\| \leq \tau + 4\varepsilon$ テ正則トナル。従ツテ $\|y\| < \tau + 3\varepsilon$ - 含まレル任意ノ Compact set $G' =$ 於テ $y \in G'$ ノトキ $|\alpha| = \frac{\tau + 4\varepsilon}{\tau + 3\varepsilon} \quad \alpha y = y$

トスレバ y' ハ $\|y'\| \leq \tau + 4\varepsilon =$ 含まレル Compact set G'' トナルカ $\|f(y')\| \leq M_{G''} \quad (y' \in G'')$ トナル。又容易

= 分ル様 =

$$h_n(y) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(x/y)}{\alpha^{n+1}} d\alpha, \quad (C: |\alpha| = \frac{\tau + 4\varepsilon}{\tau + 3\varepsilon}, y \in G')$$

$$\therefore \|h_n(y)\| \leq \frac{M_{G''}}{|\alpha|^n} \dots \dots \dots (1)$$

然ルニ $\sup_{G \subset \mathbb{C}} \overline{\lim} \sqrt[n]{\sup_{x \in G} \|h_n(x)\|} = \frac{1}{\tau}$ ナル故 $\varepsilon = \delta > \ni$

$$\ni \text{テ } G \text{ カ定マリ } \overline{\lim} \sqrt[n]{\sup_{x \in G} \|h_n(x)\|} \geq \frac{1}{\tau + \varepsilon}$$

従ツテ $n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_\nu < \dots$ カアリ

$$\sqrt[n_\nu]{\sup_{x \in G} \|h_{n_\nu}(x)\|} \geq \frac{1}{\tau + 2\varepsilon}$$

従ツテ $n_\nu = \delta > \ni$ テ x_ν カ G ノ中ニアリ

$$\|h_{n_\nu}(x_\nu)\| \geq \frac{1}{(\tau + 3\varepsilon)^{n_\nu}} \quad (\nu = 1, 2, \dots)$$

今 $y = x(\tau + 3\varepsilon) \quad (x \in G)$ ノ集合ヲ G' トスレバ G' ハ $\|y\| \leq \tau + 3\varepsilon =$ 含まレル Compact set トナル。然ルニ $y_\nu =$

$$x_\nu(\tau + 3\varepsilon) \text{ トスルト } \|h_{n_\nu}(y_\nu)\| \geq 1 \quad (\nu = 1, 2, \dots) \dots \dots (2)$$

(ii) (2) ハ矛盾スル。

$\tau > 1$ なる例として τ complex (l_2) -space 上に於て
 函数 $f(x) = x_1 + 2x_2^2 + \dots + nx_n^2 + \dots$

ヲ考へル。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sup_{\|x\|=1} \|h_n(x)\|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

ナル故 $\lambda = 1$

次 $\|x\| \leq 1$ なる compact set G に対すてハ

$\sum a_n^2 < \infty$ ($a_n > 0$) なる $\{a_n\}$ があり 任意 m 対し

$$\sum_{m=n}^{\infty} |c_m|^2 \leq \sum_{m=n}^{\infty} a_m^2 \text{ なる故}$$

$$\sup_{x \in G} n |x_n|^n \leq n \left(\sqrt{\sum_{m=n}^{\infty} a_m^2} \right)^n$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sup_{x \in G} n |x_n|^n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{m=n}^{\infty} |a_m|^2}$$

$$= 0 \quad \therefore G \text{ 上任意なる故 } \tau = \infty$$

即ち $f(x)$ は (l_2) -space 上 "regular" たり

而も $\tau > 1$ なるハ $\|x\| < \tau$ 有界たり。

念のため $x^{(n)} = (0, 0, \dots, 1, \dots)$ (n 番目ノ座標ハ

1) たりハ $\|f(x^{(n)})\| = n$ たり有界性が破レル (以上)