OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	Nevanlinna の定理について
Author(s)	吉田, 徳之助
Citation	全国紙上数学談話会. 1948, 2(9), p. 292-292
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/75231
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

97. Nevanlinna の定理について

京都工専　吉田徳之助 (1948.4.30)

函数論では古典的な Liouville の定理として、有限な凡ての点で正則な函数の絶対値が一定数を超えなければ、その函数は常数であることが知られてゐる。これを R. Nevanlinna は調和測度の理論から拡張した。調和測度零なる集合に属する点を除いて凡ての点で一価解析的な函数が調和測度正なる集合に属する値をとらないならば、その函数は常数である。換言すれば取除きの調和測度零なる集合に於ても一価解析的であるといふのである。

このことは調和測度零なる点集合の近傍で一価解析的な函数についても成立する。これはすでに岡谷氏によつて指摘されたところである。氏は一次測度零なる集合の近傍で一価解析的な函数の値分布に関する Besicovitch の定理を用ひてなされた。こゝでは Nevanlinna の調和測度の理論だけから証明しえることを述べたい。

調和測度零なる集合 A に属する点を除いてその近傍で一価解析的な函数 $w=f(z)$ が調和測度正なる集合に属する値をとらないならば、その函数は A に於ても一価解析的である。

証　A の近傍で A を囲む単一閉曲線 C の囲む範囲を G とする。函数 $w=f(z)$ 及び曲線 C の像は w-平面を有限個の範囲に分ける。$\overline{G}-A$ で $w(z)$ がとらない値の集合 β は調和測度正である。調和測度零なる集合の有限個の和集合の調和測度は零であるからして分たれる有限面の範囲のうちには調和測度正なる β の閉部分集合 β' を含む範囲 D が少くとも一つある。

函数 $w(z)$ の値を D の内部の値とならしめない点 z の凡てからなる集合を Δ とする。$G-\Delta$ が空集合でないとすれば、それは開集合であるから連結せる範囲 G' を含む。この場合函数 $w(z)$ は G' にて $D-\beta$ に属する値をとり、A の点でない G' の境界点には D の境界であるしの上の値をとる。β' は調和測度正であるから

$w(w-\beta' \; v-\beta')$ は常数でない調和函数である。G'の一点 z_0 の像 $w_0 = w(z_0)$ は $D-\beta'$ の内点となるから $w(w_0, \beta', D-\beta') > 0$ また函数 $w(w(z), \beta', D-\beta')$ は G' で有界な調和函数である。調和測度零なる集合 Δ を除く境界点で値零をとるから恒等的に零に等しい。従つて $w(w_0, \beta', D-\beta') = w(w(z_0), \beta', D-\beta') = 0$. これは不合理である。従つて $G-\Delta$ は空集合である。すなはち $w(z)$ は G で D の値をとらない。従つて D の一つの内点を w_1 とすれば函数 $w_1(z) = \frac{1}{w(z)-w_1}$ は G で有界となる。Δ は調和測度零であるから Nevanlinna の定理によつて $w_1(z)$ は Δ の点においても一価解析的となる。故に $w(z)$ はこの点においても一価解析的である。

R. Nevanlinna : Eindeutige analytische Funktionen V. §4.

S. Kametani　Proc. Imp. Acad. vol 17. No. 10.