



Title	Note sur contractions et principes du maximum
Author(s)	Itô, Masayuki
Citation	Osaka Journal of Mathematics. 1967, 4(1), p. 217-226
Version Type	VoR
URL	<a href="https://doi.org/10.18910/7712">https://doi.org/10.18910/7712</a>
rights	
Note	

*The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA*

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

## NOTE SUR CONTRACTIONS ET PRINCIPES DU MAXIMUM<sup>\*)</sup>

MASAYUKI ITÔ

(Received April 20, 1967)

1. Soit  $\mathfrak{X}$  un espace fonctionnel relativement à un espace  $X$  localement compact et séparé, et à une mesure  $\xi$  de Radon positive dans  $X$ . Deny [3] a démontré que les deux énoncés suivants sont équivalents sous la condition (\*).

(\*) A tout compact  $K$  de  $X$ , on peut associer une constante  $A'(K)$  telle qu'on ait, pour toute  $u$  de  $\mathfrak{X}$ ,

$$\int_K |u(x)|^2 d\xi(x) \leq A'(K) \|u\|^2.$$

(1.1) La contraction “module” opère dans  $\mathfrak{X}$ . (resp. Les contractions normales opèrent dans  $\mathfrak{X}$ .)

(1.2) Le principe de domination est satisfait dans  $\mathfrak{X}$ . (resp. Le principe complet du maximum est satisfait dans  $\mathfrak{X}$ .)

Dans cet article, nous allons démontrer la même équivalence sans la condition (\*).

2. Nous donnerons d'abord la définition de l'espace fonctionnel d'accord avec Deny [3].

DÉFINITION. Un espace fonctionnel  $\mathfrak{X} = \mathfrak{X}(X; \xi)$  relativement à  $X$  et à  $\xi$  est un espace hilbertien des fonctions réelles et localement sommables pour  $\xi$ , vérifiant la condition suivante:

(a) A tout compact  $K$  de  $X$ , on peut associer une constante positive  $A(K)$  telle qu'on ait, pour toute  $u$  de  $\mathfrak{X}$ ,

$$\int_K |u(x)| d\xi(x) \leq A(K) \|u\|.$$

Deux fonctions égales presque partout pour  $\xi$  représentent le même élément de  $\mathfrak{X}$ . La norme et le produit scalaire sont désignés respectivement par  $\|u\|$  et  $(u, v)$ . On désignera par  $M$  l'ensemble des fonctions réelles, mesurables pour  $\xi$ .

---

\*) Cet article a été fait sous un bourse de la Fondation de Yukawa.

et bornées, à support compact dans  $X$ , et par  $M^+$  l'ensemble des éléments non-négatifs de  $M$ . Par la condition (a), à toute fonction  $f$  de  $M$ , on peut associer un élément unique  $u_f$  de  $\mathfrak{X}$  tel qu'on ait

$$(u_f, v) = \int v(x)f(x)d\xi(x)$$

pour toute  $v$  de  $\mathfrak{X}$ . On désignera par  $P(\mathfrak{X})$  l'ensemble  $\{u_f; f \in M\}$ , et par  $P^+(\mathfrak{X})$  l'adhérence de  $\{u_f; f \in M^+\}$ . On appelle les éléments de  $P^+(\mathfrak{X})$  potentiels purs de  $\mathfrak{X}$ . Alors,  $P(\mathfrak{X})$  est dense dans  $\mathfrak{X}$ , et nous obtenons que la convergence forte dans  $\mathfrak{X}$  entraîne la convergence presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ .

Le principe de domination: on dit que le principe de domination est satisfait dans  $\mathfrak{X}$  si, quels que soient  $f$  et  $g$  de  $M^+$ , l'inégalité  $u_f(x) \leq u_g(x)$  est satisfaite presque partout pour  $\xi$  sur  $X$  dès qu'elle l'est presque partout sur  $\{x \in X; f(x) > 0\}$ .

Le principe complet du maximum: on dit que le principe complet du maximum est satisfait dans  $\mathfrak{X}$  si, quels que soient  $f$  et  $g$  de  $M^+$ , l'inégalité  $u_f(x) \leq u_g(x) + 1$  est satisfaite presque partout sur  $X$  dès qu'elle l'est presque partout sur  $\{x \in X; f(x) > 0\}$ .

La contraction "module": on dit que la contraction "module" opère dans  $\mathfrak{X}$  si, quelle que soit  $u$  de  $\mathfrak{X}$ , on a  $|u| \in \mathfrak{X}$  et  $\| |u| \| \leq \|u\|$ .

Les contractions normales: on dit que les contractions normales opèrent dans  $\mathfrak{X}$  si, quelle que soit une contraction  $T$  de la droite réelle<sup>1)</sup>, on a  $T \cdot u \in \mathfrak{X}$  et  $\|T \cdot u\| \leq \|u\|$  pour toute  $u$  de  $\mathfrak{X}$ .

**Théorème 1.** *Soit  $\mathfrak{X}$  un espace fonctionnel relativement à  $X$  et à  $\xi$ . Deux énoncés suivants sont équivalents.*

- (A<sub>1</sub>) *La contraction "module" opère dans  $\mathfrak{X}$ .*
- (A<sub>2</sub>) *Le principe de domination est satisfait dans  $\mathfrak{X}$ .*

**Théorème 2.** *Soit  $\mathfrak{X}$  un espace fonctionnel relativement à  $X$  et à  $\xi$ . Deux énoncés suivants sont équivalents.*

- (B<sub>1</sub>) *Les contractions normales opèrent dans  $\mathfrak{X}$ .*
- (B<sub>2</sub>) *Le principe complet du maximum est satisfait dans  $\mathfrak{X}$ .*

Deny [3] a démontré les entraînements  $(A_1) \Leftrightarrow (A_2)$  et  $(B_1) \Leftrightarrow (B_2)$  sans la condition (\*).

3. Démontrons l'entraînement  $(A_2) \Leftrightarrow (A_1)$ . Pendant cette section, nous supposons que le principe de domination est satisfait dans  $\mathfrak{X}$ . Soit  $c$  un nombre positif, et posons

$$u_f^{(c)} = u_f + cf$$

1) On appelle une contraction normale de la droite réelle  $R$  une application  $T$  de  $R$  à  $R$  satisfaisant aux  $T(0) = 0$  et  $|T(a_1) - T(a_2)| \leq |a_1 - a_2|$  pour tout couple  $a_1$  et  $a_2$  de  $R$ .

pour toute  $f$  de  $M$ . L'ensemble  $P(\mathfrak{X}^{(c)}) = \{u_f^{(c)}; f \in M\}$  est un espace pré-hilbertien par la norme

$$\|u_f^{(c)}\|_c = \left( \int u_f^{(c)}(x)f(x)d\xi(x) \right)^{1/2}.$$

La complété  $\mathfrak{X}^{(c)}$  de  $P(\mathfrak{X}^{(c)})$  par la norme susdite  $\|\cdot\|_c$  est un espace fonctionnel relativement à  $X$  et à  $\xi$ .

**Lemme 1.** *A toute  $u$  de  $P^+(\mathfrak{X}^{(c)})$ , on peut associer une fonction non-négative unique  $f$  de  $L^2 = L^2(\xi)$  telle qu'on ait, pour toute  $v$  de  $\mathfrak{X}^{(c)}$ ,*

$$(u, v)_c = \int v(x)f(x)d\xi(x).$$

En effet, il existe une suite  $(f'_n)$  de  $M^+$  telle que la suite  $(u_{f'_n}^{(c)})$  converge fortement vers  $u$  dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$  avec  $n \rightarrow \infty$ . L'inégalité

$$c\|f'_n - f'_m\|_{L^2}^2 \leq \|u_{f'_n}^{(c)} - u_{f'_m}^{(c)}\|_c^2$$

entraîne l'existence d'une fonction non-négative  $f$  de  $L^2$  telle qu'on ait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f'_n - f\|_{L^2} = 0.$$

Posons

$$f_n(x) = \sup (\inf(f'_n(x), f(x)), f_{n-1}(x)).$$

Par l'inégalité  $\|u_{f'_n}^{(c)}\|_c \leq \|u_{f'_n}^{(c)}\|_c$  et la convergence croissante de  $(f_n)$  vers  $f$ , la suite  $(u_{f'_n}^{(c)})$  converge fortement vers  $u$  dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$  avec  $n \rightarrow \infty$ . Pour toute fonction non-négative  $v$  de  $\mathfrak{X}^{(c)}$ , on a

$$(u, v)_c = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_{f'_n}^{(c)}, v)_c = \lim_{n \rightarrow \infty} \int v(x)f'_n(x)d\xi(x) = \int v(x)f(x)d\xi(x),$$

parce que la suite  $(f_n)$  converge en croissant vers  $f$  presque partout pour  $\xi$ . Généralement, depuis que l'espace fonctionnel  $\mathfrak{X}^{(c)}$  a un noyau positif<sup>2)</sup>, d'après le théorème de Aronszajn-Smith (voir [1]), à toute  $v$  de  $\mathfrak{X}^{(c)}$ , on peut associer un élément  $\tilde{v}$  de  $\mathfrak{X}^{(c)}$  telle qu'on ait

$$\|\tilde{v}\|_c \leq \|v\|_c \quad \text{et} \quad |v(x)| \leq \tilde{v}(x)$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ . Par le résultat susdit, on a

$$\int \tilde{v}(x)f(x)d\xi(x) < +\infty.$$

Le théorème de convergence de Lebesgue entraîne

2) On l'appelle si tout potentiel pur d'un espace fonctionnel est non-négatif.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int v(x) f_n(x) d\xi(x) = \int v(x) f(x) d\xi(x),$$

c'est-à-dire que

$$(u, v)_c = \int v(x) f(x) d\xi(x).$$

De la même manière, on désigne par  $u_f^{(c)}$  cet élément  $u$ . Nous posons

$$L^2(\mathfrak{X}^{(c)}) = \{f \in L^2; u_f^{(c)} \in P^+(\mathfrak{X}^{(c)})\}.$$

Évidemment, on a  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)}) = L^2(\mathfrak{X}^{(c')})$  pour tous  $c, c' > 0$ .

**Lemme 2.** *Le principe de domination est satisfait dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$  pour tout  $c > 0$ .*

En effet, pour un couple de  $f$  et  $g$  de  $M^+$ , supposons que

$$u_f^{(c)}(x) \leq u_g^{(c)}(x)$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $\{x \in X; f(x) > 0\}$ . Il suffit de le démontrer au cas où

$$\{x \in X; f(x) > 0\} \cap \{x \in X; g(x) > 0\} = \emptyset,$$

parce que, en général, on peut considérer l'inégalité

$$u_{(f-g)^+}^{(c)}(x) \leq u_{(f-g)^-}^{(c)}(x).$$

Depuis que le principe de domination est satisfait dans  $\mathfrak{X}$  et qu'on a  $u_f(x) \leq u_g(x)$  presque partout pour  $\xi$  sur  $\{x \in X; f(x) > 0\}$ ,  $u_f(x) \leq u_g(x)$  presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ , c'est-à-dire,

$$u_f(x) + cf(x) \leq u_g(x) + cg(x)$$

presque partout pour  $\xi$  dans  $C\{x \in X; f(x) > 0\}$ . En conséquence, on a

$$u_f^{(c)}(x) \leq u_g^{(c)}(x)$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ .

De plus, nous obtenons le lemme suivant.

**Lemme 3.** *Pour un couple  $f_1$  et  $f_2$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$ , l'inégalité  $u_{f_1}^{(c)}(x) \leq u_{f_2}^{(c)}(x)$  est satisfait presque partout pour  $\xi$  sur  $X$  dès qu'elle l'est presque partout pour  $\xi$  sur  $\{x \in X; f(x) > 0\}$ .*

D'abord, nous allons démontrer au cas où  $f_2 \in M^+$ . Il existe une suite  $(f_{1,n})$  de  $M^+$ , qui converge en croissant vers  $f_1$  presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ , telle que la suite  $(u_{f_{1,n}}^{(c)})$  converge fortement vers  $u_{f_1}^{(c)}$  dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$  avec  $n \rightarrow \infty$ . Depuis qu'on a

$$u_{f_{1,n}}^{(c)}(x) \leq u_{f_2}^{(c)}(x)$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $\{x \in X; f_{1,n}(x) > 0\}$ , l'inégalité

$$u_{r_1, n}^{(c)}(x) \leq u_{r_2}^{(c)}(x)$$

est satisfaite presque partout pour  $\xi$  sur  $X$  par le lemme 2. Faissant  $n \rightarrow \infty$ , nous obtenons

$$u_{r_1}^{(c)}(x) \leq u_{r_2}^{(c)}(x)$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ . Au cas général, supposons que

$$\xi(\{x \in X; u_{r_1}^{(c)}(x) > u_{r_2}^{(c)}(x)\}) > 0.$$

Alors, il existe une fonction  $g(\neq 0)$  de  $M^+$  telle que

$$S_g \subset \{x \in X; u_{r_1}^{(c)}(x) > u_{r_2}^{(c)}(x)\}.$$

Soit  $E$  l'adhérence de l'ensemble

$$\{u_f^{(c)}; f \in M^+, S_f \subset \{x \in X; u_{r_1}^{(c)}(x) \leq u_{r_2}^{(c)}(x)\}\}.$$

Alors,  $E$  est un cône convexe fermé dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$ . La projection de  $u_g^{(c)}$  vers  $E$  est un potentiel pur dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$ , que nous désignerons par  $u_{g'}^{(c)}$ . Par l'énoncé susdit, on a

$$u_g^{(c)}(x) = u_{g'}^{(c)}(x)$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $\{x \in X; u_{r_1}^{(c)}(x) \leq u_{r_2}^{(c)}(x)\}$ , et

$$u_g^{(c)}(x) \geq u_{g'}^{(c)}(x)$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ . Alors, on a

$$\begin{aligned} & (u_{r_1}^{(c)} - u_{r_2}^{(c)}, u_g^{(c)} - u_{g'}^{(c)})_c \\ &= \int (u_g^{(c)}(x) - u_{g'}^{(c)}(x)) f_1(x) d\xi(x) - \int (u_g^{(c)}(x) - u_{g'}^{(c)}(x)) f_2(x) d\xi(x) \\ &= - \int (u_g^{(c)}(x) - u_{g'}^{(c)}(x)) f_2(x) d\xi(x) \leq 0. \end{aligned}$$

D'autre part, on a

$$\begin{aligned} & (u_{r_1}^{(c)} - u_{r_2}^{(c)}, u_g^{(c)} - u_{g'}^{(c)})_c \\ &= \int (u_{r_1}^{(c)}(x) - u_{r_2}^{(c)}(x)) g(x) d\xi(x) - \int (u_{r_1}^{(c)}(x) - u_{r_2}^{(c)}(x)) g'(x) d\xi(x) \\ &\geq \int (u_{r_1}^{(c)}(x) - u_{r_2}^{(c)}(x)) g(x) d\xi(x) > 0, \end{aligned}$$

ce qui est une contradiction. Donc, on a

$$u_{r_1}^{(c)}(x) \leq u_{r_2}^{(c)}(x)$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ .

**Lemme 4.** *Le principe d'enveloppe inférieure est satisfait dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$ , c'est-à-dire, pour toutes  $f_1$  et  $f_2$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$ , il existe une fonction  $f_0$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$  telle qu'on ait*

$$u_{f_0}^{(c)}(x) = \inf (u_{f_1}^{(c)}(x), u_{f_2}^{(c)}(x)).$$

En effet, posons, pour toute  $u_f^{(c)}$  de  $P^+(\mathfrak{X}^{(c)})$ ,

$$I(u_f^{(c)}) = \|u_f^{(c)}\|_c^2 - 2 \int \inf (u_{f_1}^{(c)}(x), u_{f_2}^{(c)}(x)) f(x) d\xi(x).$$

Alors,  $I(u_f^{(c)})$  est bornée inférieure, parce qu'on a

$$I(u_f^{(c)}) \geq \|u_f^{(c)}\|_c^2 - 2 \int u_{f_1}^{(c)}(x) f(x) d\xi(x) = \|u_f^{(c)} - u_{f_1}^{(c)}\|_c^2 - \|u_{f_1}^{(c)}\|_c^2 \geq -\|u_{f_1}^{(c)}\|_c^2.$$

Posons

$$m = \inf \{I(u_f^{(c)}); u_f^{(c)} \in P^+(\mathfrak{X}^{(c)})\}.$$

Alors, il existe une suite  $(f_n)$  de  $M^+$  telle qu'on ait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I(u_{f_n}^{(c)}) = m.$$

La suite  $(u_{f_n}^{(c)})$  étant bornée dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$ , nous pouvons supposer qu'il existe un potentiel pur  $u_f^{(c)}$  de  $\mathfrak{X}^{(c)}$  tel que la suite  $(u_{f_n}^{(c)})$  converge faiblement vers  $u_f^{(c)}$  dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$  avec  $n \rightarrow \infty$ . Ensuite, nous démontrerons l'égalité  $u_f^{(c)} = u_{f_0}^{(c)}$ . Depuis qu'on a, pour tout  $n$ ,

$$0 \leq \inf (u_{f_1}^{(c)}(x), u_{f_2}^{(c)}(x)) f_n(x) \leq u_{f_1}^{(c)}(x) f_n(x)$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $X$  et

$$\int u_{f_1}^{(c)}(x) f_n(x) d\xi(x) = (u_{f_1}^{(c)}, u_{f_n}^{(c)})_c$$

converge vers

$$(u_{f_1}^{(c)}, u_f^{(c)})_c = \int u_{f_1}^{(c)}(x) f(x) d\xi(x) < +\infty$$

avec  $n \rightarrow \infty$ , nous obtenons que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf (u_{f_1}^{(c)}(x), u_{f_2}^{(c)}(x)) f_n(x) d\xi(x) = \int \inf (u_{f_1}^{(c)}(x), u_{f_2}^{(c)}(x)) f(x) d\xi(x).$$

Par suite, on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I(u_{f_n}^{(c)}) \geq I(u_f^{(c)}),$$

c'est-à-dire,  $m = I(u_f^{(c)})$ . On a donc, pour toute  $g$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$ ,

$$(u_f^{(c)}, u_g^{(c)})_c \geq \int \inf (u_{f_1}^{(c)}(x), u_{f_2}^{(c)}(x)) g(x) d\xi(x) \quad (1)$$

et

$$\|u_f^{(c)}\|_c^2 = \int \inf (u_{f_1}^{(c)}(x), u_{f_2}^{(c)}(x)) f(x) d\xi(x). \quad (2)$$

L'inégalité (1) entraîne

$$u_f^{(c)}(x) \geq \inf(u_{f_1}^{(c)}(x), u_{f_2}^{(c)}(x))$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ , et les inégalités (1) et (2) entraînent

$$u_f^{(c)}(x) = \inf(u_{f_1}^{(c)}(x), u_{f_2}^{(c)}(x))$$

presque partout pour  $\xi$  sur  $\{x \in X; f(x) > 0\}$ . Par le lemme 3, nous obtenons que les inégalités

$$u_f^{(c)}(x) \leq u_{f_1}^{(c)}(x),$$

et

$$u_f^{(c)}(x) \leq u_{f_2}^{(c)}(x)$$

sont satisfaites presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ . En conséquence, nous obtenons l'égalité  $u_f^{(c)} = u_{f_0}^{(c)}$  que nous avons désiré.

**Lemme 5.** *On a  $M \subset \mathfrak{X}^{(c)}$  pour tout  $c > 0$ .*

En effet, pour une fonction  $f$  de  $M$ , la transformation

$$A_f: u_g \in P(\mathfrak{X}^{(c)}) \rightarrow \int f(x)g(x)d\xi(x)$$

est linéaire et bornée dans  $P(\mathfrak{X}^{(c)})$ . Par suite, on peut prolonger  $A_f$  à  $\mathfrak{X}^{(c)}$ , et  $A_f$  est un fonctionnel linéaire et bornée. Il existe un élément unique  $u$  de  $\mathfrak{X}^{(c)}$  tel qu'on ait, pour toute  $g$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$ ,

$$(u, u_g)_c = \int f(x)g(x)d\xi(x),$$

c'est-à-dire, on a  $u = f$ , et  $f \in \mathfrak{X}^{(c)}$ .

De la même manière, nous obtenons  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)}) \subset \mathfrak{X}^{(c)}$ . Soit  $A$  un ensemble mesurable pour  $\xi$  dans  $X$  tel que  $\xi(A) > 0$ , et posons

$$\mathfrak{X}_A^{(c)} = \overline{\{u \in \mathfrak{X}^{(c)}; S_u \subset A\}}.$$

Alors,  $\mathfrak{X}_A^{(c)} \neq 0$ , et il est un espace fonctionnel relativement à  $A$  et à  $\xi$  par la norme déduite de  $\mathfrak{X}^{(c)}$ . De la même manière que la démonstration du lemme 2, pour toute  $f$  de  $M^+$  avec  $S_f \subset A$ <sup>3)</sup> nous obtenons que le potentiel  $u_{f,A}^{(c)}$  de  $\mathfrak{X}_A^{(c)}$  est non-négative et égal à  $u_f^{(c)} - u_{f,A}^{(c)}$ , où  $f' \subset L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$  avec  $S_{f'} \subset \overline{CA}$ .

**Lemme 6.** *Soit  $u_f^{(c)}$  un élément dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$  tel que  $f^+, f^- \in L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$  et  $u_f^{(c)} \geq 0$ . Alors, on a  $f(x) \leq 0$  presque partout pour  $\xi$  sur  $\{x \in X; u_f^{(c)}(x) = 0\}$ .*

En effet, posons

$$A = \{x \in X; u_f^{(c)}(x) = 0, f(x) > 0\},$$

3) On désigne par  $S_f$  le support de  $f$ .

et supposons que  $\xi(A) > 0$ . Alors, selon  $\mathfrak{X}_A^{(c)} \neq 0$ , il existe une fonction  $g$  de  $M^+$  avec  $S_g \subset A$  telle que  $u_{g,A}^{(c)}(x) \neq 0$ , on a

$$(u_f^{(c)}, u_{g,A}^{(c)})_c = (u_f^{(c)}, u_g^{(c)} - u_{g'}^{(c)})_c = - \int u_f^{(c)}(x)g(x)d\xi(x) \leq 0.$$

D'autre part, on a

$$(u_f^{(c)}, u_{g,A}^{(c)})_c = \int u_{g,A}^{(c)}(x)f(x) = \int_A u_{g,A}^{(c)}(x)f(x)d\xi(x) > 0.$$

C'est une contradiction, d'où la démonstration est complète.

Démonstration de l'entrainement  $(A_2) \Leftrightarrow (A_1)$ . Nous démontrons d'abord que la contraction "module" opère dans l'espace fonctionnel  $\mathfrak{X}^{(c)}$ . Par le lemme 4, pour toutes  $f_1$  et  $f_2$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$ , il existe une fonction  $f_0$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$  telle que

$$u_{f_0}^{(c)} = \inf (u_{f_1}^{(c)}, u_{f_2}^{(c)}).$$

Depuis qu'on a

$$u_{f_0}^{(c)}(x) = \frac{1}{2} (u_{f_1}^{(c)}(x) + u_{f_2}^{(c)}(x) - |u_{f_1}^{(c)}(x) - u_{f_2}^{(c)}(x)|),$$

la fonction  $|u_{f_1}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)}|$  appartient à  $\mathfrak{X}^{(c)}$ . On a

$$\begin{aligned} & \| |u_{f_1}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)}| \|_c = \| u_{f_1}^{(c)} + u_{f_2}^{(c)} - 2u_{f_0}^{(c)} \|_c^2 \\ & = \| u_{f_1}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)} \|_c^2 + (u_{f_1}^{(c)} - u_{f_0}^{(c)}, u_{f_2}^{(c)} - u_{f_0}^{(c)})_c \\ & \leq \| u_{f_1}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)} \|_c^2. \end{aligned}$$

Dans le calcul susdit, nous avons employé le lemme 6 et l'égalité

$$\xi(\{x \in X; u_{f_1}^{(c)}(x) - u_{f_0}^{(c)}(x) > 0, u_{f_2}^{(c)}(x) - u_{f_0}^{(c)}(x) > 0\}) = 0.$$

Ensuite, soit  $u$  un élément de  $\mathfrak{X}^{(c)}$ . Alors, il existe deux suites  $(f_{1,n})$  et  $(f_{2,n})$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$  telles que la suite  $(u_{f_{1,n}}^{(c)} - u_{f_{2,n}}^{(c)})$  converge fortement vers  $u$  dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$  avec  $n \rightarrow \infty$ . Par l'énoncé susdit, on a

$$|u_{f_{1,n}}^{(c)} - u_{f_{2,n}}^{(c)}| \in \mathfrak{X}^{(c)}$$

et

$$\| |u_{f_{1,n}}^{(c)} - u_{f_{2,n}}^{(c)}| \|_c \leq \| u_{f_{1,n}}^{(c)} - u_{f_{2,n}}^{(c)} \|_c.$$

Par suite, nous pouvons supposer qu'il existe un élément  $u'$  de  $\mathfrak{X}^{(c)}$  tel que la suite  $(|u_{f_{1,n}}^{(c)} - u_{f_{2,n}}^{(c)}|)$  converge faiblement vers  $u'$  dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$  avec  $n \rightarrow \infty$ . Depuis que la suite  $(|u_{f_{1,n}}^{(c)} - u_{f_{2,n}}^{(c)}|)$  converge vers  $|u|$  presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ , on a  $u'(x) = |u(x)|$  presque partout pour  $\xi$  sur  $X$ , d'où la fonction  $|u|$  appartient à  $\mathfrak{X}^{(c)}$ . De plus, on a

$$\| |u| \|_c \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \| |u_{f_{1,n}}^{(c)} - u_{f_{2,n}}^{(c)}| \|_c \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \| u_{f_{1,n}}^{(c)} - u_{f_{2,n}}^{(c)} \|_c = \| u \|_c,$$

et par suite, la contraction “module” opère dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$ .

Secondement, nous démontrons que la contraction “module” opère dans l'espace fonctionnel  $\mathfrak{X}$ . Soit  $f$  une fonction de  $M$ , et considérons la transformation de  $u_g \in P(\mathfrak{X})$  en  $\int |u_f(x)| g(x) d\xi(x)$ . Depuis qu'on a

$$\begin{aligned} \left| \int |u_f(x)| g(x) d\xi(x) \right| &= \lim_{\substack{c \rightarrow 0 \\ c > 0}} \left| \int |u_f(x) + cf(x)| g(x) d\xi(x) \right| \\ &= \lim_{\substack{c \rightarrow 0 \\ c > 0}} \left| (|u_f^{(c)}|, u_g^{(c)})_c \right| \leq \lim_{\substack{c \rightarrow 0 \\ c > 0}} \| |u_f^{(c)}| \|_c \cdot \| u_g^{(c)} \|_c \\ &\leq \lim_{\substack{c \rightarrow 0 \\ c > 0}} \| u_f^{(c)} \|_c \cdot \| u_g^{(c)} \|_c = \| u_f \| \cdot \| u_g \|, \end{aligned}$$

par le théorème de Riesz, on a  $|u_f| \in \mathfrak{X}$  et  $\| |u_f| \| \leq \| u_f \|$ . De la même manière que la démonstration susdite, pour toute  $u$  de  $\mathfrak{X}$ , nous avons  $|u| \in \mathfrak{X}$  et  $\| |u| \| \leq \| u \|$ . C'est-à-dire que la contraction “module” opère dans  $\mathfrak{X}$ .

4. Démontrons l'entraînement  $(B_2) \Rightarrow (B_1)$ . De la même manière, il suffit de démontrer que les contractions normales opèrent dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$  pour tout  $c > 0$ . Pour cela, il suffit de démontrer que la contraction unité  $T$  opère dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$ <sup>4)</sup>. (Voir [4] et [5].) De la même manière que le lemme 4, nous pouvons démontrer que, pour toutes  $f_1$  et  $f_2$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$ , il existe une fonction  $f_0$  de  $L^2(\mathfrak{X}^{(c)})$  telle que

$$u_{f_0}^{(c)} = \inf (u_{f_1}^{(c)}, u_{f_2}^{(c)} + 1).$$

Alors,

$$T \cdot (u_{f_1}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)}) = \inf (u_{f_1}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)}, 1) = u_{f_0}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)}$$

si  $u_{f_1}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)} \geq 0$ . De la même manière que l'entraînement  $(A_2) \Rightarrow (A_1)$ , on a

$$\begin{aligned} \| T \cdot (u_{f_1}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)}) \|_c &= \| u_{f_0}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)} \|_c \\ &\leq \| u_{f_1}^{(c)} - u_{f_2}^{(c)} \|_c. \end{aligned}$$

Par suite, pour toute  $u$  de  $\mathfrak{X}^{(c)}$ , on a  $T \cdot u \in \mathfrak{X}^{(c)}$  et

$$\| T \cdot u \|_c = \| T \cdot |u| \|_c \leq \| |u| \|_c \leq \| u \|_c.$$

En conséquence, les contractions normales opèrent dans  $\mathfrak{X}^{(c)}$ . Ainsi, la démonstration est complète.

REMARQUE. Ces deux résultats peuvent immédiatement être prolongés dans le cas d'un espace fonctionnel généralisé. (Au sujet de l'espace fonctionnel généralisé, voir [6].)

UNIVERSITÉ DE NAGOYA

4) On appelle la projection de la droite réelle  $R$  à  $[0, 1]$  la contraction unité.

**Bibliographie**

- [1] N. Aronszajn and K.T. Smith: *Characterization of positive reproducing kernels. Applications to Green's functions*, Amer. J. Math. **79** (1957), 611–622.
- [2] J. Deny: *Formes et espaces de Dirichlet*, Sémin. Bourbaki, 12e, 1959/60, n° 187.
- [3] J. Deny: *Principe complet du maximum et contractions*, Ann. Inst. Fourier **15**, 1 (1965), 259–272.
- [4] M. Itô: *Condensor principle and the unit contraction*, Nagoya Math. J. **30** (1967), 9–28.
- [5] M. Itô: *Balayage principle and maximum principles on regular functional spaces*, J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. A-1, to appear.
- [6] M. Itô: *A note on extended regular functional spaces*, Proc. Japan Acad. **44** (1967).